

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

R. Muminova
S. Turdaxunova

OLIY MATEMATIKA

MASALALAR TO‘PLAMI

Institutning barcha bakalavriat ta‘lim yo‘nalishlari uchun

Toshkent 2007

Oliy matematika. Masalalar to‘plami. R. Muminova, S.Turdaxunova.
T.: “IQTISOD-MOLIYA” nashriyoti, 2007 y. 194 bet.

Ushbu masalalar to‘plami institutning barcha bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unga “Oliy matematika” fanidan aniqlovchilar, matritsalar, chiziqli tenglamalar sistemasi va ularni yechish usullari, tekislikda va fazodagi analitik geometriya elementlari, nuqtalar to‘plami, yaqinlashishlar, hosila, integral, differensial, sonli va funksional qatorlar hamda funksiyaning to‘la tekshirish haqida qisqacha tushuncha kiritilgan. Har bir mavzuga oid asosiy tushuncha, formulalar, namunaviy masalalar yechimlari, mustaqil ishlash uchun masalalar, ularning javoblari kiritilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining Toshkent moliya instituti qoshidagi oliy o‘quv yurtlararo ilmiy-uslubiy kengashda muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan.

Taqrizchilar: dots. S. Isamuxamedov
dots. A. Roishev

©“IQTISOD-MOLIYA”, 2007

1. MATRITSALAR USTIDA AMALLAR

Matritsalar ustida quyidagi chiziqli amallarni bajarish mumkin.

1. Matritsani songa ko'paytirish uchun uning barcha elementlari shu songa ko'paytiriladi. $k \neq 0$ son hamda

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ matritsa berilgan bo'lsa, $Ak = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \end{pmatrix}$ tenglik o'rinli bo'ladi.

1. O'lchamlari bir hil bo'lgan A va B matritsalarini qo'shish uchun mos elementlari qo'shiladi:

$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix}$ bo'lsa, $A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \end{pmatrix}$ matritsa hosil bo'ladi.

2. Matritsalarini ko'paytirish.

Agar A matritsaning ustunlari soni B matritsaning satrlar soniga teng bo'lsa A ni B ga ko'paytirish mumkin, $n \times m$ o'lchovli $A = (a_{ik})$ matritsani $m \times p$ o'lchovli $B = (b_{jk})$ matritsaga quyidagi formula bo'yicha ko'paytiriladi.

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}$$

Amallarni bajaring:

1.1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $A+B$ matritsani toping.

$$A+B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+0 & 4+2 & 1+1 \\ -1+1 & 0+1 & 2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

1.2. $A = \begin{bmatrix} 7 & -12 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 26 & 45 \\ 15 & 26 \end{bmatrix}$ $A \cdot B$ matritsani toping.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 7 & -12 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 26 & 45 \\ 15 & 26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \cdot 26 + (-12) \cdot 15 & 7 \cdot 45 + (-12) \cdot 26 \\ -4 \cdot 26 + 7 \cdot 15 & -4 \cdot 45 + 7 \cdot 26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Berilgan matritsalar ustida talab qilingan amallarni bajaring.

$$1.3. A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad 2A - B = ?$$

$$1.4. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad 3A - 2B = ?$$

$$1.5. \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{18} \\ 4 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.6. C = (1 \ 2 \ 3), \quad F = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C * F = ?$$

$$1.7. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A * B = ?$$

$$1.8. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \quad A * B = ?$$

$$1.9. A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^2 = ?$$

$$1.10. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad E - \text{birlik matritsa} \quad 2A^2 + 3A + 5E = ?$$

$$1.11. A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad A * B - C^2 = ?$$

$$1.12. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = (2 \ 0 \ 5), \quad E - \text{birlik matritsa} \quad A * B * C - 3E = ?$$

$$1.13. A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad A * B = ?$$

$$1.14. \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = ?$$

$$1.15. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & 4 & -3 \\ 5 & -3 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 7 & 8 & 6 & 9 \\ 5 & 7 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = ?$$

$$1.16. \begin{pmatrix} 5 & 7 & -3 & -4 \\ 7 & 6 & -4 & -5 \\ 6 & 4 & -3 & -2 \\ 8 & 5 & -6 & -1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix} = ?$$

Matritsalar ustida amallarni bajaring:

$$1.17. A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad 2A + 5B = ?$$

$$1.18. A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A + B = ?$$

$$1.19. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad A * C = ?$$

$$1.20. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A * F = ?$$

$$1.21. A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad A^2 - A * B + 2BA = ?$$

$$1.22. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad A * B = ?$$

$$1.23. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad A * B = ? \quad B * A = ?$$

$$1.24. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A^2 + A + E = ?$$

$$1.25. \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -28 & 93 \\ 38 & -126 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad A * B * C = ?$$

$$1.26. \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -10 & -9 & 7 \\ 1 & 5 & 8 \\ -1 & -3 & 6 \end{pmatrix} = ?$$

$$1.27. \quad \begin{pmatrix} 5 & 8 & -4 \\ 6 & 9 & -5 \\ 4 & 7 & -3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & 5 \end{pmatrix} = ?$$

$$1.28. \quad \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -28 & 93 \\ 38 & -126 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = ?$$

$$1.29. \quad \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 & 3 \\ 6 & 4 & -3 & 5 \\ 9 & 2 & -3 & 4 \\ 7 & 6 & -4 & 7 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & -5 & 3 & 11 \\ 16 & 24 & 8 & -8 \\ 8 & 16 & 0 & -16 \end{pmatrix} = ?$$

$$1.30. \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ -5 & -3 & -4 & 4 \\ 5 & 1 & 4 & -3 \\ -16 & -11 & -15 & 14 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & 4 \\ 11 & 0 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 3 & 0 \\ 22 & 2 & 9 & 8 \end{pmatrix} = ?$$

$$1.31. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad A^{20} = ?$$

2. IKKINCHI, UCHINCHI TARTIBLI ANIQLOVCHILARNI HISOBLASH

$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ haqiqiy sonlar berilgan bo'lsin ikkinchi tartibli determinant

(yoki aniqlovchi) deb, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ kabi belgilanuvchi va $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} -$

$a_{12}a_{21}$ tenglik bilan aniqlanuvchi songa aytiladi

Berilgan $a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}$ haqiqiy sonlardan tuzilgan

$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$ yig'indiga teng va

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ kabi berilgan songa uchinchi tartibli determinant deb ataladi.

Uchinchi tartibli determinantlarni uchburchaklar usulida, Sarryus usulida hamda biror satr yoki ustun elementlari bo'yicha yoyib hisoblash mumkin.

1. Uchburchaklar usuli:

$$\begin{aligned}
 (+) \quad & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (-) \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
 & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}
 \end{aligned}$$

2. Sarryus usuli:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

3. Birinchi ustun elementlari bo'yicha yoyib hisoblash:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$2.1. \text{ a) } \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - (-4) \cdot 2 = 15 + 8 = 23$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} \sqrt{a} & -1 \\ a & \sqrt{a} \end{vmatrix} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} - (-1) \cdot a = a + a = 2a$$

2.2. Uchinchi tartibli determinantlarni uchrurchaklar usuli, Sarryus usuli hamda biror ixtiyoriy satr yoki ustun elementlari bo'yicha yoyib hisoblang:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & -5 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-3) \cdot (-5) + 1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 - 1 \cdot (-3) \cdot 4 - 1 \cdot 2 \cdot (-5) - 1 \cdot (-1) \cdot 1 = 15$$

$$+ 4 - 2 + 12 + 10 + 1 = 40$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & -5 \end{vmatrix} = 15 - 2 + 4 + 12 + 1 + 10 = 40$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & -5 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 16 + 14 + 10 = 40$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi ikkinchi tartibli determinantlarni hisoblang:

$$2.3. \begin{vmatrix} -7 & 6 \\ 5 & -4 \end{vmatrix}$$

$$2.4. \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ 9 & -8 \end{vmatrix}$$

$$2.5. \begin{vmatrix} \sqrt{a} + \sqrt{b} & \sqrt{a} - \sqrt{b} \\ \sqrt{a} - \sqrt{b} & \sqrt{a} + \sqrt{b} \end{vmatrix}$$

$$2.6. \begin{vmatrix} \sin 1^\circ & \sin 89^\circ \\ -\cos 1^\circ & \cos 89^\circ \end{vmatrix}$$

$$2.7. \begin{vmatrix} (x+y)/x & 2x/(x-y) \\ (y-x)/(x^2-y^2) & (y-x)/(x^2-y^2) \end{vmatrix}$$

$$2.8. \text{ a) } \begin{vmatrix} \sin^2 a & \cos^2 a \\ \sin^2 b & \cos^2 b \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} \sqrt{5} - a^{\frac{1}{2}} & a^{\frac{1}{2}} \\ -a^{\frac{1}{2}} & \sqrt{5} + a^{\frac{1}{2}} \end{vmatrix}$$

2.9. Tenglamani yeching:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} x & 3 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & (4) \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{b) } (0.6)^x \cdot \left(\frac{25}{9}\right)^{\frac{x}{4}} = \left(\frac{27}{125}\right)^3$$

$$c) \log_3 \frac{2}{\begin{vmatrix} 2 & x \\ 1 & 2 \end{vmatrix}} = \log_3 \begin{vmatrix} x & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}$$

2.10. Tengsizliklarni yeching:

$$a) \begin{vmatrix} x & 1 \\ -4 & x \end{vmatrix} \leq \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & x \end{vmatrix},$$

$$b) \frac{1}{\begin{vmatrix} x & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} < \frac{1}{3}$$

Quyidagi uchinchi tartibli determinantlarni qulay usulda hisoblang:

$$2.11. \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2.12. \begin{vmatrix} a & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ a & -1 & a \end{vmatrix}$$

$$2.13. \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \\ 7 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$2.14. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2.15. \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 5 \\ -4 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$2.16. \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 2 & 3 & -7 \end{vmatrix}$$

$$2.17. \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$2.18. \begin{vmatrix} a & -a & a \\ a & a & -a \\ a & -a & -a \end{vmatrix}$$

$$2.19. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -4 & 7 \\ 3 & 12 & 15 \end{vmatrix}$$

Determinantlarni 3-ustun elementlari bo'yicha yoyib hisoblang:

$$2.20. \begin{vmatrix} 1 + \cos a & 1 + \sin a & 1 \\ 1 - \sin a & 1 + \cos a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2.21. \begin{vmatrix} 2 \cos^2 a / 2 & \sin a & 1 \\ 2 \cos^2 b / 2 & \sin b & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2.22. \begin{vmatrix} \sin a & \cos a & 1 \\ \sin b & \cos b & 1 \\ \sin y & \cos y & 1 \end{vmatrix}$$

Qanday shart bajarilganda quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi?

$$2.23. \begin{vmatrix} 1 & \cos a & \cos b \\ \cos a & 1 & \cos y \\ \cos b & \cos y & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cos a & \cos b \\ \cos a & 0 & \cos y \\ \cos b & \cos y & 0 \end{vmatrix}$$

Determinantlarni hisoblang:

$$2.24. \begin{vmatrix} a+x & x & x \\ x & b+x & x \\ x & x & c+x \end{vmatrix}$$

$$2.25. \begin{vmatrix} \cos a & \sin a \cos b & \sin a \sin b \\ -\sin a & \cos a \cos b & \cos a \sin b \\ 0 & -\sin b & \cos b \end{vmatrix}$$

Quyidagi ikkinchi, uchinchi tartibli determinantlarni hisoblang:

$$2.26. \begin{vmatrix} 1, (3) & 2,25 \\ 23/3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$2.27. \begin{vmatrix} \sin 60^0 & \cos 45^0 \\ \sin 45^0 & \operatorname{tg} 30^0 \end{vmatrix}$$

$$2.28. \begin{vmatrix} \operatorname{tga} & -1 \\ 4 & \operatorname{ctga} \end{vmatrix}$$

$$2.29. \begin{vmatrix} (a-1)/2\sqrt{a} & (a+\sqrt{a})/(\sqrt{a}-1) \\ (a\sqrt{a}-\sqrt{a})/2a & (a-\sqrt{a})/(\sqrt{a}+1) \end{vmatrix}$$

$$2.30. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 6 & -6 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$2.31. \begin{vmatrix} 12 & 6 & -4 \\ 6 & 4 & 4 \\ 3 & 2 & 8 \end{vmatrix}$$

$$2.32. \begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2 & y & 1 \\ z^2 & z & 1 \end{vmatrix}$$

$$2.33. \begin{vmatrix} m+a & m-a & a \\ n+a & 2n-a & a \\ a & -a & a \end{vmatrix}$$

$$2.34. \begin{vmatrix} ax & a^2+x^2 & 1 \\ ay & a^2+y^2 & 1 \\ az & a^2+z^2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2.35. \begin{vmatrix} \sin 3a & \cos 3a & 1 \\ \sin 2a & \cos 2a & 1 \\ \sin a & \cos a & 1 \end{vmatrix}$$

$$2.36. \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

$$2.37. \begin{vmatrix} a & x & x \\ x & b & x \\ x & x & c \end{vmatrix}$$

$$2.38. \begin{vmatrix} 1 & 5 & 25 \\ 1 & 7 & 49 \\ 1 & 8 & 64 \end{vmatrix}$$

$$2.39. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 9 \\ 16 & 25 & 81 \end{vmatrix}$$

$$2.40. \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 7 & 1 & 6 \\ 6 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$2.41. \begin{vmatrix} \sin x & 0 & -3/2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 0,5 & 0 & \cos x \end{vmatrix} = 1$$

$$2.42. \begin{vmatrix} 3^x & 2 & -1 \\ 9^x & 2^x & 0 \\ 2^x & 0 & 1 \end{vmatrix} > 0$$

3. DETERMINANT XOSSALARI. MINOR VA ALGEBRAIK TO'LDIRUVCHILARGA DOIR MISOLLAR

Determinantning asosiy xossalari yordamida yuqori tartibli determinantlar quyi tartibli determinantga keltiriladi.

Misol: a) $\det = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ bu determinantni biror satr yoki ustunda nollar hosil

qilib hisoblaymiz. Buning uchun 1-satrni (-1) ga ko'paytirib 2-satrga qo'shamiz:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

2 – ustun elementlari bo'yicha yoyib yozamiz:

$$\text{Det} = 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(-2+1) = 1$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 3 & 5 & 7 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{vmatrix}$$

Determinantni hisoblang.

Determinantni hisoblash uchun biror yo'l yoki ustunda nollar hosil qilamiz. Buning uchun 2-satr elementlarini (-3) ga ko'paytirib 1-satr elementlariga, 2-satrni 2 ga ko'paytirib 3-satr elementlariga qo'shamiz, 4-satr elementlaridan 2-satr elementlarini ayiramiz. Natijada berilgan determinant quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\text{Det} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 & -10 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

Determinantni 1-ustun elementlari bo'yicha yoyib yozamiz:

$$\text{Det} = - \begin{vmatrix} -1 & -2 & -10 \\ 1 & 9 & 10 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

1- satr elementlariga 2- satr elementlarini hadma-had qo'shib, 1 – satr elementlari bo'yicha yoyib yozamiz:

$$\text{Det} = \begin{vmatrix} 0 & 7 & 0 \\ 1 & 9 & 10 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 7 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -70$$

$$\text{Det} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

n - tartibli determinantning a_{ij} elementining algebraik to'ldiruvchisi

$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ formula bo'yicha hisoblanadi, bu yerda M_{ij} a_{ij} elementning minori.

$$\text{Berilgan } \begin{vmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 6 & 10 \end{vmatrix} \quad \text{determinantning barcha algebraik to'ldiruvchilarini}$$

toping.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} = -30; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = -20;$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 15; \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} = 70;$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = 25; \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = -22;$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 15; \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 10;$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -1.$$

Determinantning ixtiyoriy satr yoki ustun elementlarining o'z algebraik to'ldiruvchilariga ko'paytmalarining yig'indisi uning kattaligiga teng degan xossaga ko'ra, har qanday determinantni ixtiyoriy satr (ustun) bo'yicha yoyib yozish mumkin.

Tartiblari bir hil bo'lgan 2 ta determinantni qo'shish amali hossasini faqatgina bittadan mos satrlari (yoki ustunlari) farq qilgandagina qo'llash mumkin:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{vmatrix}$$

Misol: $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 8 & 9 & 5 \\ 12 & 3 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 8 & -9 & 5 \\ 12 & -2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 8 & 0 & 5 \\ 12 & 1 & 6 \end{vmatrix} =$
 $= 1 \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 8 & 5 \end{vmatrix} = -(5 + 16) = -21.$

Bir hil n -tartibli A va B determinantlarni ko'paytirish quyidagi formula asosida amalga oshiriladi:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk} \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Misol: $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \cdot 1 + 2 \cdot 6 & 3 \cdot 7 + 2 \cdot 9 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 6 & 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 15 & 39 \\ 34 & 73 \end{vmatrix}$

Mustaqil yechish uchun misollar:

3.1. a) $\begin{vmatrix} 5 & 7 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 6 & 1 & 9 \end{vmatrix}$, \det, A_{32} ni toping.

b) $\Delta = \begin{vmatrix} 7 & -3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 8 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ da A_{41} ni toping.

Determinantlar xossalaridan foydalanib, nollar yig'ib hisoblang:

3.2. $\begin{vmatrix} 7 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -4 \end{vmatrix}$

3.3. $\begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & b & 0 \\ b & 0 & -1 \end{vmatrix}$

3.4. $\begin{vmatrix} -x & 1 & x \\ 0 & -x & -1 \\ x & 1 & -x \end{vmatrix}$

3.5. $\begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \\ 7 & 3 & 6 \end{vmatrix}$

$$3.6. \begin{vmatrix} \sin^2 a & 1 & \cos^2 a \\ \sin^2 b & 1 & \cos^2 b \\ \sin^2 y & 1 & \cos^2 y \end{vmatrix}$$

$$3.7. \begin{vmatrix} \sin^2 a & \cos 2a & \cos^2 a \\ \sin^2 b & \cos 2b & \cos^2 b \\ \sin^2 y & \cos 2y & \cos^2 y \end{vmatrix}$$

$$3.8. \begin{vmatrix} x & x & ax+bx \\ y & y & ay+by \\ z & z & az+bz \end{vmatrix}$$

$$3.9. \begin{vmatrix} a+b & c & 1 \\ b+c & a & 1 \\ c+a & b & 1 \end{vmatrix}$$

Determinantlarni qulay usulda hisoblang:

$$3.10. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3.11. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -1 & 7 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3.12. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -9 & -9 & -9 & -9 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$3.13. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3.14. \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 9 & -1 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3.15. A+B \text{ ni hisoblang: } A = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 \\ -2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3.16. \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 6 \\ 0 & 5 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & -4 \end{vmatrix}$$

$$3.17. A = \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -9 \end{vmatrix} \quad AB = ?$$

$$3.18. A = \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$AB = ?$$

$$3.19. \begin{vmatrix} 7 & 0 & 0 \\ -8 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & -4 \end{vmatrix}$$

$$3.20. \begin{vmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$3.21. -0,125 \begin{vmatrix} -1/13 & 2/13 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \\ 26 & 26 & 26 \end{vmatrix}$$

$$3.22. \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3.23. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}$$

$$3.24. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$3.25. \begin{vmatrix} 0 & 6 & 3 & 5 & 1 \\ -3 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \\ -3 & 8 & 7 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 4 & 0 \end{vmatrix}$$

$$3.26. \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & a+3 & b+4 \\ 2 & c+3 & d+4 \end{vmatrix}$$

$$3.27. \begin{vmatrix} 1 & -3 & -5 \\ 4 & 2 & 1 \\ 7 & 6 & -6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 4 & -2 & 1 \\ 7 & 6 & -6 \end{vmatrix}$$

$$3.28. \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 7 & 6 \end{vmatrix}$$

$$3.29. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ 3 & -4 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$3.30. \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -4 & -8 \\ -1 & -3 & -9 & -27 \\ -1 & -4 & -16 & -64 \end{vmatrix}$$

$$3.31. \begin{vmatrix} 10 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 12 & 10 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 10 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 10 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & 10 \end{vmatrix}$$

$$3.32. \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix}$$

$$3.33. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 2 & 5 & \dots & n-1 & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 2n-3 & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & 2n-1 \end{vmatrix}$$

$$3.34. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \dots & 2 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & n-1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & n \end{vmatrix}$$

4. MATRITSA RANGINI HISOBLASH.

TESKARI MATRITSANI TOPISH

$$1. A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

A matritsaning rangi deb noldan farqli minorlarning eng yuqori tartibiga aytiladi va $\text{rang}(A)$ kabi ifodalanadi.

Matritsa rangi ikki usulda topiladi:

1. Matritsa rangi ta'rifga asoslangan "minorlar ajratish" usuli;
2. Matritsa ustun va satrlarida nollar yig'ib hisoblashga asoslangan "Gauss algoritmi".

Misol 1. Matritsa rangini hisoblang:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix} \quad A \text{ matritsa } 3 \times 5 \text{ tartibli, demak uning rangi } 3 \text{ dan yuqori}$$

bo'lmaydi. Uchinchi tartibli minorlarni hisoblaymiz:

$$M_1 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4 - 10 - 12 + 12 + 4 + 10 = 0 \quad M_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 8 \end{vmatrix} = -32 - 2 + 8 - 8 + 32 + 2 = 0$$

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 4 & -2 & 7 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -8 - 14 - 16 + 16 + 8 - 14 = 0 \quad M_4 = \begin{vmatrix} -1 & 3 & -2 \\ -2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 8 \end{vmatrix} = -40 - 3 + 4 - 10 + 48 + 1 = 0$$

$$M_5 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 5 & 1 & 7 \\ 1 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 14 + 160 - 4 + 20 - 168 = 0$$

Barcha uchinchi tartibli minorlar nolga teng. Ikkinchi tartibli minorlarni hisoblaymiz:

$$M_1^1 = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -5 + 6 = 1 \quad M_1^1 \neq 0 \quad r(A) = 2$$

Bu usulda noldan farqli minor topilgunga qadar hisoblashlar davom etadi. Shuning uchun tartibi kattaroq matritsa rangini hisoblash bir muncha qiyinchiliklarga olib keladi.

Misol 2. Matritsa rangini elementar almashtirishlar yordamida nollar yig'ib hisoblaymiz:

$$A = \begin{pmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 75 & 94 & 53 & 132 \\ 75 & 94 & 54 & 134 \\ 25 & 32 & 20 & 48 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

bu matritsaning rangi $\begin{pmatrix} 31 & 17 & 43 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ matritsa rangiga teng.

$$\begin{vmatrix} 31 & 17 & 43 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 40 \neq 0 \qquad r \begin{pmatrix} 31 & 17 & 43 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 3.$$

Demak, berilgan matritsaning rangi ham 3 ga teng. $r(A)=3$

(1) ko'rinishdagi A matritsa uchun teskari matritsa 2 usulda topiladi:

1. Klassik usuli;
2. Jordan usuli.

Misol 3. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ matritsa uchun teskari A^{-1} matritsani klassik usulda toping.

$$\text{Klassik usulda teskari matritsa } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \quad (2)$$

formula bo'yicha hisoblanadi. Bu yerda $|A|$ berilgan matritsa determinanti. $A_{ij}(i=1, 2, 3; j=1, 2, 3)$ transponirlangan matritsaning algebraik to'ldiruvchilari.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -2 + 12 - 20 - 2 + 15 + 16 = 43 - 24 = 19 \neq 0. \text{ Demak, } A \text{ matritsa maxsusmas}$$

matritsa. A^{-1} teskari matritsa mavjud. Algebraik to'ldiruvchilarini hisoblaymiz:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 8 = 7$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -(-3 + 4) = -1$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 2 = 10$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-5 - 4) = 9$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -(8 - 10) = 2$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -10 - 1 = -11$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 - 3) = 7$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 15 = -13$$

A_{ij} larni (2) formulaga qo'yamiz:

$$A^{-1} = 1/19 \begin{pmatrix} 7 & -1 & 10 \\ 9 & -4 & 2 \\ -11 & 7 & -13 \end{pmatrix} \text{ teskari matritsaning to'g'ri topilganini}$$

$$AA^{-1} = E \quad (3)$$

formula bo'yicha tekshiramiz:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} * 1/19 \begin{pmatrix} 7 & -1 & 10 \\ 9 & -4 & 2 \\ -11 & 7 & -13 \end{pmatrix} = 1/19 * \begin{pmatrix} 14 + 27 - 22 & -2 - 12 + 14 & 20 + 6 - 26 \\ 35 + 9 - 44 & -5 - 4 + 28 & 50 + 2 - 52 \\ 7 - 18 + 11 & -1 + 8 - 7 & 10 - 4 + 13 \end{pmatrix} = 1/19$$

$$* \begin{pmatrix} 19 & 0 & 0 \\ 0 & 19 & 0 \\ 0 & 0 & 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

Demak, A^{-1} to'g'ri topilgan.

Misol 4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -3 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$

$|A| = 16 \neq 0$ teskari matritsa mavjud. Teskari matritsani Jordan usulida topamiz. Berilgan matritsani birlik matritsa hisobida kengaytirib, elementar almashtirishlar bajaramiz, bu usulni to chap tomonda A matritsa o'rnida birlik matritsa hosil bo'lguncha davom ettiramiz, o'ng tomonda hosil bo'lgan matritsa berilgan matritsaga nisbatan teskari matritsa bo'ladi.

$(A|E) \sim (E|A^{-1})$ - Jordan usuli algoritmi.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & | & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -16 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \\
\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/16 & -5/16 & -1/16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & | & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 14/16 & 6/16 & -2/16 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/16 & -5/16 & -1/16 \end{pmatrix} \sim \\
\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -11/16 & -7/16 & 5/16 \\ 0 & 1 & 0 & | & 14/16 & 6/16 & -2/16 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/16 & -5/16 & -1/16 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = 1/16 \begin{pmatrix} -11 & -7 & 5 \\ 14 & 6 & -2 \\ -1 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

teskari matritsa to'g'ri topilganini (3) formulaga qo'yib tekshiramiz:

$$\begin{aligned}
AA^{-1} &= 1/16 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -3 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -11 & -7 & -5 \\ 14 & 6 & -2 \\ -1 & -5 & -1 \end{pmatrix} = \\
&= 1/16 \begin{pmatrix} -11+28-1 & -7+12-5 & 5-4-1 \\ 11-14+3 & 7-6+15 & -5+2+3 \\ -44+42+2 & -28+18+10 & 20-6+2 \end{pmatrix} = \\
&= 1/16 \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{demak, teskari matritsa to'g'ri topilgan.}
\end{aligned}$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Berilgan kvadrat matritsaning determinantlari, normalari va ranglari topilsin:

$$\begin{aligned}
4.1. \quad \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} & \text{b) } A &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 8 \\ 5 & 9 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \\
\text{c) } A &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} & \text{d) } A &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 7 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Quyidagi matritsalar rangini minorlar ajratish usuli bilan hisoblang:

$$4.2. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$4.3. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 \\ -2 & 9 & -4 & 7 \\ -4 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$4.4. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$4.5. \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -10 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4.6. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4.7. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & -5 & -6 \\ 1 & -3 & -4 & -7 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Quyidagi matritsalar rangini elementar almashtirish usuli bilan hisoblang:

$$4.8. \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.9. \quad \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 & 8 & 9 & 2 \\ 3 & 21 & 15 & 24 & 27 & 6 \\ 2 & 14 & 10 & 16 & 18 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.10. \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$$

$$4.11. \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4.12. \quad \begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & -5 \\ 8 & 6 & -1 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$4.13. \quad \begin{pmatrix} 24 & 19 & 36 & 72 & -38 \\ 49 & 40 & 73 & 147 & -80 \\ 73 & 59 & 98 & 219 & -118 \\ 47 & 36 & 71 & 141 & -72 \end{pmatrix}$$

$$4.14. \quad \begin{pmatrix} 17 & -28 & 45 & 11 & 39 \\ 24 & -37 & 61 & 13 & 50 \\ 25 & -7 & 32 & -18 & -11 \\ 31 & 12 & 19 & -43 & -55 \\ 42 & 13 & 29 & -55 & -68 \end{pmatrix}$$

$$4.15. \quad \begin{pmatrix} 47 & -67 & 35 & 201 & 155 \\ 26 & 98 & 23 & -294 & 6 \\ 16 & -428 & 1 & 1284 & 52 \end{pmatrix}$$

Berilgan kvadrat matritsalar uchun teskari matritsani ikki usulda toping:

$$4.16. \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4.17. \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$4.18. \begin{pmatrix} tga & 1 \\ 2 & ctga \end{pmatrix}$$

$$4.19. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4.20. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}$$

$$4.21. \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$4.22. \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

Quyidagi matritsali tenglamalarni eching:

$$4.23. \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$4.24. \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Berilgan matritsalarining determinanti, normali va rangi topilsin:

$$4.25. \text{ a) } A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{ b) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 4 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{ c) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{ d) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Matritsalarining ranglari topilsin:

$$4.26. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$$

$$4.27. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$4.28. \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4.29. \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 7 & 3 & 3 & -1 \\ 8 & 12 & 5 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$4.30. \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4.31. \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Matritsaning teskarisini toping:

$$4.32. \begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.33. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 5 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.34. \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.35. \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Quyidagi matritsali tenglamani eching:

$$4.36. \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & -2 & 3 & -4 & 5 \\ 2 & 11 & 12 & 25 & 22 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 3 & 9 & 15 & 21 & 27 \\ 2 & 11 & 12 & 25 & 22 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 2 & 11 & 12 & 25 & 22 \end{pmatrix}$$

2- satr elementlaridan 1- satr elementlarini ayiramiz:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 11 & 12 & 25 & 22 \end{pmatrix} \quad r(A)=2$$

$$B = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & -4 & 5 & 2 \\ 2 & 11 & 12 & 25 & 22 & 4 \end{array} \right)$$

bu matritsa rangini topish uchun yana yuqoridagi ishni takrorlaymiz, natijada B matritsa quyidagi ko'rinishni oladi.

$$B \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 11 & 12 & 25 & 22 & 4 \end{array} \right), \quad B_1 = \begin{pmatrix} 7 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 25 & 22 & 4 \end{pmatrix}$$

matritsa rangini topamiz:

$$M = |B_1| = \begin{vmatrix} 7 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 25 & 22 & 4 \end{vmatrix} = 225 - 154 = 71; \quad r(B_1) = 3$$

Demak, $r(B)=3$ bo'lib, $r(A) \neq r(B)$ va sistema birgalikda emas.

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 5x_1 + 3x_2 + 8x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

Sistema birgalikda yoki birgalikda emasligini tekshiring.

Ozod hadlar hisobiga kengaytirilgan matritsa tuzamiz:

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

3- satr elementlaridan 1- satr elementlarini ayiramiz:

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 4 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$r(A)=r(B)=2$ ekanini ko'rish mumkin. Demak, sistema birgalikda.

Mustaqil yechish uchun misollar:

Berilgan chiziqli tenglamalar sistemalarining birgalikda yoki birgalikda emasligini tekshiring.

$$5.2. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}$$

$$5.3. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \end{cases}$$

$$5.4. \begin{cases} 2x + 3y + 2z = 9 \\ x + 2y - 3z = 14 \\ 3x + 4y + z = 16 \end{cases}$$

$$5.5. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$5.6. \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ 3x_1 - 5x_2 = 1 \\ 4x_1 - 7x_2 = 1 \end{cases}$$

$$5.7. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3 \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ -x_1 - 2x_2 - 12x_3 - 7x_4 = -4 \\ 3x_1 + 11x_2 + x_3 - 4x_4 = 7 \end{cases}$$

$$5.8. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 - 4x_2 = -1 \\ 7x_1 + 10x_2 = 12 \\ 5x_1 + 6x_2 = 8 \\ 3x_1 - 16x_2 = -5 \end{cases}$$

$$5.9. \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 1 \\ 2x_1 + 10x_2 + 8x_3 = 3 \\ 3x_1 + 15x_2 + 12x_3 = 5 \end{cases}$$

$$5.10. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 + 9x_2 + 6x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \end{cases}$$

$$5.11. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 18 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$5.12. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 5 \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$5.13. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 2 \end{cases}$$

$$5.14. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 5 \end{cases}$$

$$5.15. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 + 9x_5 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 5x_5 = 2 \\ 2x_1 + 11x_2 + 12x_3 + 25x_4 + 22x_5 = 4 \end{cases}$$

$$5.16. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases}$$

$$5.17. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 - 4x_2 = -1 \\ 7x_1 + 10x_2 = 12 \\ 5x_1 + 6x_2 = 8 \\ 3x_1 - 16x_2 = -5 \end{cases}$$

$$5.18. \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2 \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5 \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3 \end{cases}$$

6. CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI KRAMER HAMDA TESKARI MATRITSA USULI BILAN YECHISH

1. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Kramer formulasi determinantlardan foydalanib sistema yechimini topishdir.

Sistema yechimi Kramer formulalari deb atalgan quyidagi formulalar bo'yicha topiladi:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}, \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}.$$

Bu yerda Δ noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan tuzilgan kvadrat matritsa determinanti, $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots, \Delta_n$ lar asosiy matritsada mos ravishda 1, 2, 3, ..., n-ustun elementlarini ozod hadlar bilan almashtirishdan hosil bo'lgan determinantlar. Shuni ta'kidlash kerakki, sistemada noma'lumlar va tenglamalar soni teng bo'lgan hollarda Kramer formulasini qo'llash maqsadga muvofiq.

Agar $\Delta \neq 0$ bo'lsa, sistema yagona yechimga ega bo'ladi.

Agar $\Delta = 0$ bo'lib, $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ lardan kamida bittasi noldan farqli bo'lsa sistema yechimga ega emas.

Agar $\Delta = 0$ bo'lib, $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = \dots = \Delta_n = 0$ bo'lsa, sistema aniqmas, cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Formulani 3 noma'lumli 3 ta chiziqli tenglamalar sistemasi misolida keltiramiz:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (1)$$

sistema uchun

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Buni misollarda ko'ramiz: 6.1-misol.

$$a) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases} \quad \text{sistemani Kramer formulasi bilan yeching.}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -4 + 8 + 9 - 8 - 3 + 12 = 14$$

$\Delta \neq 0$ bo'lgani uchun sistema aniq yagona yechim Kramer formulalari yordamida topiladi.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 8 & 2 & 1 \\ 10 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -32 + 8 + 30 - 8 + 40 - 24 = 14$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 8 & 1 \\ 3 & 10 & 1 \\ 4 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -20 + 32 + 12 - 40 - 4 + 48 = 28$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 3 & 2 & 10 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 + 80 + 72 - 64 - 24 - 30 = 42$$

$$x_1 = \frac{14}{14} = 1, \quad x_2 = \frac{28}{14} = 2, \quad x_3 = \frac{42}{14} = 3. \quad (1; 2; 3)$$

$$b) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2 \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 = 8 \\ 9x_1 + x_2 + 8x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{sistemani Kramer formulasi yordamida yeching.}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 8 & -1 \\ 9 & 1 & 8 \end{vmatrix} = 256 + 6 - 18 - 216 - 32 + 4 = 266 - 266 = 0$$

$\Delta = 0$ Kramer teoremasiga ko'ra, sistema yoki aniqmas, yoki birgalikdamos. Δ_1 ni hisoblaymiz:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 8 & 8 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \end{vmatrix} = -128 + 24 - 128 - 2 = -234 \neq 0$$

$\Delta = 0$, $\Delta_1 \neq 0$ bo'lgani uchun Kramer teoremasiga ko'ra sistema aniqlanmagan.

$$c) \begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = 7 \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -5 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases} \quad \text{Kramer formulasiga ko'ra yeching.}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 20 - 3 - 12 + 5 + 8 - 18 = 33 - 33 = 0$$

$\Delta=0$, demak sistema yoki aniqmas, yoki birgalikdmas. $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ larni hisoblaymiz:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 7 & 1 & -1 \\ -5 & 5 & -3 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -70 + 15 - 3 + 5 - 10 + 63 = 83 - 83 = 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & 7 & -1 \\ 4 & -5 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -20 - 21 - 4 - 5 + 56 - 6 = 56 - 56 = 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 7 \\ 4 & 5 & -5 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -10 - 5 + 84 - 35 - 4 - 30 = 84 - 84 = 0$$

$\Delta=0, \Delta_1=\Delta_2=\Delta_3=0$ bo'lgani uchun sistema aniqmas, cheksiz ko'p yechimga ega.

Sistamani Gauss algoritmi bilan yechamiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -3 & -5 \\ 1 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 7 & -5 & 9 \\ 0 & \frac{7}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{9}{2} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & -1 & 7 \\ 0 & 7 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{berilgan tenglama} \begin{cases} -2x_1 + x_2 = x_3 + 7 \\ 4x_1 + 5x_2 = 3x_3 - 5 \\ x_3 \in R \end{cases} \text{ sistemaga teng kuchli.}$$

Bu tenglamani Kramer formulasi bilan yechish mumkin.

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -10 - 4 = -14$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} x_3 + 7 & 1 \\ 3x_3 - 5 & 5 \end{vmatrix} = 5(x_3 + 7) - 3x_3 + 5 = 5x_3 + 35 - 3x_3 + 5 = 2x_3 + 40 = 2(x_3 + 20)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & x_3 + 7 \\ 4 & 3x_3 - 5 \end{vmatrix} = -2(3x_3 - 5) - 4(x_3 + 7) = -6x_3 + 10 - 4x_3 - 28 =$$

$$= -10x_3 - 18 = -2(5x_3 + 9)$$

$$x_1 = \frac{2(x_3 + 20)}{-14} = -\frac{x_3 + 20}{7}, \quad x_2 = \frac{-2(5x_3 + 9)}{-14} = \frac{5x_3 + 9}{7}$$

Sistema yechimi $\left(-\frac{x_3 + 20}{7}; \frac{5x_3 + 9}{7}; x_3\right)$ bo'ladi.

2. Chiziqli tenglamalar sistemasini teskari matritsa usulida yechish.
Berilgan (1) sistemani

$$AX=B \quad (2)$$

matritsa ko'rinishida yozib olamiz.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

(2) tenglamani har ikki tomonini chapdan A^{-1} teskari matritsaga ko'paytiramiz.

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1} \cdot B, \quad A^{-1} \cdot A = E \text{ bo'lgani uchun}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \quad (3)$$

tenglik hosil bo'ladi.

(3) formula bilan topilgan X ustun matritsa sistemaning yechimi bo'ladi.

1-misolni a)-sini shu usul bilan yechamiz:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

matritsa uchun teskari matritsa mavjud, chunki

$$\Delta = |A| = 14 \neq 0. \quad A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} -7 & 7 & 0 \\ 10 & -6 & 2 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} -7 & 7 & 0 \\ 10 & -6 & 2 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} -56 + 70 \\ 80 - 60 + 8 \\ 8 + 50 - 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix};$$

Javob: (1;2;3).

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi tenglamalar sistemasini Kramer va teskari matritsa usulida yeching.

$$6.2. \begin{cases} x + y - 3z = -1 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + 2y - 4z = 1 \end{cases}$$

$$6.3. \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -1 \\ x_1 - 5x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases}$$

$$6.4. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

$$6.5. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 8x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 12 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases}$$

$$6.6. \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 20 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11 \\ 2x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 7x_4 = 40 \\ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 37 \end{cases}$$

$$6.7. \begin{cases} 2x - y - 6z + 3t + 1 = 0 \\ 7x - 4y + 2z - 15t + 32 = 0 \\ x - 2y - 4z + 9t - 5 = 0 \\ x - y + 2z - 6t + 8 = 0 \end{cases}$$

$$6.8. \begin{cases} 2x + y + 4z + 8t = -1 \\ x + 3y - 6z + 2t = 3 \\ 3x - 2y + 2z - 2t = 8 \\ 2x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

$$6.9. \begin{cases} 3x + 2y + z = 5 \\ x + y - z = 0 \\ 4x - y + 5z = 3 \end{cases}$$

$$6.10. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 5 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -5 \\ 7x_1 + x_2 - x_3 = 10 \end{cases}$$

$$6.11. \begin{cases} 2x - 3y + z = 2 \\ x + 5y - 4z = -5 \\ 4x + y - 3z = -4 \end{cases}$$

$$6.12. \begin{cases} 2x - 4y + 3z = 1 \\ x - 2y + 4z = 3 \\ 3x - y + 5z = 2 \end{cases}$$

$$6.13. \begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ 3x + 2y + 2z = -2 \\ x - 2y + z = 1 \end{cases}$$

$$6.14. \begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x - y - z = 1 \\ x + 3y + 4z = 6 \end{cases}$$

$$6.15. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = -3 \end{cases}$$

$$6.16. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

$$6.17. \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = -7 \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 = 12 \\ 5x_1 - x_2 - 4x_3 = -5 \end{cases}$$

$$6.18. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -7 \end{cases}$$

$$6.20. \begin{cases} 2x - y + 3z = 9 \\ 3x - 5y + z = -4 \\ 4x - 7y + z = 5 \end{cases}$$

$$6.19. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 6 = 0 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_3 + 5x_4 + 8 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 8 = 0 \end{cases}$$

$$6.21. \begin{cases} 2x - 5y + 3z + t = 5 \\ 3x - 7y + 3z - t = -1 \\ 5x - 9y + 6z + 2t = 7 \\ 4x - 6y + 3z + t = 8 \end{cases}$$

7. CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS VA GAUSS-JORDAN USULLARI BILAN YECHISH

1. Gaussning klassik usuli - bu berilgan sistemaning umumiy yechimini topishdan iborat bo'lib, bunda sistemaning tenglamalari ustida elementar almashtirishlar bajarib berilgan sistema trapetsiyali yoki uchburchakli ko'rinishga keltiriladi. So'ng oxirgi tenglamadan boshlab noma'lumlar ketma-ket topiladi.

$$7.1\text{-misol. a) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -4 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 11 \\ 4x_1 - 5x_2 + x_3 = 9 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -4 \\ -8x_2 + 13x_3 = 23 \\ -13x_2 + 17x_3 = 25 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -4 \\ -8x_2 + 13x_3 = 23 \\ -\frac{33}{8}x_3 = -\frac{99}{8} \end{cases}$$

$x_3=3, x_2=2, x_1=4$ Javob: (4;2;3).

2. Gauss-Jordan usuli noma'lumlarni ketma-ket yo'qotish Gauss usuli va teskari matritsa qurish Jordan algoritmgiga asoslangan. Gauss-Jordan usuliga sxema ko'rinishida quyidagicha yoziladi: $(A|B) \sim (E|X)$.

$(A|B)$ -asosiy matritsani ozod hadlar hisobiga kengaytirilgan matritsa.

E - birlik matritsa. X - tenglama yechimini ifodalovchi ustun matritsa.

$$b) \begin{cases} x_1 + x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 8x_4 = -7 \end{cases}$$

Sistemani Gauss-Jordan usuli bilan yeching.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -6 & -4 & 6 \\ 3 & -1 & -6 & -4 & 2 \\ 2 & 3 & 9 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 3 & 8 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -6 & -4 & 6 \\ 0 & -4 & 12 & 8 & -16 \\ 0 & 1 & 21 & 10 & -6 \\ 0 & -1 & 21 & 20 & -25 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -6 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 21 & 10 & -6 \\ 0 & -1 & 21 & 20 & -25 \end{pmatrix} \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -6 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 24 & 12 & -10 \\ 0 & 0 & 18 & 18 & -21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -6 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -5/12 \\ 0 & 0 & 18 & 18 & -21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -5/12 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -27/2 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1/2 & 3/4 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 11/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -5/12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{array} \right)$$

Javob: (0; 2; 1/3; -3/2).

$$\text{c) } \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 6 \end{cases} \quad \text{Berilgan sistema birgalikda, chunki}$$

$$r \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & -4 & 6 \end{array} \right) = r \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & -4 & 6 \end{array} \right)$$

Sistema cheksiz ko'p yechimga ega, umumiy yechimni Gauss-Jordan usuli yordamida topamiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & -4 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3/2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ 0 & 1 & -3/2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_3 = 2 \\ x_2 - \frac{3}{2}x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3 + 2 \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + 1 \end{cases}$$

$$\text{Javob: } \left(\frac{1}{2}x_3 + 2; \frac{3}{2}x_3 + 1; x_3 \right) \quad x_3 \in R.$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi tenglamalar sistemasini Gauss, Gauss-Jordan usuli bilan yeching:

$$7.2. \begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$$

$$7.3. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = -1 \end{cases}$$

$$7.4. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 = -4 \\ 3x_1 - x_2 + 6x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$$

$$7.5. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 6x_4 = 5 \end{cases}$$

$$7.6. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$7.7. \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 - 4x_2 = 1 \end{cases}$$

$$7.8. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = -3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - 4x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 22 \end{cases}$$

$$7.9. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 35 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 15x_5 = 70 \\ x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 35x_5 = 126 \\ x_1 + 5x_2 + 15x_3 + 35x_4 + 70x_5 = 210 \end{cases}$$

$$7.10. \begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x - y - z = 1 \\ x + 3y + 4z = 6 \end{cases}$$

$$7.11. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -6 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -1 \end{cases}$$

$$7.12. \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 = -3 \\ -x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 2 \end{cases}$$

$$7.13. \begin{cases} -x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$$

$$7.14. \begin{cases} x_1 - 3x_2 = -5 \\ -x_1 + x_2 = 1 \\ 4x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$$

$$7.15. \begin{cases} x_1 - x_2 - 3x_3 = 6 \\ -2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = -9 \end{cases}$$

$$7.16. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 15 \\ 4x_1 + x_3 + x_4 = 11 \\ x_1 + x_2 + 5x_4 = 23 \end{cases}$$

$$7.17. \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = -5 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 6x_4 = -10 \end{cases}$$

$$7.18. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 - 7 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 - 3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 2 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 8x_4 + 7 = 0 \end{cases}$$

$$7.19. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 10x_4 + 13x_5 = 12 \\ 3x_1 + 5x_2 + 11x_3 + 16x_4 + 21x_5 = 17 \\ 2x_1 - 7x_2 + 7x_3 + 7x_4 + 2x_5 = 57 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 10x_5 = 7 \end{cases}$$

$$7.20. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 9 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 15 \end{cases}$$

8. n – O'LCHOVLI ARIFMETIK FAZO.

VEKTORLAR SISTEMASI. VEKTORNI VEKTORLAR SISTEMASI BO'YICHA YOYISH

1. n – o'lchovli arifmetik fazo deb, mumkin bo'lgan n ta x_1, x_2, \dots, x_n haqiqiy sonlarning tartiblangan tizimlari to'plamiga aytiladi va R_n kabi belgilanadi.

$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – R_n fazoning arifmetik vektori yoki nuqtasi deyiladi, x_1, x_2, \dots, x_n haqiqiy sonlar \mathbf{x} vektorning koordinatalari yoki komponentlari deyiladi. Komponentlar soni arifmetik vektor yoki nuqta o'lchovi hisoblanadi.

$Oxyz$ koordinatalar sistemasida har qanday \mathbf{x} vektorni $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ko'rinishda yozish mumkin. Vektorning bu ko'rinishda yozilishi uning koordinata o'qlari bo'yicha yoyib yozishdir. a_x, a_y, a_z vektorning koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari. $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - birlik vektorlar.

\mathbf{a} vektor moduli yoki uzunligi $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ formula bo'yicha hisoblanadi.

\vec{a} vektor yo'nalishi vektorning koordinata o'qlari Ox, Oy, Oz bilan hosil qilgan burchaklar bilan aniqlanadi, bu burchaklar kosinuslari:

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|} \quad \text{formula bilan hisoblanadi, bunda}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Uchlari $A(x_1; y_1; z_1), B(x_2; y_2; z_2)$ nuqtalar bilan berilgan \overline{AB} vektor koordinatasi

$$\overline{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$$

ga teng bo'ladi.

$$\cos \alpha = \frac{x_2 - x_1}{|\overline{AB}|}; \quad \cos \beta = \frac{y_2 - y_1}{|\overline{AB}|}; \quad \cos \gamma = \frac{z_2 - z_1}{|\overline{AB}|}$$

1-misol. ABC uchburchakda, AN to'g'ri chiziq BAC burchak bissektressasi hisoblanadi, N nuqta BC tomonda yotadi. Agar $|\overline{AB}| = \bar{b}$, $|\overline{AC}| = \bar{c}$ bo'lsa, \overline{AN} vektor uzunligini toping.

ΔABC dan $\overline{BC} = \bar{c} - \bar{b}$ uchburchakdan ichki burchak bissektressasining xossasiga ko'ra $BN:NC = b:c$ yoki $|BN|:|BC| = b:(b+c)$; $\frac{BN}{c-b} = \frac{b}{b+c}$, bundan $BN = \frac{b(\bar{c} - \bar{b})}{b+c}$

$\overline{AN} = \overline{AB} + \overline{BN}$ bo'lgani uchun $\overline{AN} = \bar{b} + \frac{b}{b+c}(\bar{c} - \bar{b}) = \frac{b\bar{c} + c\bar{b}}{b+c}$ hosil bo'ladi.

2- misol. $A(1; 3; 2)$, $B(5; 8; -1)$ nuqtalar berilgan bo'lsa $\bar{a} = \overline{AB}$ vektorni toping.

AB vektorning proyeksiyalari

$$a_x = x_2 - x_1 = 5 - 1 = 4; \quad a_y = y_2 - y_1 = 8 - 3 = 5; \quad a_z = z_2 - z_1 = -1 - 2 = -3$$

formulalar bo'yicha hisoblanadi. Demak, $\overline{AB} = 4\bar{i} + 5\bar{j} - 3\bar{k}$ ko'rinishda yoziladi.

n - o'lchovli arifmetik vektorlar ustida quyidagi chiziqli amallarni bajarish mumkin.

$\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\bar{y} = (y_1; y_2; \dots; y_n)$ n - o'lchovli vektorlar va $\lambda > 0$ haqiqiy son belirgan bo'lsin.

1) Vektorlarni qo'shish uchun mos koordinatalari qo'shiladi:

$$\bar{x} + \bar{y} = (x_1 + y_1; x_2 + y_2; \dots; x_n + y_n)$$

2) \bar{x} vektorni λ songa ko'paytirish uchun berilgan vektorning har bir koordinatasini λ soniga ko'paytiriladi:

$$\lambda \bar{x} = (\lambda x_1; \lambda x_2; \dots; \lambda x_n)$$

3) \bar{x} ; \bar{y} vektorlarning skalyar ko'paytirish uchun mos koordinatalari ko'paytirilib, yig'indisi olinadi:

$$(\bar{x}\bar{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

4) Vektorlar uzunliklari $|\bar{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ formula bo'yicha topiladi.

5) \bar{x} ; \bar{y} vektorlar orasidagi burchak

Vektorlar sistemasi va $\overline{b}(b_1; b_2; \dots; b_m)$ vektor berilgan bo'lsa \overline{b} vektorni sistema vektorlari bo'yicha yoyish uchun $\sum_{j=1}^m \overline{a}_j x_j = \overline{b}$ chiziqli tenglamalar sistemasining yechimlaridan birini ko'rsatish yetarli.

Agar chiziqli tenglamalar sistemasi birgina yechimga ega bo'lsa, \overline{b} vektor sistema vektorlari bo'yicha birgina usulda, agar cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsa, cheksiz ko'p usulda yoyiladi, agar yechimga ega bo'lmasa \overline{b} vektorni sistema vektorlari bo'yicha yoyib bo'lmaydi.

2- misol.

$\overline{b}(3; -1; 4; 5)$ vektorni

$\overline{a}_1(2; 1; 3; 2), \overline{a}_2(1; -2; 4; -4), \overline{a}_3(3; 1; -5; 2), \overline{a}_4(-4; -3; 1; -6)$ vektorlar sistemasi bo'yicha yoying.

Buning uchun $\overline{b} = \overline{a}_1 x_1 + \overline{a}_2 x_2 + \overline{a}_3 x_3 + \overline{a}_4 x_4$ vektor tenglama tuzib, uni Gauss - Jordan usulida yechamiz: $(A|B) \sim (E|X)$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 3 & -4 & 3 \\ 1 & -2 & 1 & -3 & -1 \\ 3 & 4 & -5 & 1 & 4 \\ 2 & -4 & 2 & -6 & 5 \end{array} \right) \text{ berilgan vektorlar sistemasi koordinatalaridan}$$

tuzilgan matritsani ozod hadlar ustuni hisobiga kengaytirilgan matritsa. A matritsa o'rnida birlik matritsa hosil qilish uchun 2-satr elementlarini (-2) ga ko'paytirib 1-satrga, (-3) ga ko'paytirib 3-satrga, (-2) ga ko'paytirib 4-satrga qoshamiz:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 10 & -8 & 10 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right) \text{ bundan sistemaning yechimga ega emasligi ko'rinadi: } 7 \neq 0.$$

Demak, \overline{b} vektorni $\overline{a}_1, \overline{a}_2, \overline{a}_3, \overline{a}_4$ vektorlar sistemasi bo'yicha yoyish mumkin emas.

3-misol. $\overline{b}(5; 1; 6)$ vektorni

$\overline{a}_1(1; 2; 1), \overline{a}_2(2; -1; 3), \overline{a}_3(3; -1; 4)$ vektorlar sistemasi bo'yicha yoying.

Vektor tenglama tuzib Gauss - Jordan usulida yechamiz:

$$\overline{b} = \overline{a_1}x_1 + \overline{a_2}x_2 + \overline{a_3}x_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & -5 & -7 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 7/5 & 9/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 7/5 & 9/5 \\ 0 & 0 & -2/5 & -4/5 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 7/5 & 9/5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right); \quad \begin{array}{l} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 2 \end{array} \quad \overline{b} = \overline{a_1} - \overline{a_2} + 2\overline{a_3}$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

8.1. $\overline{r} = \overline{OM} = 2\overline{i} + 3\overline{j} + 6\overline{k}$ vektorni yasang va uning radius vektori uzunligini hamda yo'nalishini aniqlang. $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ formula bo'yicha tekshiring.

8.2. M nuqtaning radius vektori Ox o'q bilan 45° va Oy o'q bilan 60° burchak hosil etadi. Vektorning uzunligi $r=6$. Agar M ning applikasi manfiy bo'lsa, uning koordinatalarini aniqlang va $\overline{OM} = \overline{r}$ vektorni $\overline{i}, \overline{j}, \overline{k}$ lar orqali ifodalang.

8.3. xOy tekislikda $A(4;2)$, $B(2;3)$, $C(0;5)$ nuqtalar berilgan va $\overline{OA} = \overline{a}$, $\overline{OB} = \overline{b}$, $\overline{OC} = \overline{c}$ vektorlar yasalgan. \overline{a} vektor \overline{b} va \overline{c} vektorlar bo'yicha topilsin.

8.4. Parallelogrammning ketma-ket uchta $A(1; -2; 3)$, $B(3; 2; 1)$, $C(6; 4; 4)$ uchlari berilgan. Uning to'rtinchi uchini toping.

8.5. Uchlari $A(2; -1; 3)$, $B(1;1;1)$, $C(0;0;5)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchak ABC ning burchaklari aniqlansin.

8.6. $\overline{a} = 2\overline{i} + \overline{j}$ va $\overline{b} = -2\overline{j} + \overline{k}$ vektorlarda yasalgan parallelogramm diagonallari orasidagi burchak topilsin.

8.7. $\overline{a} = \overline{i} + \overline{j} + 2\overline{k}$ va $\overline{b} = \overline{i} - \overline{j} + 4\overline{k}$ vektorlar berilgan. $\text{Pr}_{\overline{b}} \overline{a}$ va $\text{Pr}_{\overline{a}} \overline{b}$ aniqlansin.

8.8. 1) Agar m va n o'zaro 30° burchak tashkil etuvchi birlik vektorlar bo'lsa, $(m+n)^2$ hisoblansin.

2) Agar $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$ hamda $(\vec{a} \wedge \vec{b}) = 135^\circ$ bo'lsa, $(a-b)^2$ hisoblansin.

8.9. O'zaro komplanar \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} vektorlar berilgan bo'lib, $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 5$ va $(\vec{a} \wedge \vec{b}) = 60^\circ$, $(\vec{b} \wedge \vec{c}) = 60^\circ$ bo'lsa, $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ vektor yasalsin, $|\vec{u}| = \sqrt{(a+b+c)^2}$ formula bo'yicha uning moduli hisoblansin.

8.10. Teng yonli $OACB$ trapetsiyada M va N nuqtalar mos ravishda $BC=2$, $AC=2$ tomonlarning o'rtalari. Trapetsiyaning o'tkir burchagi 60° ga teng. \vec{OM} va \vec{ON} vektorlar orasidagi burchak aniqlansin.

8.11. $\vec{a}(2;-1;3;4)$, $\vec{b}(5;2;-2;6)$ vektorlar berilgan:

- $2\vec{a}$, $5\vec{a} + 3\vec{b}$, $\vec{a} - 2\vec{b}$ vektorlarni;
- (\vec{a}, \vec{b}) ; $(3\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - 2\vec{b})$ skalyar ko'paytmalarini;
- \vec{a} va \vec{b} vektor orasidagi burchakni toping.

Quyidagi \vec{b} vektorlarni berilgan $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ vektorlar sistemasi bo'yicha yoyish mumkin yoki mumkin emasligini ko'rsating va yoying:

8.12. $\vec{b} = (-4;9)$; $\vec{a}_1 = (1;-3)$; $\vec{a}_2 = (2;-5)$;

8.13. $\vec{b} = (8;-3;-10;10)$; $\vec{a}_1 = (1;0;4;3)$; $\vec{a}_2 = (1;1;-4;5)$;
 $\vec{a}_3 = (1;-2;0;3)$; $\vec{a}_4 = (-2;3;1;4)$

8.14. $\vec{b} = (3;-1;4;5)$; $\vec{a}_1 = (2;1;3;2)$; $\vec{a}_2 = (1;-2;4;-4)$;
 $\vec{a}_3 = (3;1;-5;2)$; $\vec{a}_4 = (-4;-3;1;-6)$

8.15. $\vec{b} = (9;-2;-3)$; $\vec{a}_1 = (1;-1;2)$; $\vec{a}_2 = (-5;-1;-4)$; $\vec{a}_3 = (4;1;5)$

8.16. λ ning qanday qiymatlarida $\vec{b} = (1;3;5)$ vektorni
 $\vec{a}_1 = (3;2;5)$, $\vec{a}_2 = (2;4;7)$, $\vec{a}_3 = (5;6;\lambda)$

vektorlar orqali yoyish mumkin?

8.17. $A(2;2;0)$ va $B(0;-2;5)$ nuqtalar berilgan. $\overline{AB} = \overline{u}$ vektor yasalsin, uning uzunligi va yo'nalishi aniqlansin.

8.18. 1) $(a+b)^2$;

2) $(a+b)^2 + (a-b)^2$ ifodalardagi qavslar ochilsin va hosil bo'lgan formulalarning geometrik ma'nosi aniqlansin.

8.19. Agar \overline{m} va \overline{n} oralaridagi burchak 60° ga teng birlik vektorlar bo'lsa, $\overline{a} = 2\overline{m} + \overline{n}$ va $\overline{b} = \overline{m} - 2\overline{n}$ vektorlardan yasalgan parallelogramm dioganallarining uzunliklari aniqlansin.

8.20. Muntazam tetraedrning bir uchidan o'tkazilgan ikki tekis burchagining bissektrisalari orasidagi burchak aniqlansin.

8.21. $\overrightarrow{OA} = \overline{a}$ va $\overrightarrow{OB} = \overline{b}$ vektorlar berilgan. $|\overline{a}| = 2$; $|\overline{b}| = 4$ va $(\overline{a} \wedge \overline{b}) = 60^\circ$. Uchburchak OAB ning OM medianasi bilan OA tomoni orasidagi bursak aniqlansin.

8.22. Tomonlari 6 va 4 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak uchidan qarshi tomonlarini teng ikkiga bo'luvchi to'g'ri chiziqlar orasidagi burchaklar topilsin.

8.23. \overline{m} va \overline{n} lar o'zaro 120° burchak tashkil etuvchi birlik vektorlar bo'lsa, $\overline{a} = 2\overline{m} + 4\overline{n}$ va $\overline{b} = \overline{m} - \overline{n}$ vektorlar orasidagi burchak topilsin.

8.24. $\overline{a}(1; -3; 2; 0)$, $\overline{b}(4; -2; 1; 3)$, $\overline{c}(5; -3; 2; 1)$, $\overline{d}(1; 2; 2; -3)$ vektorlar uchun quyidagilarni hisoblang:

a) vektorlarning ortogonallarini aniqlang;

b) $(\overline{a} \wedge \overline{b})$, $(\overline{b} \wedge \overline{c})$, $(\overline{b} \wedge \overline{d})$ larni hisoblang.

9. CHIZIQLI BOG'LIQ VA CHIZIQLI ERKLI VEKTORLAR SISTEMASI

N o'lchovli m ta vektorlardan iborat vektorlar sistemasi berilgan bo'lsin.

$$\begin{cases} \overline{a_1} (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}) \\ \overline{a_2} (a_{21} \ a_{22} \ \dots \ a_{2n}) \\ \dots \dots \dots \\ \overline{a_m} (a_{m1} \ a_{m2} \ \dots \ a_{mn}) \end{cases} \quad (1)$$

(1) Vektorlar sistemasi chiziqli erkli yoki chiziqli bog'liq ekanini aniqlash uchun berilgan vektorlar sistemasi vektorlaridan vektor tenglama tuzamiz:

$$\overline{a_1}x_1 + \overline{a_2}x_2 + \dots + \overline{a_m}x_m = \overline{\theta} \quad (2)$$

bu erda $\overline{\theta}$ - n o'lchovli nol vektor. (1) Tenglama m noma'lumli n ta bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi. Bu sistema aniq bo'lib, yagona nol yechimga ega bo'lsa, berilgan vektorlar sistemasi o'zaro chiziqli bog'liq bo'lmagan yoki chiziqli erkli vektorlar sistemasi bo'ladi.

Agar sistema aniqmas bo'lib, nol yechimdan tashqari nolmas yechimlarga ega bo'lsa, vektorlar sistemasi chiziqli bog'liq sistema bo'ladi; bunda x_1, x_2, \dots, x_m lardan kamida bittasi noldan farqli bo'lsa, $\overline{a_1}, \overline{a_2}, \dots, \overline{a_m}$ lardan birini qolgan vektorlar orqali chiziqli ifodalash mumkin, bu esa sistema chiziqli bog'liq ekanini ko'rsatadi. (1) sistemaning chiziqli bog'liq yoki chiziqli erkli ekanini topish uchun vektorlar koordinatalaridan matritsa tuzamiz. Agar $r(A)=m$ bo'lsa, sistema chiziqli erkli, agar $r(A)<m$ bo'lsa, chiziqli bog'liq bo'ladi.

Misol-1. $\overline{a_1}(1;4;5), \overline{a_2}(2;-1;1), \overline{a_3}(-1;1;3)$ vektorlarning chiziqli bog'liq yoki chiziqli erkli ekanini aniqlang.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ matritsa rangini aniqlaymiz.}$$

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 10 - 4 - 5 - 24 - 1 = -27 \neq 0$$

$$r(A) = 3, \quad r(A) = m = 3.$$

Vektorlar sistemasi chiziqli erkli.

Misol-2. $\overline{a_1}(1;3;2)$, $\overline{a_2}(2;7;3)$, $\overline{a_3}(-1;2;-7)$ vektorlarning chiziqli bog'liq yoki chiziqli erkli ekanini aniqlang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 2 & 3 & -7 \end{pmatrix}; \quad M = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 2 & 3 & -7 \end{vmatrix} = -49 + 8 - 9 + 14 + 42 - 6 = 64 - 64 = 0$$

$$M_I = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \neq 0 \quad r(A) = 2,$$

vektorlar soni $m = 3$. $r(A) \neq m$. Vektorlar sistemasi chiziqli bogliq.

Mustaqil yechish uchun misollar:

Vektorlar sistemasining chiziqli bog'liq yoki chiziqli bog'liq emasligini aniqlang.

$$9.1. \overline{a_1} = (1;2;3), \quad \overline{a_2} = (3;6;7)$$

$$9.2. \overline{a_1} = (5;4;3), \quad \overline{a_2} = (3;3;2), \quad \overline{a_3} = (8;1;3)$$

$$9.3. \overline{a_1} = (4;-2;6), \quad \overline{a_2} = (6;-3;9)$$

$$9.4. \overline{a_1} = (4;-5;2;6), \quad \overline{a_2} = (2;-2;1;3), \quad \overline{a_3} = (6;-3;3;9), \quad \overline{a_4} = (4;-1;5;6)$$

$$9.5. \overline{a_1} = (2;-3;1), \quad \overline{a_2} = (3;-1;5), \quad \overline{a_3} = (1;-4;3)$$

$$9.6. \overline{a_1} = (1;0;0;2;5), \quad \overline{a_2} = (0;1;0;3;4), \quad \overline{a_3} = (0;0;1;4;7), \quad \overline{a_4} = (2;-3;4;1;12)$$

$$9.7. \overline{a_1} = (1;1;1), \quad \overline{a_2} = (0;1;1), \quad \overline{a_3} = (0;0;1)$$

$$9.8. \overline{a_1} = (3;2;1), \quad \overline{a_2} = (2;-3;0), \quad \overline{a_3} = (-3;-2;13)$$

$$9.9. \overline{a_1} = (3;2;1), \quad \overline{a_2} = (2;3;1), \quad \overline{a_3} = (-1;-4;-1).$$

$$9.10. \overline{a} = (1;-3;4), \quad \overline{b} = (2;-1;0)$$

$$9.11. \overline{a_1} = (1;3;1;0), \quad \overline{a_2} = (-2;1;-3;-1), \quad \overline{a_3} = (4;0;5;1), \quad \overline{a_4} = (3;2;-1;-4)$$

$$9.12. \overline{x_1} = (-3; -1; 5), \quad \overline{x_2} = (6; -3; 15), \quad \overline{x_3} = (0; -5; 25);$$

$$9.13. \overline{a_1} = (1; 1; 1), \quad \overline{a_2} = (1; 2; 1; 2), \quad \overline{a_3} = (3; 2; -1; -4)$$

$$9.14. \overline{x_1} = (1; -1; 1; 0), \quad \overline{x_2} = (1; 1; -1; 1), \quad \overline{x_3} = (-1; 3; -3; 1)$$

9.15. λ qanday qiymatlarida vektor $\overline{x} = (2; 3; 4)$ ni quyidagi $\overline{a_1}, \overline{a_2}, \overline{a_3}$ vektorlar orqali yoyish mumkin?

$$\overline{a_1} = (1; 2; 3), \quad \overline{a_2} = (3; 1; -1), \quad \overline{a_3} = (2; 1; \lambda)$$

Quyidagi vektorlar sistemasini chiziqli bog'liq yoki chiziqli bog'liq emasligini aniqlang:

$$9.16. \overline{a} = (-3; -2); \quad \overline{b} = (2; 7)$$

$$9.17. \overline{a} = (1; -4; 3); \quad \overline{b} = (2; -7; 6)$$

$$9.18. \overline{a} = (1; -2; -3), \quad \overline{b} = (2; 1; -1), \quad \overline{c} = (3; 7; 4)$$

$$19. \overline{a_1} = (2; 0; -1; 1), \quad \overline{a_2} = (3; 8; 1; 5), \quad \overline{a_3} = (1; 0; 1; -3), \quad \overline{a_4} = (-1; 0; 1; -3)$$

$$9.20. \overline{a_1} = (1; 2; 0); \quad \overline{a_2} = (3; -1; 1); \quad \overline{a_3} = (0; 1; 1)$$

$$9.21. \overline{x_1} = (1; 1; 1; 1), \quad \overline{x_2} = (1; -1; -1; 1), \quad \overline{x_3} = (1; -1; 1; 1), \quad \overline{x_4} = (1; 1; -1; -1)$$

$$9.22. \overline{x_1} = (4; -5; 2; 6), \quad \overline{x_2} = (2; -2; 1; 3), \quad \overline{x_3} = (6; -3; 3; 9), \quad \overline{x_4} = (4; -1; 5; 6)$$

9.23-9.25 misollar uchun

$$\overline{a_1} = (4; 1; 3; -2), \quad \overline{a_2} = (1; 2; -3; 2), \quad \overline{a_3} = (16; 9; 1; 3), \quad \overline{a_4} = (0; 1; 2; 3), \quad \overline{a_5} = (1; -1; 15; 0)$$

vektorlar berilgan bo'lsin.

9.23. $\overline{a_1}, \overline{a_2}, \overline{a_3}, \overline{a_4}, \overline{a_5}$ vektorlar uchun quyidagi kombinatsiyani toping:

$$a) \frac{1}{2}\overline{a_1} + 3\overline{a_2} - \frac{1}{2}\overline{a_4} + \overline{a_5}$$

$$b) \overline{a_2} - 5\overline{a_3} + \overline{a_4} + 2\overline{a_5}$$

Tenglamadan x ni toping:

$$9.24. 2(\overline{a_1} - x) + 3(\overline{a_4} + x) = 0$$

$$9.25. 3(\overline{a_3} + 2x) - 2(\overline{a_5} - x) = 0$$

Quyidagi \overline{b} vektorni $\overline{a_1}, \overline{a_2}, \overline{a_3}, \overline{a_4}$ vektorlar sistemasining chiziqli kombinatsiyasi ko'rinishida yoyish mumkin yoki mumkin emasligini ko'rsating:

$$9.26. \overline{b_1} = (-5; -3; -2), \quad \overline{a_1} = (1; 2; 3), \quad \overline{a_2} = (0; 1; -1), \quad \overline{a_3} = (3; 4; -1)$$

$$9.27. \overline{b} = (5; 1; -1; 4), \quad \overline{a_1} = (1; 2; 0; 3), \quad \overline{a_2} = (4; 3; -2; 1), \quad \overline{a_3} = (2; 5; -4; -1), \quad \overline{a_4} = (1; 6; -1; 3)$$

$$a_1(2; 12; 17; 57; 7), \quad a_2(1; 2; 3; 2; 1), \quad a_3(2; 3; 5; -7; 4) \\ a_3(3; 7; 11; 7; 5), \quad a_4(4; 10; 16; 7; 3), \quad a_5(5; 13; 21; 2; 10)$$

$$9.29. \quad b(-5; 1; 2), \quad a_1(1; -1; 4), \quad a_2(-3; 1; -1)$$

$$9.30. \quad b(-2; -5; -1; -10), \quad a_1(-1; 1; 2; 1), \quad a_2(1; 2; -1; 2), \quad a_3(1; -2; -3; 3), \\ a_4(-1; -1; 2; -6)$$

$$9.31. \quad b(3; -1; 4; 5), \quad a_1(2; 1; 3; 2), \quad a_2(1; -2; 4; -4), \quad a_3(3; 1; -5; 2), \\ a_4(-4; -3; 1; -6)$$

λ ning qanday qiymatlari vektor \bar{b} ni quyidagi $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$, vektorlar orqali chiziqli yoyish mumkin:

$$9.32. \quad \bar{a}_1 = (2; 3; 5); \quad \bar{a}_2 = (3; 7; 8); \quad \bar{a}_3 = (1; -6; 1), \quad \bar{b} = (7; -2; \lambda)$$

$$9.33. \quad \bar{a}_1 = (3; 2; 5); \quad \bar{a}_2 = (2; 4; 7); \quad \bar{a}_3 = (5; 6; \lambda); \quad \bar{b} = (2; 4; 6)$$

$$9.34. \quad \bar{a}_1 = (3; 0; 0); \quad \bar{a}_2 = (-1; 1; 0); \quad \bar{a}_3 = (1; 0; 1); \quad \bar{b} = (-1; -1; \lambda)$$

$$9.35. \quad \bar{a}_1 = (0; 1; 0); \quad \bar{a}_2 = (1; 0; 1); \quad \bar{a}_3 = (0; 4; 0); \quad \bar{b} = (2; \lambda; -2) ?$$

10. VEKTORLAR SISTEMASINING RANGI VA BAZISI. VEKTORLAR SISTEMASIDA ELEMENTAR ALMASHTIRISHLAR. KANONIK BAZIS

a_1, a_2, \dots, a_n vektorlar sistemasi berilgan bo'lsin. Berilgan *vektorlar sistemasining bazisi* deb uning chiziqli bog'liq bo'lmagan shunday bir qismiga aytiladiki, bunda berilgan sistemaning har bir vektori bazis vektorlari orqali yoyilishi mumkin bo'ladi. Berilgan vektorlar sistemasining ixtiyoriy bazisi tarkibidagi vektorlar soniga uning *rangi* deyiladi.

1. Misol. Quyidagi vektorlar sistemasining bazislaridan birini quring va rangini aniqlang:

$$a_1(1;2;-1;3), \quad a_2(0;3;4;1), \quad a_3(-2;-1;6;-5), \quad a_4(5;1;2;-4)$$

Yechish: $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = \mathbf{0}$ vektor tenglama umumiy yechimini Gauss-Jordan usulida quramiz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 5 & | & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 4 & 6 & 2 & | & 0 \\ 3 & 1 & -5 & -4 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 5 & | & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -9 & | & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 7 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -19 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 5 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -19 & | & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Yechilgan sistemadan x_1, x_2, x_4 - yechilgan noma'lumlar, x_3 esa erkin noma'lum ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, berilgan vektorlar sistemasining bazisi a_1, a_2 va a_4 vektorlar sistemasi bo'lib, sistemaning rangi bazisidagi vektorlar soni 3 ga teng.

Agar berilgan ikkita n o'lchovli a_1 va a_2 vektorlarning skalyar ko'paytmasi nolga teng bo'lsa, a_1 va a_2 vektorlar o'zaro *ortogonal vektorlar* deyiladi.

n o'lchovli nolmas vektorlardan tarkib topgan vektorlar sistemasi berilgan bo'lib, sistema vektorlarining har qanday ikki jufti o'zaro ortogonal bo'lsa, u holda sistemaga *ortogonal vektorlar sistemasi* deyiladi.

2. Misol. Quyidagi vektorlar sistemasi ortogonalmi?

$$\mathbf{a}_1(0;5;-2), \quad \mathbf{a}_2(29;-2;-5), \quad \mathbf{a}_3(2;4;10)$$

Yechish:

$$(\mathbf{a}_1 * \mathbf{a}_2) = 0 - 10 + 10 = 0$$

$$(\mathbf{a}_1 * \mathbf{a}_3) = 0 + 20 - 20 = 0$$

$$(\mathbf{a}_2 * \mathbf{a}_3) = 58 - 8 - 50 = 0$$

Berilgan vektorlar sistemasi ortogonal vektorlar sistemasi ekan.

Teng o'ldiruvchi n ta $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ chiziqli erkin vektorlar sistemasi ustida *ortogonal vektorlar sistemasini* qurish, ya'ni mos ravishda $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$ ortogonal sistema bilan almashtirish mumkin. Buning uchun *Shmidt formulalaridan* foydalanamiz:

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1$$

$$\mathbf{b}_t = \mathbf{a}_t - \sum_{i=1}^{t-1} \frac{(\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_t)}{(\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_i)} \mathbf{b}_i \quad t \in \{2; 3; \dots; k\}$$

3. Misol. $\mathbf{a}_1(1;1;1), \mathbf{a}_2(0;1;1), \mathbf{a}_3(0;0;1)$ vektorlar sistemasi ustida ortogonal sistema quring. rang $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = 3$ chiziqli erkin sistema ekan.

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1(1;1;1)$$

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2)}{(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1)} \mathbf{b}_1 = (0;1;1) - \frac{2}{3}(1;1;1) = \left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_3 &= \mathbf{a}_3 - \frac{(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3)}{(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1)} \mathbf{b}_1 - \frac{(\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_3)}{(\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_2)} \mathbf{b}_2 = (0;0;1) - \frac{1}{3}(1;1;1) - \frac{1/3}{2/3} \left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) = \\ &= \left(0; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Berilgan vektorlar sistemasi ustida qurilgan ortogonal sistema vektorlarini butun koordinatali vektorlarga aylantirib, $(1;1;1); (-2;1;1); (0;-1;1)$ natijani olamiz.

Nolmas \mathbf{b} vektorning *normallangan* yoki *birlik vektori* deb, $\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ vektorga aytiladi.

Har bir vektori normallangan, ya'ni birlik vektor ko'rinishiga keltirilgan ortogonal sistemaga *ortonormallangan vektorlar sistemasi* deyiladi.

4. Misol. Yuqoridagi misolda topilgan ortonormal $\mathbf{b}_1(1;1;1)$; $\mathbf{b}_2(-2;1;1)$; $\mathbf{b}_3(0;-1;1)$ sistemaning har bir vektorini birlik ko'rinishga keltiramiz.

$$\frac{\mathbf{b}_1}{|\mathbf{b}_1|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}}(1;1;1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\frac{\mathbf{b}_2}{|\mathbf{b}_2|} = \frac{1}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 1^2}}(-2;1;1) = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

$$\frac{\mathbf{b}_3}{|\mathbf{b}_3|} = \frac{1}{\sqrt{0^2 + (-1)^2 + 1^2}}(0;-1;1) = \left(0; -\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

n o'lchovli birlik $\mathbf{e}_1(1;0;0; \dots; 0), \mathbf{e}_2(0;1;0; \dots; 0), \dots, \mathbf{e}_n(0;0;0; \dots; 1)$ vektorlar *kanonik bazis*ni tashkil qiladi.

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyida berilgan vektorlar sistemasining bazislaridan birini quring va ranglarini aniqlang:

10.1. $\mathbf{a}_1=(1;-2;-5), \mathbf{a}_2=(3;4;-1), \mathbf{a}_3=(2;-3;0)$

10.2. $\mathbf{a}_1=(1;1;-2;-5), \mathbf{a}_2=(3;4;-1;2), \mathbf{a}_3=(4;1;-2;3), \mathbf{a}_4=(5;2;-3;1)$

10.3. $\mathbf{e}_1; \mathbf{e}_2; \mathbf{e}_3$ bazisda $\mathbf{a}_1=(1;1;0), \mathbf{a}_2=(1;-1;1), \mathbf{a}_3=(-3;5;6)$ vektorlar berilgan. $\mathbf{a}_1; \mathbf{a}_2; \mathbf{a}_3$ vektorlar bazisni tashkil qilishini ko'rsating.

10.4. $\mathbf{e}_1; \mathbf{e}_2; \mathbf{e}_3$ bazisda vektor $\mathbf{b}=(4;-4;5)$ berilgan. Shu vektorni quyidagi $\mathbf{a}_1; \mathbf{a}_2; \mathbf{a}_3$ bazisda ifodalang: $\mathbf{a}_1=(1;1;0), \mathbf{a}_2=(1;-1;1), \mathbf{a}_3=(-3;5;-6)$

10.5. $\mathbf{e}_1; \mathbf{e}_2; \mathbf{e}_3$ bazisda berilgan $\mathbf{a}=(1;2;0), \mathbf{b}=(3;-1;1), \mathbf{c}=(0;1;1)$ vektorlar o'zlari bazis tashkil qilishini ko'rsating.

10.6. $\mathbf{e}_1; \mathbf{e}_2; \mathbf{e}_3$ bazisda quyidagi $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vektorlar berilgan:
 $\mathbf{a}=\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2+\mathbf{e}_3, \mathbf{b}=2\mathbf{e}_2+3\mathbf{e}_3, \mathbf{c}=\mathbf{e}_2+5\mathbf{e}_3.$ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vektorlar bazis tashkil qilishini isbotlang.
 Vektor $\mathbf{d}=2\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2+\mathbf{e}_3$ ni $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ bazisdagi koordinatalarini toping.

Quyidagi vektorlar sistemasining bazislarini toping:

10.7. $\mathbf{a}_1=(1;2;0;0); \mathbf{a}_2=(1;2;3;4); \mathbf{a}_3=(3;6;0;0);$

10.8. $\mathbf{a}_1=(1;2;3;4); \mathbf{a}_2=(2;3;4;5); \mathbf{a}_3=(3;4;5;6); \mathbf{a}_4=(4;5;6;7);$

Berilgan vektorlar sistemasining rangi va barcha bazislari topilsin:

10.9. $\mathbf{a}_1=(1;2;0;0)$; $\mathbf{a}_2=(1;2;3;4)$; $\mathbf{a}_3=(3;6;0;0)$;

10.10. $\mathbf{a}_1=(1;2;3;4)$; $\mathbf{a}_2=(2;3;4;5)$; $\mathbf{a}_3=(3;4;5;6)$; $\mathbf{a}_4=(4;5;6;7)$;

10.11. $\mathbf{a}_1=(2;1;-3;1)$; $\mathbf{a}_2=(4;2;-6;2)$; $\mathbf{a}_3=(6;3;-9;3)$; $\mathbf{a}_4=(1;1;1;1)$;

Vektorlar juftliklari o'zaro ortogonalmi:

10.12. $\mathbf{a}_1(4;-5)$ va $\mathbf{a}_2(1;0)$;

10.13. $\mathbf{a}_1(4;1;2)$ va $\mathbf{a}_2(-1;0;2)$;

10.14. $\mathbf{a}_1(2;0;4;-1)$ va $\mathbf{a}_2(1;2;3;4)$;

10.15. $\mathbf{a}_1(1;3;2;-3)$ va $\mathbf{a}_2(1;1;1;2)$?

Quyida berilgan chiziqli erkli vektorlar sistemalari ustida ortogonal va ortonormallangan vektorlar sistemalari qurilsin:

10.16. $\mathbf{a}_1(1;0)$ va $\mathbf{a}_2(1;1)$

17. $\mathbf{a}_1(1;1;1;0)$, $\mathbf{a}_2(0;1;1;1)$, $\mathbf{a}_3(0;0;1;1)$

Quyida berilgan vektorlar sistemasining rangi va bazislari topilsin:

10.18. $\mathbf{a}_1=(5;2;-3;1)$; $\mathbf{a}_2=(4;1;-2;3)$; $\mathbf{a}_3=(1;1;-1;2)$; $\mathbf{a}_4=(3;4;-1;2)$

10.19. $\mathbf{a}_1=(2;-1;3;5)$; $\mathbf{a}_2=(4;-3;1;3)$; $\mathbf{a}_3=(3;-2;3;4)$; $\mathbf{a}_4=(4;-1;15;17)$;
 $\mathbf{a}_5=(7;-6;-7;0)$

10.20. $\mathbf{a}_1=(2;1;-3;1)$; $\mathbf{a}_2=(4;2;-6;2)$; $\mathbf{a}_3=(6;3;-9;3)$; $\mathbf{a}_4=(1;1;1;1)$

10.21. $\mathbf{a}_1=(1;2;3)$; $\mathbf{a}_2=(2;3;4)$; $\mathbf{a}_3=(3;2;3)$; $\mathbf{a}_4=(4;3;4)$ $\mathbf{a}_5=(1;1;1)$

10.22. $\mathbf{a}_1=(5;2;-3;1)$; $\mathbf{a}_2=(4;1;-2;3)$; $\mathbf{a}_3=(1;1;-1;-2)$; $\mathbf{a}_4=(3;4;-1;2)$

10.23. $\mathbf{a}_1=(2;-1;3;5)$; $\mathbf{a}_2=(4;-3;1;3)$; $\mathbf{a}_3=(3;-2;3;4)$; $\mathbf{a}_4=(4;-1;15;17)$;
 $\mathbf{a}_5=(-7;-6;-7;0)$

Quyida berilgan chiziqli erkli vektorlar sistemalari ustida ortogonal va ortonormallangan vektorlar sistemalari qurilsin:

10.24. $\mathbf{a}_1(1;1)$, $\mathbf{a}_2(0;2)$

10.25. $\mathbf{a}_1(1;0;1;0)$, $\mathbf{a}_2(0;1;1;1)$, $\mathbf{a}_3(1;1;0;1)$

10.26. $\mathbf{a}_1(1;1;1;1)$, $\mathbf{a}_2(1;1;1;0)$, $\mathbf{a}_3(1;0;1;1)$

11. VEKTOR KO`RINISHIDA YOZILGAN CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINING BIRGALIKDALIK VA ANIQLIK SHARTLARI. FUNDAMENTAL YECHIMLAR

m ta noma'lumli n ta chiziqli bir jinsli tenglamalar sistemasi vektor shaklda berilgan bo'lsin:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m = \theta$$

$\text{rang}(a_1, a_2, \dots, a_m) = \text{rang}(a_1, a_2, \dots, a_m, \theta)$ bo'lgani uchun sistema har doim birgalikda. $\text{Rang}(a_1, a_2, \dots, a_m) = m$ munosabat o'rinli bo'lsa, sistema aniq va yagona nol yechimga ega.

$\text{Rang}(a_1, a_2, \dots, a_m) < m$ munosabat o'rinli bo'lsa, sistema aniqmas va trivial yechimdan tashqari nolmas yechimlarga ham ega bo'ladi. Ushbu holda, har bir nolmas yechim m o'lchovli vektor sifatida qaralishi mumkin.

Bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasining fundamental yechimlari sistemasi yoki tizimi deb, uning chiziqli bog'liq bo'lmagan nolmas F_1, F_2, \dots, F_k yechimlariga aytiladiki, sistemaning har bir yechimi ushbu yechimlarning chiziqli kombinatsiyasi ko'rinishida aniqlanishi mumkin.

Agar $\text{rang}(a_1, a_2, \dots, a_m) = r < m$ bo'lsa, sistema o'zining fundamental yechimlari tizimi mavjudligi bilan xarakterlanadi va tizim har biri m o'lchovli $m-r$ ta nolmas vektorlardan tarkib topadi.

Bir jinsli sistemaning fundamental yechimlari tizimi quyidagicha quriladi:

1. Bir jinsli sistemaning umumiy yechimi quriladi;
2. $m-r$ o'lchovli $m-r$ ta vektorlardan iborat chiziqli erkli vektorlar sistemasi, masalan: $e_1(1;0;\dots;0)$, $e_2(0;1;0;\dots;0)$, ..., $e_{m-r}(0;0;\dots;1)$ tanlanadi;
3. Umumiy yechim erkli noma'lumlari o'rniga e_1 vektor mos koordinatalarini qo'yib, bazis noma'lumlar aniqlanadi va mos ravishda F_1 fundamental yechim quriladi. Shuningdek, e_2, e_3, \dots, e_{m-r} vektorlardan foydalanib, mos ravishda F_2, F_3, \dots, F_{m-r} fundamental yechimlar quriladi.

1. Misol. Bir jinsli sistemaning fundamental yechimlari tizimidan birini quring va uning umumiy yechimini vektor shaklda aniqlang:

$$\begin{cases} 4x_1 + 7x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Sistemaning umumiy yechimini Gayss-Jordan usulida quramiz:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 7 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -5 & 6 & -5 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1,2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2,6 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$m=4$, $r=2$ bo'lgani uchun $m-r=2$ ta chiziqli erkli $e_1(1;0)$ va $e_2(0;1)$ sistemani tanlaymiz. $e_1(1;0)$ vektor koordinatalarini umumiy yechimning mos erkli nomalumlari o'rniga qo'yib, bazis nomalumlarni aniqlaymiz va $F_1(-2,6;1,2;1;0)$ fundamental echimni quramiz. $e_2(0;1)$ vektor yordamida $F_2(1;-1;0;1)$ fundamental yechimni quramiz. Boshqacha qilib aytganda kengaytirilgan matritsadagi koeffitsiyentlarni sistemaga qo'yamiz:

$$\begin{cases} x_2 - 1,2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2,6x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \begin{cases} x_1 = -2,6x_3 + x_4 \\ x_2 = 1,2x_3 - x_4 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

Fundamental yechimlar $F_1(4,6;1,2;1;0)$ va $F_2(1;-1;0;1)$ quriladi.

Umumiy yechimni tuzamiz:

$$X = \lambda_1 F_1 + \lambda_2 F_2 = \lambda_1 \begin{pmatrix} -2,6 \\ 1,2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bu yerda λ_1 va λ_2 lar ixtiyoriy haqiqiy sonlar.

m ta nomalumli n ta chiziqli bir jinsli bo'lmagan tenglamalar sistemasi vektor shaklda berilgan bo'lsin:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m = b \quad (b \neq 0)$$

Sistemaning umumiy yechimini vektor shaklda yozish mumkin:

$$X = F_0 + \lambda_1 F_1 + \lambda_2 F_2 + \dots + \lambda_{m-r} F_{m-r}$$

Bu yerda F_0 - bir jinslimas sistemaning xususiy yechimlaridan biri, F_1, F_2, \dots, F_{m-r} - berilgan sistemaga mos ravishdagi

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m = \theta$$

bir jinsli tenglamalar sistemasining fundamental yechimlari tizimi,

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m-r}$ -ixtiyoriy haqiqiy sonlar.

2. Misol. Berilgan sistema umumiy yechimini vektor shaklda quring:

$$\begin{cases} 4x_1 + 7x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 8 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 - x_4 = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 7 & 2 & 3 & 8 \\ 1 & 3 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -5 & 6 & -5 & -4 \\ 1 & 3 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & 6 & -5 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1,2 & 1 & 0,8 \\ 1 & 0 & 2,6 & -1 & 0,6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$F_0(0,6; 0,8; 0; 0)$ sistemaning xususiy yechimlaridan birini qurdik.

Sistema umumiy yechimi vektor shaklini yozamiz:

$$X = F_0 + \lambda_1 F_1 + \lambda_2 F_2 = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -2,6 \\ 1,2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bu yerda λ_1 va λ_2 lar ixtiyoriy haqiqiy sonlar.

Mustaqil yechish uchun misollar:

Bir jinsli tenglamalar sistemasini yeching:

$$11.1. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ -2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$11.2. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$11.3. \begin{cases} x_1 - 7x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 7x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 5x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$11.4. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}$$

Bir jinsli bo'lmagan chiziqli tenglamalar sistemalarining fundamental yechimlarini toping:

$$11.5. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 = -4 \end{cases}$$

$$11.6. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

$$11.7. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 4 \end{cases}$$

$$11.8. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = -4 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

$$11.9. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_1 - x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

Sistemani yeching:

$$11.10. \begin{cases} 3x - 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ -3y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$11.11. \begin{cases} 3x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

$$11.12. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$$

$$11.13. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}$$

Sistemalarni fundamental yechimlarini va umumiy yechimini toping:

$$11.14. \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 18 \\ -x_1 - x_2 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

$$11.15. \begin{cases} 3x + 5y + 2z = 0 \\ 5x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$11.16. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 5x_3 + x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}$$

$$11.17. \begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 + 4x_4 - x_5 = 7 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 + 4x_5 = -3 \\ 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 + 3x_5 = 4 \end{cases}$$

$$11.18. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

12. CHIZIQLI FAZO. EVKLID FAZO. ORTOGONAL MATRITSA

12.1. $a_1(0; 1; -3)$, $a_2(3; 5; 0)$, $a_3(1; 2; -1)$ vektorlar sistemalariga tortilgan chiziqli qism osti fazosining bazislaridan birini, o'lchamini hamda ortonormallangan bazisini topamiz:

Buning uchun $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = \theta$ vektor tenglama umumiy yechimini Gauss-Jordan usulida quramiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 15 & 5 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1 , x_3 noma'lumlar umumiy yechimning bazis noma'lumlari. Demak, mos ravishda, a_1 , a_3 vektorlar tizimi berilgan sistemaning bazislaridan birini tashkil etadi. Tizim 2 ta vektordan tarkib topgani uchun, berilgan vektorlar sistemasining o'lchami 2 ga teng.

Bazisni tashkil qiluvchi $a_1(0; 1; -3)$ va $a_3(1; 2; -1)$ vektorlarni ortogonallaymiz:

$$b_1 = a_1(0; 1; -3)$$

$$b_2 = a_3 \frac{(b_1 \cdot a_3)}{(b_1 \cdot b_1)} b_1 = (1; 2; -1) - \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-3) \cdot (-1)}{0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-3)} (0; 1; -3) = (1; 2; -1) - \frac{5}{10} (0; 1; -3) = (1; \frac{3}{2}; \frac{1}{2})$$

hosil bo'lgan ortogonal sistema vektorlarini butun koordinatali vektorlarga aylantirib, $b_1(0; 1; -3)$ va $b_2(2; 3; 1)$ ni olamiz. Bu ortogonal sistemaning har bir vektorini birlik ko'rinishga keltiramiz, ya'ni ortonormallashtiramiz:

$$\frac{b_1}{|b_1|} = \frac{(0; 1; -3)}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-3)^2}} = (0; \frac{1}{\sqrt{10}}; -\frac{3}{\sqrt{10}})$$

$$\frac{b_2}{|b_2|} = \frac{(2; 3; 1)}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2}} = (\frac{2}{\sqrt{14}}; \frac{3}{\sqrt{14}}; \frac{1}{\sqrt{14}})$$

12.2. $x(3; -2; 4)$ vektor e_1 , e_2 , e_3 bazisda berilgan. Vektorning

$$\begin{cases} e'_1 = e_1 + 2e_2 - 3e_3 \\ e'_2 = e_1 + e_2 + e_3 \\ e'_3 = 2e_1 - e_2 + 2e_3 \end{cases}$$

bazisdagi koordinatalarini topamiz:

Koeffitsientlar matritsasi P ning transponirlangan matritsasi P^T ni hosil qilamiz:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

U holda \mathbf{x} vektorning dastlabki bazisdagi koordinatalari uning yangi bazisdagi koordinatalari orqali (matritsa shaklida $\mathbf{x} = P^T \mathbf{x}'$) quyidagicha ifodalanadi:

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 + x'_2 + 2x'_3 \\ x_2 = 2x'_1 + x'_2 - x'_3 \\ x_3 = -3x'_1 + x'_2 + 2x'_3 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ -3 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -5 & 8 \\ 0 & 4 & 8 & 13 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & -12 & -19 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 1/12 \\ 0 & 0 & 1 & 19/12 \end{array} \right)$$

Demak, dastlab berilgan $\mathbf{x}(3; -2; 4)$ vektorning yangi bazisdagi koordinatalari:
 $\mathbf{x}'\left(-\frac{1}{4}; \frac{1}{12}; \frac{19}{12}\right)$

Ta'rif: $P \cdot P^T = P \cdot P^{-1} = E$ shartni bajaruvchi P matritsaga ortogonal matritsa deyiladi.

12.3. Quyidagi matritsa ortogonal matritsa bo'lishini tekshiramiz :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$P \cdot P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

Demak, berilgan P matritsa ortogonal matritsa bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi vektorlar sistemalariga tortilgan chiziqli qism osti fazosining bazislaridan birini, o'lchamini va ortonormallangan bazisini toping:

12.4. $\mathbf{a}_1(3; -1; 2)$, $\mathbf{a}_2(1; 4; -1)$, $\mathbf{a}_3(7; 2; 3)$

12.5. $\mathbf{x}(2; -1)$ vektor \mathbf{e}_1 , \mathbf{e}_2 , bazisda berilgan. Vektorning $\mathbf{e}_1' = \mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2$; $\mathbf{e}_2' = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ bazisdagi koordinatalarini toping.

Quyidagi matritsalaridan ortogonallarini ajrating:

12.6. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0.5 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

12.7. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

12.8. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

12.9. Quyida berilgan ikki vektorlar sistemalaridan har biri bazis bo'la olishini isbotlang. Ushbu bazislarda berilgan aynan bir vektorning koordinatalari orasida munosabatlarni o'rnatish:

- a) $e_1(1;2), e_2(1;1); e_1'(1;1), e_2'(3;4)$
 b) $e_1(1;3), e_2(2;3), e_1'(1;0), e_2'(0;-3)$
 c) $e_1(2;3), e_2(2;4), e_1'(0;-1), e_2'(6;11)$

12.10. R_3 da i, j, k bazisdan fazoni Oy ordinata o'qi atrofida α burchakka burgandagi bazisga o'tish matritsasini quring.

Quyidagi vektorlar sistemalariga tortilgan chiziqli qism osti fazosining bazislaridan birini, o'lchamini va ortonormallangan bazisini toping:

12.11. $a_1(1;2;-1;3), a_2(0;3;4;1), a_3(-2;-1;6;-5), a_4(5;4;2;-4)$

12.12. $x(3;-2)$ vektor e_1, e_2 bazisda berilgan vektorning $e_1'=2e_1-e_2; e_2'=e_1+e_2$ bazisdagi koordinatalarini toping.

12.13. $x(1;2;-2)$ vektor e_1, e_2, e_3 bazisda berilgan vektorning $e_1'=e_1+e_2-e_3; e_2'=2e_1-e_2+e_3$ bazisdagi koordinatalarini toping.

Quyidagi matritsalaridan ortogonallarini ajrating:

12.14.
$$\begin{pmatrix} \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ -\cos \alpha & 0 & \sin \alpha \end{pmatrix}$$

12.15.
$$\begin{pmatrix} \operatorname{tg} \alpha & \operatorname{tg} \alpha \\ -\operatorname{ctg} \alpha & \operatorname{ctg} \alpha \end{pmatrix}$$

Quyida berilgan ikki vektorlar sistemalaridan har biri bazis bo'la olishini isbotlang. Ushbu bazislarda berilgan aynan bir vektorning koordinatalari orasida munosabatlarni o'rnatish:

12.16. $e_1(2;1;-1), e_2(3;1;2), e_3(1;0;4)$
 $e_1'(1;1;-1), e_2'(2;3;-2), e_3'(3;4;-4)$

13. CHIZIQLI OPERATOR

13.1. Agar R^3 da chiziqli \tilde{A} operator $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ bazisda o'zining

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 5 & 6 \\ 1 & 8 & 2 \end{bmatrix} \text{ matritsasi bilan berilgan bo'lsa, } \vec{x} = 4\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \text{ vektorning } y = A(x)$$

aksini toping.

$$Y = AX \text{ formulaga binoan, } \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 5 & 6 \\ 1 & 8 & 2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -13 \\ -18 \end{bmatrix}$$

$$\text{Demak, } y = 10e_1 - 13e_2 - 18e_3$$

13.2. \vec{e}_1, \vec{e}_2 bazisda \tilde{A} operator $A = \begin{pmatrix} 17 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ matritsaga ega.

$e_1 = e_1 - 2e_2, \quad e_2 = 2e_2 + e_2$ bazisida \tilde{A} operatorining matritsasini toping.

O'tish matritsasi $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ning teskari matritsasi $C^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{Demak, } B = C^{-1}AC = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 17 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 20 \end{pmatrix}$$

13.3. Chizqli \tilde{A} operator $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$ matritsa bilan berilgan. Chiziqli

operatorning hos qiymatlari va hos vektorlarini toping.

Xarakteristik tenglama tuzamiz:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 4 \\ 9 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad \lambda^2 - 2\lambda - 35 = 0; \quad \lambda_1 = -5, \quad \lambda_2 = 7$$

$\lambda_1 = -5$ ga tegishli $X^{(1)} = (X_1, X_2)$ hos vektorni topamiz. Buning uchun quyidagi tenglamani echamiz:

$$\lambda_1 = -5 \quad (A - \lambda E) \cdot x = 0 \quad \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = -1,5x_1$$

agar $x_1 = C$ deb olsak $x_2 = -1,5C$, $X^{(1)} = (C; -1,5C)$ vektorlar har qanday $C \neq 0$ uchun A operatorini hos qiymati $\lambda_1 = -5$ ga tegishli hos vector bo'ladi. Huddi shunday

$\lambda_2=7$ hos qiymati uchun A operatorni hos vektorlarni $X^{(2)} = \left(\frac{2}{3}C_1, C_1\right)$, $C_1 \neq 0$ vektorlar tashkil etadi.

13.4. Chiziqli operatorning $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$ matritsasini diagonal ko'rinishiga keltiring.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$ matrisa bilan berilgan chiziqli operatorning hos qiymatlari va hos vektorlarning 3-misolda topilgan: $\lambda_1=-5$ $\lambda_2=7$

$X^{(1)} = (C; -1,5C)$; $X^{(2)} = \left(\frac{2}{3}C_1, C_1\right)$; $X^{(1)}$ va $X^{(2)}$ vektorning koordinatalari proporsional emas, shuning uchun $X^{(1)}$ va $X^{(2)}$ vektorlar chiziqli erkli. Demak, $X^{(1)}$ va $X^{(2)}$ bazisda A -matritsaning diagonal ko'rinishi:

$A^* = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ ёки $A^* = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$. Buni tekshirish uchun bazis vektorlar sifatida

$X^{(1)}=(2; -3)$, $X^{(2)}=(4; 6)$ vektorlarni olsak, yangi bazisga o'tkazuvchi o'tish matritsa C ning ko'rinish: $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$ bo'ladi. Diagonal matritsa:

$$A^* = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} -30 & 20 \\ 21 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} -120 & 0 \\ 0 & 168 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

13.5. \vec{e}_1, \vec{e}_2 bazisda chiziqli \tilde{A} operator $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ matritsa bilan berilgan, $x=4e_1-3e_2$ bo'lsa, $y=A(x)$ ni toping.

13.6. $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ bazisda chiziqli \tilde{A} operator $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -7 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ matritsa bilan berilgan $x=2e_1-4e_2-e_3$ bo'lsa, $y=A(x)$ ni toping.

13.7. \vec{e}_1, \vec{e}_2 bazisda \tilde{A} operatorlar $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ matritsaga ega.

$e'_1 = e_2 - 2e_1, \quad e'_2 = 2e_1 - 4e_2$ bazisda \tilde{A} operatorning matritsasini toping.

Berilgan matritsalarining hos qiymatlari va hos vektorlarini toping:

$$13.8. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \qquad 13.9. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$13.10. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

13.11. $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, bazisdan $\vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_1$ bazisga o'tih matritsasini toping.

13.12. $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4$ bazisda \tilde{A} operatorining matritsasi

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ berilgan. Ushbu operatorning}$$

1) $\vec{e}_1, \vec{e}_3, \vec{e}_2, \vec{e}_4$ bazisdagi matritsasini toping;

2) $e_1; \quad e_1 + e_2; \quad e_1 + e_2 + e_3; \quad e_1 + e_2 + e_3 + e_4$ bazisdagi matritsasini toping.

O'zlarining matritsalarini bilan berilgan chiziqli operatorlarning hos qiymatlari va hos vektorlarini toping:

$$13.13. \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \qquad 13.14. \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix};$$

$$13.15. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 2 & 6 & 3 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}; \qquad 13.16. \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix};$$

$$13.17. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Chiziqli operatorning \tilde{A} matritsasini diagonal ko'rinishiga keltiring:

$$13.18. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$13.19. \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 1 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

14. KVADRATIK FORMALAR

14.1. $L(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 12x_1x_2 - 10x_1x_3 + x_2^2 - 3x_3^2$ kvadratik formaning A matritsasini tuzing.

Kvadratik formaning matritsasini topamiz:

$$L = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 4 & -6 & -5 \\ -6 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -6 & -5 \\ -6 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

14.2. $L(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 3x_2^2$ kvadratik forma berilgan.

$x_1 = 2y_1 - 3y_2$; $x_2 = y_1 + y_2$; chiziqli almashtirish orqali hosil bo'lgan

$L(y_1, y_2)$ kvadratik formani toping.

Berilgan kvadratik formaning matritsasi $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ chiziqli almashtirish matritsasi

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ bo'ladi.}$$

Qidirilayotgan kvadratik formaning matritsasini quyidagicha:

$$A' = C^t \cdot A \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -17 \\ -17 & 3 \end{pmatrix}$$

kvadratik formaning ko'rinishi:

$$L(y_1, y_2) = 13y_1^2 - 34y_1y_2 + 3y_2^2$$

14.3. Kvadratik formani – kanonik ko'rinishga keltiring.

$$L(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2 = x_1^2 - x_1(3x_2 - 4x_3) + 2x_2x_3 + x_3^2$$

x_1 o'zgaruvchining kvadrati o'rnida turgan koeffitsiyenti nol'dan farqli bo'lgani uchun, x_1 o'zgaruvchining to'liq kvadratini topamiz:

$$L = \left[x_1^2 - 2x_1 \left(\frac{1}{2}(3x_2 - 4x_3) \right) + \left(\frac{1}{2}(3x_2 - 4x_3) \right)^2 \right] - \left(\frac{1}{2}(3x_2 - 4x_3) \right)^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 =$$

$$\left(x_1 - \frac{3}{2}x_2 + 2x_3 \right)^2 - \frac{9}{4}x_2^2 + 8x_2x_3 - 3x_3^2$$

endi o'zgaruvchi x_2 uchun kvadratini topamiz:

$$L = \left(x_1 - \frac{3}{2}x_2 + 2x_3 \right)^2 - \frac{9}{4} \left(x_2 - \frac{16}{9}x_3 \right)^2 + \frac{37}{9}x_3^2,$$

Demak, no'ldan farqli chiziqli almashtirish

$$y_1 = x_1 - \frac{3}{2}x_2 - 2x_3$$

$$y_2 = x_2 - \frac{16}{9}x_3$$

$y_3 = y_3$ berilgan kvadratik formani kanonik ko'rinishga keltiradi:

$$L(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 - \frac{9}{4}y_2^2 + \frac{37}{9}y_3^2$$

14.4. Kvadratik forma $L = 13x_1^2 - 6x_1x_2 + 5x_2^2$ musbat aniqlangan kvadratik forma ekanligini isbotlang.

Kvadratik formaning matritsasi $A = \begin{pmatrix} 13 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ bo'ladi.

Xarakteristik tenglama tuzamiz:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 13 - \lambda & -3 \\ -3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} \text{ yoki } \lambda^2 - 18\lambda + 56 = 0$$

ya'ni $\lambda_1 = 14$, $\lambda_2 = 4$ xarakteristik tenglamaning yechimlari musbat bo'lgani uchun, L -musbat aniqlangan kvadratik forma bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun misollar:

14.5. Kvadratik formani matritsa ko'rinishida yozing:

$$L = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_1x_3 + 10x_2x_3$$

14.6. Kvadratik formaning matritsasini toping:

$$L(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

14.7. Kvadratik forma $L(x_1, x_2) = 3x_1^2 - x_2^2 + 4x_1x_2$, berilgan.

$x_1 = 2y_1 - y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, chiziqli almashtirish orqali hosil bo'lgan kvadratik formani toping.

14.8. $x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2$

14.9. $-2x_2^2 - x_1^2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 - 2x_3^2$

14.10. $x_1^2 + 26x_2^2 + 10x_1x_2$

Kvadratik formani qanday aniqlanganligini toping:

14.11. $-x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_2^2$

14.12. $x_1^2 + 15x_2^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$

14.13. $12x_1x_2 - 12x_1x_3 + 6x_2x_3 - 11x_1^2 - 6x_2^2 - 6x_3^2$

14.14. $x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 8x_4^2 + 8x_2x_4$

Kvadratik formani kanonik ko'rinishga keltiring:

14.15. $3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3$

14.16. $7x_1^2 + 7x_2^2 + 7x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

14.17. $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

14.18. $17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$

15. TEKISLIKDAGI TO'G'RI CHIZIQ TENGLAMALARI. TO'G'RI CHIZIQ NORMAL TENGLAMASI. NUQTADAN CHIZIQQACHA BO'LGAN MASOFA

1⁰. Tekislikdagi $A(x_1; y_1)$ va $B(x_2; y_2)$ nuqtalar orasidagi masofa:

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (1)$$

2⁰. Tenglikda yo'naltirilgan kesmaning yoki boshi $A(x_1; y_1)$ va oxiri $B(x_2; y_2)$ bo'lgan \overline{AB} vektorning koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari:

$$\text{Pr}_x \overline{AB} = X = x_2 - x_1, \quad \text{Pr}_y \overline{AB} = Y = y_2 - y_1 \quad (2)$$

3⁰. Kesmani berilgan nisbatta bo'lish: $A(x_1; y_1)$ va $B(x_2; y_2)$ nuqtalar berilgan AB kesmani $AN:NB = \lambda$ nisbatda bo'luvchi $N(x; y)$ nuqtaning koordinatalari ushbu:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \quad (3)$$

formulalar bilan aniqlanadi. Xususiyl holda kesmani teng ikkiga, ya'ni $\lambda = 1:1 = 1$ nisbatda bo'lganda

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2} \quad (4)$$

4⁰. Uchlari $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, $C(x_3; y_3)$, ..., $F(x_n; y_n)$ nuqtalarda bo'lgan ko'pburchak yuzi:

$$S = \pm \frac{1}{2} \left[\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} x_n & y_n \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} \right] \quad (5)$$

ga teng.

5⁰. To'g'ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi:

$$y = kx + b \quad (6)$$

k parametr to'g'ri chiziqning Ox o'qqa og'ish burchagi α ning tangensiga teng bo'lib ($k = \text{tg} \alpha$), to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti, ba'zan qiyaligi deyiladi. b parametr boshlang'ich ordinata yoki Oy o'q ajratgan kesma kattaligi.

6⁰. To'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi:

$$Ax + By + C = 0 \quad (A^2 + B^2 \neq 0) \quad (7)$$

Xususiy hollar:

a) $C=0$ bo'lsa, $y = -\frac{A}{B}x$ to'g'ri chiziq koordinatalar boshidan o'tadi;

b) $B=0$ bo'lsa, $x = -\frac{C}{A}=a$ to'g'ri chiziq Ox o'qqa parallel bo'ladi;

c) $A=0$ bo'lsa, $y = -\frac{C}{B}=b$ to'g'ri chiziq Oy o'qqa parallel bo'ladi;


d) $B=C=0$ bo'lsa, $Ax=0$ yoki $x=0$ - to'g'ri chiziq Oy o'qdan iborat;

e) $A=C=0$ bo'lsa, $By=0$ yoki $y=0$ - to'g'ri chiziq Ox o'qdan o'tadi.

7°. To'g'ri chiziqning o'qlardan ajratgan kesmalari bo'yicha tenglamasi:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (8)$$

Bu yerda a va b - to'g'ri chiziqning o'qlardan kesgan kesmalarining kattaliklari.



8°. To'g'ri chiziqning vektor parametrli tenglamasi:

$$\overline{M_0M} = ts \quad (9)$$

Bu yerda $M(x;y)$ to'g'ri chiziqning ixtiyoriy nuqtasi $\overline{M_0M} (x-x_0; y-y_0)$ vektor va $s(m;n)$ yo'naltiruvchi vektori o'zaro kollinear, t -ixtiyoriy haqiqiy son yoki parametr.

9°. (9) tenglamani koordinatalarda

$$\begin{cases} x - x_0 = tm \\ y - y_0 = tn \end{cases} \quad (10)$$

ifodalab, to'g'ri chiziqning parametrli tenglamasini hosil qilish mumkin.

10°. (10) tenglamalarda t parametr yo'qotilsa, to'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi hosil bo'ladi:

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} \quad (11)$$

11^o. Agar $|\bar{a}|=P$ ($P \geq 0$), $\bar{v} = \frac{\bar{a}}{P} = (\cos \alpha, \cos \beta)$ \bar{a} normal radius vektorining

birlik vektori bo'lib, to'g'ri chiziqning ixtiyoriy $M(x;y)$ nuqtasining mos radius vektori $\bar{r}(x;y)$ bo'lsa, u holda \bar{r} radius vektorining \bar{a} yoki \bar{v} vektordagi sonli proyeksiyasi P ga teng:

$$P_{\bar{v}} \bar{r} = P, \quad \text{yoki} \quad |\bar{v}| P_{\bar{v}} \bar{r} = P, \quad \text{yoki} \quad (\bar{r} \bar{v}) = P \quad (P \geq 0) \quad (12)$$

Bu tenglama to'g'ri chiziqning *vektor ko'rinishdagi tenglamasi* deyiladi.

(12) tenglama koordinatalarda

$$x \cos \alpha + y \cos \beta = P \quad \text{yoki} \quad x \cos \alpha + y \sin \alpha = P \quad (P \geq 0) \quad (13)$$

ko'rinishni oladi. Bunda α - \bar{a} yoki \bar{v} vektorning Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchak kattaligi. (13) shakldagi tenglama to'g'ri chiziqning *normal tenglamasi* deyiladi.

12^o. (7) shakldagi tenglamadan (13) shakldagi tenglamaga o'tish uchun umumiy ko'rinishdagi tenglama normallovchi ko'paytuvchi deb ataladigan $\mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ songa ko'paytiriladi, bunda "+" yoki "-" ishoradan C ozod had ishorasining qarama-qarshisi tanlanadi, aks holda $P = -\mu C \geq 0$ munosabat bajarilmaydi.

Masala: $3x+4y-8=0$ tenglamani normal ko'rinishga keltiring .

Berilgan umumiy shakldagi tenglama uchun normallovchi ko'paytuvchi

$$\mu = \pm \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{1}{5}.$$

Tenglamani, $\mu = \frac{1}{5}$ ga ko'paytiramiz, natijada to'g'ri chiziq tenglamasi quyidagi ko'rinishda normal holga keltiriladi:

$$\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y = \frac{8}{5}.$$

13^o. $y=k_1x+b_1$ to'g'ri chiziqdan $y=k_2x+b_2$ to'g'ri chiziqqacha soat strelkasiga qarshi yo'nalishda hisoblanuvchi φ burchak

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \quad (14)$$

formula bilan aniqlanadi.

14°. $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ va $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ tenglamalar bilan berilgan to'g'ri chiziqlar uchun (14) formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1B_2 - A_2B_1}{A_1A_2 + B_1B_2} \quad (15)$$

$$\text{yoki} \quad \cos \varphi = \frac{(n_1 \cdot n_2)}{|n_1| \cdot |n_2|} = \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (16)$$

15°. To'g'ri chiziqning *parallellik* sharti:

$$k_1 = k_2 \quad \text{yoki} \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \quad (17)$$

16°. To'g'ri chiziqning *perpendikulyarlik* sharti:

$$k_1 \cdot k_2 = -1 \quad \text{yoki} \quad A_1A_2 + B_1B_2 = 0 \quad (18)$$

17°. Berilgan $A(x_1; y_1)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar dastasining tenglamasi:

$$y - y_1 = k(x - x_1) \quad (19)$$

18°. Berilgan ikki $A(x_1; y_1)$ va $B(x_2; y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq

$$\text{tenglamasi: } \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (20)$$

19°. Parallel bo'lmagan ikki $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ va $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ to'g'ri chiziqning *kesishish nuqtasini* topish uchun ularning tenglamalarini birgalikda yechish bilan

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -C_1 & B_1 \\ -C_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & -C_1 \\ A_2 & -C_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}} \quad (21)$$

ni hosil qilamiz.

20°. $(x_0; y_0)$ nuqtadan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan d masofani topish uchun to'g'ri chiziq normal tenglamasining chap tomonidagi o'zgaruvchi koordinatalar o'rniga $(x_0; y_0)$ koordinatalarni qo'yib, hosil bo'lgan sonning absolyut qiymatini olamiz, ya'ni

$$d=|x_0 \cos \beta + y_0 \sin \beta - P| \quad (22)$$

$$\text{yoki } d=\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (23)$$

21^o. $Ax+By+C=0$ va $A_1x+B_1y+C_1=0$ to'g'ri chiziqlar orasidagi burchaklar *bissektrissalarining* tenglamalari:

$$\frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \pm \frac{A_1x + B_1y + C_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} \quad (24)$$

22^o. Berilgan ikki to'g'ri chiziqning kesishish nuqtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar *dastasining tenglamasi*:

$$\alpha(Ax + By + C) + \beta(A_1x + B_1y + C_1) = 0 \quad (25)$$

$\alpha=1$ deb olish mumkin, u holda biz (25) dastadan berilgan to'g'ri chiziqlardan ikkinchisini yo'qatgan bo'lamiz, ya'ni u vaqtda (25) dan ikkinchi to'g'ri chiziqning tenglamasini hosil qila olmaymiz.

Mustaqil yechish uchun misollar:

15.1. $\frac{x+2\sqrt{5}}{4} + \frac{y-2\sqrt{5}}{2} = 0$ to'g'ri chiziq berilgan. To'g'ri chiziqning

- a) umumiy tenglamasi,
- b) burchak koeffitsientli tenglamasi,
- c) kesmalarga nisbatan tenglamasini yozing.

15.2. $4x+3y-36=0$ to'g'ri chiziq, koordinata o'qlari bilan hosil qilgan uchburchakning yuzini toping.

15.3. To'g'ri chiziq koordinata o'qlaridan teng kesmalar ajratadi. Agar to'g'ri chiziq koordinata o'qlari bilan hosil qilgan uchburchak yuzi 8 kv.birl. bo'lsa, to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.

15.4. $A(2;5)$ nuqtadan o'tuvchi va ordinata o'qida $b=7$ kesma ajratuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.

15.5. Agar to'g'ri chiziq koordinata o'qlaridan teng kesmalar ajratsa va to'g'ri chiziqni koordinata o'qlari orasidagi kesmasi $5\sqrt{2}$ ga teng bo'lsa, to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.

15.6. $y=-2$, $y=4$ to'g'ri chiziqlar $3x-4y-5=0$ to'g'ri chiziqni A va B nuqtalarda kesib o'tadi. \overline{AB} vektorni uzunligi va uni koordinata o'qlaridagi proyeksiyalarini toping.

15.7. To'g'ri chiziqlar orasidagi burchakni toping:

$$1) \begin{cases} y=2x-3 \\ y=\frac{1}{2}x+1 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 5x-y+7=0 \\ 2x-3y+1=0 \end{cases} \quad 3) \begin{cases} 2x+y=0 \\ y=3x-4 \end{cases}$$

15.8. $3x-2y+7=0$, $6x-4y-9=0$, $6x+4y-5=0$, $2x+3y-6=0$ to'g'ri chiziqlar orasidan parallel va perpendikulyar to'g'ri chiziqlarni aniqlang.

15.9. $A(2;3)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar dastasini yozing. Bu dastadan Ox o'qi bilan 1) 45° , 2) 60° , 3) 135° , 4) 0° burchaklar tashkil etuvchi to'g'ri chiziqni toping.

15.10. $A(-2;5)$ nuqta va $2x-y=0$ to'g'ri chiziqni yasang. A nuqtadan o'tuvchi va
1) berilgan to'g'ri chiziqqa parallel

2) berilgan to'g'ri chiziqqa perpendikulyar to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.

15.11. $2x-5y-10=0$ to'g'ri chiziqni koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalariga perpendikulyar qo'yilgan. Ularning tenglamasini yozing.

15.12. $A(-1;3)$ va $B(4;-2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.

15.13. Uchlari $A(-2;0)$, $B(4;-2)$ va $C(4;2)$ bo'lgan uchburchakka BD balandlik va BE mediana o'tkazilgan. AC tomon, BE mediana va BD balandlik tenglamalarini yozing.

15.14. Uchburchak tomonlari quyidagi tenglamalar bilan berilgan:

$x+3y=0$, $x=3$, $x-2y+3=0$. Uchburchakni burchaklari va uchlarini toping.

15.15. Kvadrat tomonlaridan birining tenglamasi $x+3y-7=0$ va diagonallari kesishgan nuqta $P(0;-1)$ berilgan. Kvadratning qolgan uchta tomon tenglamalarini yozing.

15.16. Romb tomonlaridan birining tenglamasi $5x+2y-9=0$. Agar romb diagonallari $O(0;0)$ da kesishgan bo'lib, ulardan birining tenglamasi $y=2x$ bo'lsa, rombning qolgan uchta tomon tenglamasini yozing.

- 15.17. Uchburchak tomonlarining o'rtasi berilgan $P(1;2)$ - AB tomonining o'rtasi, $R(-4;3)$ - BC tomonining o'rtasi, $Q(5;-1)$ - AC tomonining o'rtasi, CF balandlik va AR mediana kesishgan nuqta topilsin.
- 15.18. Rombning ikki qarama-qarshi uchlarining koordinatalari berilgan, $A(1;-4)$ $C(-1;3)$. Romb diagonallarining tenglamasini yozing.
- 15.19. Agar $A(-5;5)$ va $B(3;1)$ uchburchakning uchlari, $D(2;5)$ esa balandliklari kesishgan nuqta bo'lsa, uchburchak tomonlarining tenglamasini yozing.
- 15.20. $2x+2y-5=0$ to'g'ri chiziq Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan qanday burchak hosil qiladi?
- 15.21. Oy o'qidan $b=1$ birlikka teng kesma ajratuvchi Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.
- 15.22. Koordinata boshidan va $A(-2;-3)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.
- 15.23. $M(-3;-4)$ nuqtadan o'tuvchi koordinata o'qlariga parallel to'g'ri chiziqlar tenglamasini yozing.
- 15.24. $O(0;0)$ va $A(-3;0)$ nuqtalar berilgan OA kesmada parallelogramm yasalgan, uning diagonallari $B(0;2)$ nuqtada kesishadi. Parallelogramm tomonlari va diagonallari tenglamasini yozing.
- 15.25. Tomonlari 8 sm va 2 sm bo'lgan teng yonli trapetsiyaning o'tkir burchagi 45° . Trapetsiyaning katta asosi Ox o'qida yotsa, Oy o'qi esa trapetsiyaning simmetriya o'qi bo'lsa, trapetsiyaning tomonlari tenglamasini yozing.
- 15.26. Agar to'g'ri chiziq koordinata o'qlari bilan hosil qilgan uchburchak yuzi 6 kv.b. bo'lsa va to'g'ri chiziq $(-4;6)$ nuqtadan o'tsa, uning tenglamasini yozing.
- 15.27. To'g'ri chiziqlar orasidagi burchakni toping:
- a) $\begin{cases} 3x+2y=0 \\ 6x+4y+9=0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x-4y=0 \\ 8x+6y=11 \end{cases}$
- 15.28. Uchlari $A(-2;0)$, $B(2;4)$ va $C(4;0)$ bo'lgan uchburchak berilgan. Uchburchak tomonlari, AE medianasi, BD balandlik tenglamalarini, AE mediana uzunligini toping.


- 15.29. Tomonlari $x+y=4$, $3x-y=0$, $x-3y-8=0$ tenglamalar bilan berilgan uchburchakni burchaklari, uchlari va uchburchakni yuzini toping.
- 15.30. Koordinatalar boshidan $2x+y=a$ to'g'ri chiziq bilan teng yonli uchburchak hosil qiluvchi ikki o'zaro perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Shu uchburchakning yuzini toping.
- Ko'rsatma: $2x+y=3$ bilan $y=kx$ va $y=-\frac{x}{k}$ to'g'ri chiziqlarning kesishgan nuqtalari M va N ning koordinatalarini topgandan so'ng $OM=ON$ tenglikdan k ni topish kerak.*
- 15.31. Uchburchak AB tomonining tenglamasi $x-3y+3=0$ va AC tomonining tenglamasi $x+3y+3=0$ hamda AD balandligining asosi $D(-1;3)$ berilgan bo'lsa, uchburchakning ikki burchaklari topilsin.
- 15.32. Romb ikki tomonining tenglamalari $x+2y=4$ va $x+2y=10$ hamda diagonallaridan birining tenglamasi $y=x+2$ ma'lum bo'lsa, romb uchlarining koordinatalari hisoblansin.

16. IKKINCHI TARTIBLI EGRI CHIZIQLAR

1⁰. Markazi koordinata boshida, radiusi R bo'lgan aylana tenglamasi (1-rasm):

$$x^2 + y^2 = R^2$$

(1)




1- rasm.

2⁰. Markazi $(a;b)$ nuqtada, radiusi R bo'lgan aylana tenglamasi (2-rasm):


$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

(2)



2-rasm.

3⁰. **Ellips** (3-rasm):



3-rasm.

Fokus deb ataluvchi $F_1(-c;0)$ va $F_2(c;0)$ nuqtalardan $|F_1M| + |F_2M| = 2a$ masofaga teng ixtiyoriy $M(x;y)$ nuqtalar to'plami ellips deyiladi. F_1M va F_2M kesmalar *fokal radiuslar* deyiladi, hamda

$$|F_1M| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$


$$|F_2M| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad (3)$$

ga teng. Ellipsning *kanonik tenglamasi*:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

bunda $b = \sqrt{a^2 - c^2}$. Ellipsning *kichik yarim o'qi* b , *katta yarim o'qi* a . Markazi esa $O(0;0)$ – koordinata boshi. Ellipsning *uchlari* $(-a;0)$, $(a;0)$, $(0;-b)$, $(0;b)$. Ellipsning *simmetriya markazi* $O(0;0)$, *simmetriya o'qlari* Ox , Oy o'qlar. Ellipsning *ekstsentriskligi* $\varepsilon = \frac{c}{a} < 1$ ga aytiladi.

4⁰. **Giperbola** (4-rasm):



4-rasm.

Fokuslar $F_1(-c;0)$ va $F_2(c;0)$ gacha bo'lgan masofalar ayirmasi.

$$\|F_1M\| - \|F_2M\| = 2a$$

ga teng ixtiyoriy $M(x;y)$ nuqtalar to'plamiga *giperbola* deyiladi.

Kanonik tenglamasi:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (5)$$


bunda $b = \sqrt{c^2 - a^2}$. Haqiqiy uchlari: $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$; mavhum uchlari: $B_1(0;-b)$,

$B_2(0;b)$. Giperbolaning asimtotalari: $y = \frac{b}{a}x$ (I va III choraklardan o'tadi) va

$y = -\frac{b}{a}x$ (II va IV choraklardan o'tadi).

Yarim o'qlari teng, ya'ni $a=b$ giperbolaga *teng tomonli giperbola* deyiladi (5-rasm) va $x^2 - y^2 = a^2$ ko'rinishida ifodalanadi.


Ekstrisentrisseti: $\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$



5-rasm.

5⁰. **Parabola** (6-rasm): Fokusi $F(\frac{p}{2};0)$ dan va direktrisasi $x = -\frac{p}{2}$ to'g'ri chizig'igacha teng masofada yotuvchi ixtiyoriy $M(x;y)$ nuqtalar to'plamiga *parabola* deyiladi. Parabolaning *kanonik tenglamasi*:

$$y^2 = 2px \quad (6)$$



Parabolaning uchi koordinata boshi $O(0;0)$. *Fokusdan direktrisa* to'g'ri chizig'igacha bo'lgan masofa p ga teng.

Mustaqil yechish uchun misollar:

- 16.1. $A(-4;6)$ nuqta berilgan. Diametri OA kesma bo'lgan aylana tenglamasini tuzing.
 16.2. $A(-6;0)$ nuqtadan o'tuvchi va Oy o'qiga koordinatalar boshida urinuvchi aylana tenglamasini tuzing.
 16.3. $x^2+y^2+4x-6y=0$ aylananing Oy o'qi bilan kesishgan nuqtalariga o'tkazilgan radiuslari orasidagi burchak topilsin.
 16.4. $A(-1;3)$, $B(0;2)$ va $C(1;-1)$ nuqtalardan o'tuvchi aylana tenglamasi yozilsin.
Ko'rsatma: Izlanayotgan aylananing tenglamasini $x^2+y^2+mx+ny+p=0$ ko'rinishida yozib, undagi x va y lar o'rniga berilgan har bir nuqtaning koordinatalarini qo'ygandan so'ng m , n va p larni topish kerak.
 16.5. $A(4;4)$ nuqtadan va $x^2+y^2+4x-4y=0$ aylana bilan $y=-x$ to'g'ri chiziqning kesishgan nuqtalaridan o'tuvchi aylana tenglamasi yozilsin.

Ellips.

- 16.6. Katta o'qi 8 va kichik o'qi 6 bo'lgan ellipsning tenglamasini tuzing. Ellips tenglamasi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ dan masalani shartiga ko'ra topamiz. $2a=8$, $2b=6$; ya'ni $a=4$, $b=3$. Bularni ellips tenglamasiga qo'yamiz. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$
 16.7. $4x^2 + 9y^2 = 36$ ellips tenglamasidan uning o'qlari, fokuslari va ekstsentrissetini toping.
 $4x^2 + 9y^2 = 36$
 Tenglamani ikkala tomonini 36 ga bo'lamiz. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ $a^2=9$; $a=+3$; $b^2=4$;
 $b=+2$; $c^2=a^2-b^2$ dan $c^2=9-4=5$; $c=+\sqrt{5}$; $\varepsilon=\frac{\sqrt{5}}{3}$.
 Demak, $2a=6$; $2b=4$;
 $F_1(\sqrt{5},0)$; $F_2(-\sqrt{5},0)$; $\varepsilon=\frac{\sqrt{5}}{3} < 1$
 16.8. Katta yarim o'qi $a=5$ va c parametri
 1) 4.8; 2) 4; 3) 3; 4) 1.4; 5) 0
 Berilgan ellipsni kanonik tenglamasini yozing. Har bir ellipsni chizing va ularning ekstsentrissetini toping.
 16.9. Yer fokuslaridan birida Quyosh joylashgan ellips bo'yicha harakat qiladi. Quyoshdan Yergacha bo'lgan eng kichik masofa taxminan 147.5 million km ga, eng katta masofa 152.5 million km ga teng bo'lsa, Yer orbitasining katta yarim o'qi va ekstsentrisseti topilsin.

- 16.10. Ekstsentrisseti $\varepsilon = \frac{3}{4}$ bo'lgan va $M = (-4; \sqrt{21})$ nuqtadan o'tuvchi ellips tenglamasini yozing va M nuqtaning fokal radius-vektorlarini toping.
- 16.11. Koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan ellips $M(2; \sqrt{3})$ va $B(0; 2)$ nuqtalaridan o'tadi. Uning tenglamasi yozilsin va M nuqtadan fokuslarigacha bo'lgan masofa topilsin.
- 16.12. $9x^2 + 25y^2 = 225$ ellipsda shunday $M(x; y)$ nuqta topilsinki, undan o'ng fokusgacha bo'lgan masofa chap fokusgacha bo'lgan masofadan 4 marta katta bo'lsin.
- 16.13. Agar ellipsning fokuslari orasidagi masofa uning katta va kichik yarim o'qlarining uchlari orasidagi masofaga teng bo'lsa, uning ekstsentrisseti topilsin.

Giperbola.

- 16.14. Fokuslari orasidagi masofa $2\sqrt{11}$ bo'lib, o'zi $(9; -4)$ nuqtadan o'tgan giperbola tenglamasini tuzing.

Shartga asosan $2c = 2\sqrt{11}$, bundan $c = \sqrt{11}$. Giperbola $(9; -4)$ nuqtadan o'tganligi uchun bu nuqta giperbola tenglamasini qanoatlantiradi, ya'ni

$$\frac{9^2}{a^2} - \frac{(-4)^2}{b^2} = 1$$

$$81b^2 - 16a^2 = a^2b^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2 = 11 \text{ buni ellips tenglamasiga qo'yamiz.}$$

$$81b^2 - 16(11 - b^2) = (11 - b^2)b^2$$

$$b^4 - 86b^2 - 176 = 0$$

$$b_1^2 = 2; \quad b_2^2 = -83$$

$$a^2 = 11 - b^2 = 9$$

Demak, giperbola tenglamasi quyidagicha bo'ladi: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{2} = 1$

- 16.15. $16x^2 - 2y^2 = 400$ giperbola tenglamasi berilgan. Uning o'qlari, fokuslari, ekstsentrissetini toping va asimptotasinining tenglamasini tuzing.
- 16.16. Giperbolaning ekstsentrisseti $\sqrt{2}$ ga teng va $M(2a; a\sqrt{3})$ nuqtadan o'tadi. Giperbolani sodda teglamasini tuzing.
- 16.17. Giperbolani fokuslari $F_1(-\sqrt{7}; 0)$ va $F_2(\sqrt{7}; 0)$ nuqtalarda joylashgan. Agar Giperbola $A(2; 0)$ nuqtadan o'tsa, uning asimptotalari tenglamasini tuzing.
- 16.18. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ giperbolaning fokusidan asimptotalarigacha bo'lgan masofalar va asimptotalari orasidagi burchak topilsin.
- 16.19. Biror uchidan fokuslarigacha bo'lgan masofalari 9 va 1 ga teng bo'lgan giperbolaning kanonik tenglamasi yozilsin.
- 16.20. $M\left(6; \frac{3}{2}\sqrt{5}\right)$ nuqtadan o'tuvchi, koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan giperbolaning haqiqiy yarim o'qi $a=4$. Giperbolaning chap fokusidan asimptotalariga tushirilgan perpendikulyarning tenglamalari yozilsin.

Parabola.

- 16.21. Parabola $(3; 5)$ nuqtadan o'tadi. Uning kanonik tenglamasini yozing. Parabola $(3; 5)$ nuqtadan o'tganligi uchun tenglamasini qanoatlantiradi.

$$y^2 = 2px \quad x=3 \quad y=5$$

$$25 = 2 \cdot p \cdot 3 \quad 25 = 6p \quad p = \frac{25}{6}$$

Demak, $y^2 = 2 \cdot \frac{25}{6} x$ $y^2 = \frac{25}{3} x$ - parabolaning kanonik tenglamasi.

- 16.22. 1) (0;0) va (1;-3) nuqtalardan o'tuvchi va Ox o'qqa nisbatan simmetrik;
 2) (0;0) va (2;-4) nuqtalardan o'tuvchi va Oy o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan parabola tenglamasi yozilsin.
- 16.23. Agar parabola $x=y$ to'g'ri chiziq va $x^2 + 6x + y^2 = 0$ aylananing kesishish nuqtalaridan o'tsa, uning tenglamasi va direktrisasini yozing.
- 16.24. $y^2 = 6x$ parabolada fokal radius vektor 4.5 ga teng bo'lgan nuqtani toping.
- 16.25. $A(-1;3)$, $B(0;2)$ va $C(1;-1)$ nuqtalardan o'tuvchi aylana tenglamasini yozing.
- 16.26. Ellips $M(2\sqrt{3};\sqrt{6})$ va $A(6;0)$ nutalardan o'tadi. Uning tenglamasini, ekstsentrisiteti va M nuqtadan fokuslargacha bo'lgan masofani yozing.
- 16.27. $x^2 + 4y^2 = 4$ ellipsning, markazi shu ellipsning "yuqori" uchida bo'lgan va uning fokuslaridan o'tuvchi aylana bilan umumiy nuqtalari topilsin.
- 16.28. $y^2 = a^2 + x^2$ giperbola fokuslari koordinatalarini va asimptotalari orasidagi burchakni toping.
- 16.29. Uchlari $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ellipsning fokuslarida, fokuslari esa uning uchlarida bo'lgan giperbola tenglamasini yozing.
- 16.30. 1) (0;0) va (-1;2) nuqtalardan o'tuvchi va Ox o'qiga simmetrik.
 2) (0;0) va (2;4) nuqtalardan o'tuvchi va Oy o'qiga simmetrik bo'lgan parabola tenglamasini yozing.
- 16.31. Markazi $y^2 = 2px$ parabolaning fokusida bo'lib, parabola direktrisasiga urinuvchi aylana tenglamasi yozilsin. Parabola va aylananing kesishgan nuqtalari topilsin.

17. FAZODA TEKISLIK TENGLAMALARI

1⁰. Uch o'lchovli $Oxyz$ koordinatalar sistemasida berilgan tekislik tenglamasi:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0) \quad (1)$$

$\bar{N}(A; B; C)$ tekislikka perpendikulyar bo'lgan *normal vector* deyiladi.

2⁰. $M_1(x_1; y_1; z_1)$ nuqtadan o'tuvchi va $\bar{N}(A; B; C)$ vektorga perpendikulyar *tekislik tenglamasi*:

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0 \quad (2)$$

3⁰. $Ax + By + Cz + D = 0$ tenglamaning maxsus hollari:

- 1) $D=0$ bo'lganda, $Ax + By + Cz = 0$ tekislik koordinatalar boshidan o'tadi;
- 2) $C=0$ bo'lgan, $Ax + By + D = 0$ tekislik Oz o'qiga parallel;
- 3) $C=D=0$ bo'lganda, $Ax + By = 0$ tekislik Oz o'qidan o'tadi;
- 4) $B=C=0$ bo'lganda, $Ax + D = 0$ tekislik yOz tekislikka parallel;
- 5) Koordinata tekisliklarining tenglamalari: $x=0$, $y=0$ va $z=0$.

4⁰. Tekislikning koordinata o'qlaridan ajratgan kesmalar bo'yicha tenglamasi:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (3)$$

5⁰. Ikki tekislik orasidagi burchak:

$$\cos \alpha = \pm \frac{AA_1 + BB_1 + CC_1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \pm \frac{(\bar{N} \cdot \bar{N}_1)}{|\bar{N}| \cdot |\bar{N}_1|} \quad (4)$$

formuladan topiladi, bunda \bar{N} va \bar{N}_1 mos ravishda $Ax + By + Cz + D = 0$ va $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ tekisliklarga normal vektorlari.

$$\text{Parallellik sharti: } \frac{A}{A_1} = \frac{B}{B_1} = \frac{C}{C_1} \quad (5)$$

$$\text{Perpendikulyarlik sharti: } AA_1 + BB_1 + CC_1 = 0 \quad (6)$$

6⁰. $M_0(x_0; y_0; z_0)$ nuqtadan o'tuvchi $Ax + By + Cz + D = 0$ tekislikkacha bo'lgan

$$\text{masofa: } d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (7)$$

7⁰. Berilgan ikki tekislikning *kesishgan chizig'idan* o'tuvchi barcha tekisliklar dastasining tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$\alpha(Ax + By + Cz + D) + \beta(A_1x + B_1y + C_1z + D) = 0 \quad (8)$$

8⁰. Bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan *uchta* $(x_1; y_1; z_1)$, $(x_2; y_2; z_2)$ va $(x_3; y_3; z_3)$ nuqtadan o'tuvchi tekislik tenglamalari:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (9)$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

- 17.1. $M_1(0;-1;3)$ va $M_2(1;3;5)$ nuqtalar berilgan, M_1 nuqtadan o'tuvchi va $N = \overline{M_1 M_2}$ vektorga perpendikulyar tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.2. $M(a;a;0)$ nuqtadan o'tuvchi va \overline{OM} vektorga perpendikulyar tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.3. $A(a;-\frac{a}{2};a)$ va $B(0;\frac{a}{2};0)$ nuqtadan teng uzoqlikda bo'lgan nuqtalar geometrik o'rnining tenglamasi yozilsin.
- 17.4. $M_1(0;1;3)$ va $M_2(2;4;5)$ nuqtalardan o'tuvchi va Ox o'qqa parallel tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.5. Ox o'qdan va $M(0;-2;3)$ nuqtadan o'tuvchi tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.6. Oz o'qdan va $M(2;-4;3)$ nuqtadan o'tuvchi tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.7. Oy o'qqa parallel, Ox va Oz o'qlardan a va c kesmalar ajratuvchi tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.8. $M(2;-1;3)$ nuqtadan o'tuvchi va koordinata o'qlaridan teng kesmalar ajratuvchi tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.9. $M(-4;0;4)$ nuqtadan o'tuvchi va Ox va Oy o'qlaridan $a=4$ va $b=3$ kesmalar ajratuvchi tekislikning tenglamasi yozilsin.
- 17.10. 1) $x-2y+2z-8=0$ va $x+z-6=0$
 2) $x+2z-6=0$ va $x+2y-4=0$
 tekisliklar orasidagi burchak topilsin.
- 17.11. $(2;2;-2)$ nuqtadan o'tuvchi va $x-2y-3z=0$ tekislikka parallel tekislik topilsin.

- 17.12. $(-1;-1;2)$ nuqtadan o'tuvchi va $x-2y+z-4=0$ hamda $x+2y-2z+4=0$ tekisliklarga perpendikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.
- 17.13. $M(-1;2;3)$ nuqtadan OM ga perpendikulyar tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.14. Oy o'qdan va $(4;0;3)$ nuqtadan o'tuvchi tekislikning tenglamasi yozilsin.
- 17.15. Oz o'qqa parallel hamda $M_1(2;2;0)$ va $M_2(4;0;0)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislikning tenglamasi yozilsin.
- 17.16. $M(1;-3;5)$ nuqtadan o'tuvchi va Oy va Oz o'qlardan Ox o'qdagidan ko'ra ikki marta katta kesma ajratuvchi tekislik tenglamasi yozilsin.
- 17.17. $(0;0;a)$ nuqtadan o'tuvchi va $x-y-z=0$ hamda $2y=x$ tekisliklarga perpendikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.
- 17.18. $M_1(-1;-2;0)$ va $M_2(1;1;2)$ nuqtalardan o'tuvchi hamda $x+2y+2z-4=0$ tekislikka perpendikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.
- 17.19. $M_1(1;-1;2)$, $M_2(2;1;2)$ va $M_3(1;1;4)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislikning tenglamasi yozilsin.
- 17.20. Oz o'qdan $2x+y-\sqrt{5}z=0$ tekislik bilan 60° burchak tashkil etuvchi tekislik tenglamasi tuzilsin.
- 17.21. $(5;1;-1)$ nuqtadan $x-2y-2z+4=0$ tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin.
- 17.22. $(4;3;0)$ nuqtadan $M_1(1;3;0)$, $M_2(4;-1;2)$ va $M_3(3;0;1)$ nuqtalardan o'tuvchi tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin.
- 17.23. $4x+3y-5z-8=0$ va $4x+3y-5z+12=0$ parallel tekisliklar orasidagi masofa topilsin. *Ko'rsatma. Birinchi tekislikda ixtiyoriy, masalan $(2;0;0)$ nuqta olib, undan ikkinchi tekislikkacha bo'lgan masofa topilsin.*
- 17.24. $2x-y+3z-9=0$; $x+2y+2z-3=0$; $3x+y-4z+6=0$ tekisliklarning kesishgan nuqtasi topilsin.
- 17.25. $(2;-1;1)$ nuqtadan o'tuvchi va $3x+2y-z+4=0$ va $x+y+z-3=0$ tekisliklarga perpendikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.

18. FAZODA TO'G'RI CHIZIQ TENGLAMASI

- 1⁰. $A(a;b;c)$ nuqtadan o'tuvchi va $P(m;n;p)$ vektorga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamalari. $N(x;y;z)$ -to'g'ri chiziqning ixtiyoriy nuqtasi bo'lsin

$$\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p} \quad (1)$$

Bu tenglamalar to'g'ri chiziqning *kanonik* tenglamalari deyiladi. $P(m;n;p)$ vektor to'g'ri chiziqning yo'naltiruvchi vektori deyiladi.

- 2⁰. (1) tenglamadagi har bir nisbatni t parametrga tenglab, to'g'ri chiziqning

$$\begin{cases} x = mt + a \\ y = nt + b \\ z = pt + c \end{cases} \quad (2)$$

ko'rinishdagi *parametric tenglamalariga* ega bo'lamiz.

- 3⁰. Ikki nuqta $(x_1; y_1; z_1)$ va $(x_2; y_2; z_2)$ dan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamalari:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1} \quad (3)$$

- 4⁰. To'g'ri chiziqning *umumiy tenglamalari*:

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

- 5⁰. *Ikki to'g'ri chiziq orasidagi burchak*

$$\cos \varphi = \frac{m \bullet m_1 + n \bullet n_1 + p \bullet p_1}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} \bullet \sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2}} \quad (5)$$

- 6⁰. $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ to'g'ri chiziq bilan $Ax+By+Cz+D=0$ tekislik orasidagi burchak

$$\sin \varphi = \frac{Am + Bn + Cp}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \bullet \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \quad (6)$$

$$\text{Parallellik sharti: } Am+Bn+Cp=0 \quad (7)$$

$$\text{Perpendikulyarlik sharti: } \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p} \quad (8)$$

- 7⁰. *Tekislik bilan to'g'ri chiziqning kesishgan nuqtasi* (2) ko'rinishidagi to'g'ri chiziqning parametrik tenglamalari tekislikning $Ax+By+Cz+D=0$

tenglamasidagi x, y, z larning t ga nisbatan yozilgan qiymatlarini qo'yamiz.
Hosil bo'lgan tenglamadan t_0 ni, so'ngra kesishgan nuqta koordinatalari x_0, y_0, z_0 ni topamiz.

8⁰. Ikki to'g'ri chiziqlarning bir tekislikda yotish sharti:

$$\begin{vmatrix} a-a_1 & b-b_1 & c-c_1 \\ m & n & p \\ m_1 & n_1 & p_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (9)$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

18.1. $x=4, y=3$ to'g'ri chiziq yasalsin va uning yo'naltiruvchi vektori topilsin.

18.2. 1) $\begin{cases} y=3 \\ z=2 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} y=2 \\ z=x+1 \end{cases}$ 3) $\begin{cases} x=4 \\ z=y \end{cases}$

To'g'ri chiziqlar yasalsin va ularning yo'naltiruvchi vektorlari aniqlansin.

18.3. $A(-1; 2; 3)$ va $B(2; 6; -2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamalari yozilsin va uning yo'naltiruvchi kosinuslari topilsin.

18.4. $A(2; -1; 3)$ va $B(2; 3; 3)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri tenglamalari yozilsin.

18.5. 1) $(-2; 1; -1)$ nuqtadan o'tuvchi va $P\{1; -2; 3\}$ vektorga parallel bo'lgan;

2) $A(3; -1; 4)$ va $B(1; 1; 2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqlarning tenglamalari yozilsin.

18.6. $y=3x-1, 2z=-3x+2$ to'g'ri chiziq bilan $2x+y+z-4=0$ tekislik orasidagi burchak topilsin.

18.7. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{3}$ to'g'ri chiziq $2x+y-z=0$ tekislikka parallel ekanligi,

$\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+3}{3}$ to'g'ri chiziq esa shu tekislik ustida yotishi ko'rsatilsin.

18.8. $(-1; 2; -3)$ nuqtadan o'tuvchi va $x=2, y-z=1$ to'g'ri chiziqqa perependikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.

18.9. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{3}$ to'g'ri chiziqdan va $(3; 4; 0)$ nuqtadan o'tuvchi tekislikning tenglamasi yozilsin.

18.10. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{2}$ to'g'ri chiziqdan o'tuvchi va $2x+3y-z=4$ tekislikka perpendikulyar tekislikning tenglamasi yozilsin.

18.11. $(a; b; c)$ nuqtadan o'tuvchi va: 1) Oz o'qqa parallel; 2) Oz o'qqa perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamalari yozilsin.

18.12. $x=2z-1; y=-2z+1$ to'g'ri chiziq bilan $(1; -1; -1)$ nuqta va koordinatalar boshidan o'tuvchi to'g'ri chiziq orasidagi burchak topilsin.

18.13. $(2; -3; 4)$ nuqtadan Oz o'qqa tushirilgan perpendikulyarning tenglamalari yozilsin.

Ko'rsatma. Izlangan to'g'ri chiziq $(0; 0; 4)$ nuqtadan ham o'tadi.

18.14. $N(2; -3; 4)$ nuqtadan $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{5}$ to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa topilsin.

Ko'rsatma. $A(-1; -2; 1)$ - to'g'ri chiziqdagi nuqta; $P\{3;4;5\}$ - to'g'ri chiziqning

yo'naltiruvchi vektori. U vaqtda $d = AN \sin \alpha = \frac{AN|P \bullet \overline{AN}|}{P \bullet AN} = \frac{|P \bullet \overline{AN}|}{P}$

18.15. $\begin{cases} 2x+y+8z-16=0 \\ x-2y-z+2=0 \end{cases}$ to'g'ri chiziq tenglamalari:

1) proektsiyalari bo'yicha; 2) kanonik ko'rinishda yozilsin. To'g'ri chiziqning koordinatalar tekisliklaridagi izlari topilsin, to'g'ri chiziq va uning proektsiyalari yasalsin.

18.16. $A(0; -4; 0)$ nuqtadan o'tuvchi va $P\{1;2;3\}$ vektorga parallel to'g'ri chiziq tenglamalari yozilsin; to'g'ri chiziqning xOz tekisligidagi izi topilsin.

18.17. $x=3, z=5$ to'g'ri chiziqning yo'naltiruvchi vektori topilsin.

18.18. $(2; -3; 4)$ nuqtadan Oy o'qqa tushirilgan perpendikulyarning tenglamalari yozilsin.

18.19. $\begin{cases} 2x-y-7=0 \\ 2x-z+5=0 \end{cases}$ va $\begin{cases} 3x-2y+8=0 \\ z=3x \end{cases}$

to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak topilsin.

18.20. $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ va $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$ parallel to'g'ri chiziqlardan o'tuvchi tekislikning tenglamasi yozilsin.

18.21. $x=2t-1$, $y=t+2$, $z=1-t$ to'g'ri chiziqning $3x-2y+z=3$ tekislik bilan kesishgan nuqtasi topilsin.

18.22. $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$ to'g'ri chiziqning $x+2y+3z-29=0$ tekislik bilan kesishgan nuqtasi topilsin.

18.23. $\left. \begin{array}{l} x = z-2 \\ y = 2z+1 \end{array} \right\}$ va $\frac{x-2}{3} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-2}{1}$

to'g'ri chiziqlarning kesishuvchi ekanligi ko'rsatilsin va ular yotgan tekislikning tenglamasi yozilsin.

18.24. $(2; 1; 0)$ nuqtadan $x=3z-1$; $y=2z$ to'g'ri chiziqqa tushirilgan perpendikulyarning tenglamalari yozilsin.

19. TO‘PLAMLARGA DOIR MISOLLAR

n o‘lchovli haqiqiy arifmetik fazoda ikki $M(x_1; x_2; \dots; x_n)$ va $N(y_1; y_2; \dots; y_n)$ nuqtalar orasidagi masofa:

$$d(M; N) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

formula asosida hisoblanadi va quyidagi xossalarga bo‘ysinadi:

- 1) Har qanday M va N nuqtalar uchun $d(M; N) = d(N; M)$;
- 2) $d(M; N) \geq 0$, yani agar $M \neq N$ bo‘lsa, $d(M; N) > 0$ va agar $M = N$ bo‘lsa, $d(M, N) = 0$;

3) Har qanday M, N va K nuqtalar uchun *uchburchak tengsizligi* deb aytiluvchi $d(M; N) \leq d(M; K) + d(K; N)$ munosabatlar o‘rinli.


n o‘lchovli haqiqiy arifmetik fazoda $M_0(x_{10}; x_{20}; \dots; x_{n0})$ nuqta va $r > 0$ son berilgan bo‘lsin. R_n fazoda M_0 nuqtaning r atrofi deb, M_0 markazdan r son dan kichik masofada yotuvchi mumkin bo‘lgan barcha $M(x_1; x_2; \dots; x_n)$ nuqtalar to‘plamiga aytiladi va $S_r(M_0)$ yozuv bilan belgilanadi:

$$S_r(M_0) = \{M(x_1; x_2; \dots; x_n) \in R_n \mid d(M; M_0) < r\}.$$

R_n fazoda n -o‘lchovli nuqtalarning biror-bir V to‘plami berilgan bo‘lsin. V to‘plamga tegishli har qanday $M(x_1; x_2; \dots; x_n)$ nuqtaning har bir koordinatasi uchun $|x_1| \leq A, |x_2| \leq A, \dots, |x_n| \leq A$ munosabatlarni qanoatlantiruvchi $A > 0$ son mavjud bo‘lsa, V nuqtalar to‘plamiga R_n fazoda *chegaralangan to‘plam* deyiladi.

n o‘lchovli V nuqtalar to‘plamining *ichki nuqtasi* deb, o‘zining biror-bir atrofi bilan V to‘plamga tegishli nuqtaga aytiladi.

V nuqtalar to‘plamining *chegaraviy nuqtasi* deb, har qanday atrofi to‘plamga tegishli va tegishli bo‘lmagan nuqtalardan iborat nuqtaga aytiladi. 1-rasm.



1-rasmdagi M_0 nuqta V to‘plamning ichki, M_1 nuqta esa chegaraviy nuqtasidir.

V nuqtalar to'plamining barcha chegaraviy nuqtalari to'plamiga uning *chegarasi* deyiladi.

n o'lchovli V nuqtalar to'plamining *quyuqlashish nuqtasi* deb, har bir atrofi V to'plamning cheksiz ko'p nuqtalarini o'z ichiga oluvchi $M_0 \in V$ nuqtaga aytiladi.

Har bir n -o'lchovli quyuqlashish nuqtasi o'ziga tegishli nuqtalar to'plamiga R_n *fazoda yopiq to'plam* deyiladi. Har bir n o'lchovli nuqtasi ichki nuqta bo'ladigan nuqtalar to'plamiga esa R_n *da ochiq to'plam* deyiladi.


R_n fazoda chegaralangan va yopiq n o'lchovli nuqtalar to'plamiga *ixcham (kompakt) nuqtalar to'plami* deyiladi.

R_n fazoda $[MN]$ kesma yoki M va N nuqtalarning *chiziqli qavariq kombinatsiyasi* deb, quyidagi to'plamga aytiladi:


$$[MN] = \{P \in R_n \mid P = \alpha M + (1-\alpha)N, \quad \alpha \in [0; 1]\}.$$

Har qanday ikki M_1 va M_2 nuqtalari qaralmasin, ularni tutashtiruvchi $[M_1M_2]$ kesma ham V to'plamga tegishli bo'lsa, V nuqtalar to'plamiga R_n *fazoda qavariq nuqtalar to'plami* deyiladi.

2-rasmda qavariq nuqtalar to'plami, 3-rasmda qavariq bo'lmagan nuqtalar to'plami tasvirlangan.



2-rasm



3-rasm

V *qavariq to'plamning chetki nuqtasi* deb, o'zidan tashqari to'plam nuqtalarining chiziqli qavariq kombinatsiyasi shaklida yoyilmaydigan yoki shuning o'zi, uchlari to'plamga tegishli biror-bir kesmaning o'rta nuqtasi bo'la olmaydigan nuqtaga aytiladi.

Mustaqil yechish uchun masqlar:

Quyidagi sohalar bilan chegaralangan to'plamlar qavariq to'plam bo'ladimi?

19.1. $\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 = 8 \\ 6x_1 + 6x_2 = 17 \end{cases}$

19.2. $\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \end{cases}$

19.3. $\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 \leq 20 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$

19.4. $\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 - 2x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$

19.5. $\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 \leq 6 \\ x_1 - \frac{1}{3}x_2^2 + 1 \leq 0 \end{cases}$

19.6. $x_1^2 + 3x_2^2 \leq 5$

Quyidagi to'plamlar qavariqmi?

19.7. Markazsiz doira. Markazsiz shar.



19.8. Kesma va bu kesmada yotmaydigan nuqta.

19.9. R_3 - fazoda umumiy nuqtaga ega bo'lgan 2 ta tetraedr.

19.10. R_2 - fazoda umumiy tomonga ega bo'lgan 2 ta uchburchak.



19.11.

19.12.




19.13.

19.14.




19.15.




Quyida qavariq to'plamlar berilgan. Harflar bilan berilgan nuqtalarning qaysilari chetki, ichki va chegaraviy nuqta ekanligini aniqlang:


19.16.



19.17.



19.18.



Quyidagi sohalar bilan chegaralangan qavariq to'plamlarni tekislikda tasvirlang. To'plamning chetki nuqtalarini toping:

$$19.19. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \end{cases} \qquad 19.20. \begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 \geq 3 \\ 0 \leq x_1 \leq 5 \end{cases}$$

$$19.21. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ 4.5x_1 + 6x_2 \geq 24 \end{cases} \qquad 19.22. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

20. SONLI KETMA-KETLIKLARNING LIMITI

Har bir n natural songa aniq bir x_n haqiqiy sonni mos qo'yuvchi qonun berilgan bo'lsa, R_1 haqiqiy sonlar o'qida $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, yoki $\{x_n\}$ nuqtalar (sonlar) ketma-ketligi berilgan deyiladi.

Masalan, har bir n natural songa $x_n = \frac{3(n+1)}{2n}$ son mos qo'yilgan bo'lsa,

$$3; \frac{9}{4}; 2; \frac{15}{8}; \dots; \frac{3(n+1)}{2n}; \dots$$

sonlar ketma-ketligi berilganligini anglatadi.

a sonning har qanday oldindan tayinlangan ε atrofi uchun $\{x_n\}$ sonli ketma-ketlikning shunday bir N tartib raqamini (ε ga bog'liq ravishda) tanlash mumkin bo'lsaki, barcha $n > N$ tartib raqamli hadlari $|x_n - a| < \varepsilon$ tengsizlikni qanoatlantirsa, a soni $\{x_n\}$ sonli ketma-ketlikning limiti deyiladi.

n o'lchovli haqiqiy fazoda har bir k natural songa aniq bir n o'lchovli M_k nuqtani mos qo'yuvchi qonuniyat o'rnatilgan bo'lsa, R_n fazoda cheksiz n o'lchovli nuqtalarning ketma-ketligi berilgan deyiladi va $M_1, M_2, \dots, M_k, \dots$, yoki $\{M_k\}$ ko'rinishda yoziladi.

Masalan, har bir k natural songa ikki o'lchovli $M_k(2k; \frac{3}{k})$ nuqta mos qo'yilgan bo'lsin. Bu esa, R_2 haqiqiy koordinatalar tekisligida

$$M_1(2; 3), M_2(4; \frac{3}{2}), M_3(6; 1), \dots, M_n(2k; \frac{3}{k}), \dots$$

nuqtalar ketma-ketligi berilganligini anglatadi.

n o'lchovli M_0 nuqtaning har qanday ε atrofida berilgan nuqtalar ketma-ketligining biror-bir mos tartib raqamidan boshlab, barcha hadlari tegishli bo'lsa, ya'ni har qanday oldindan tayinlanadigan $\varepsilon > 0$ uchun K tartib raqamni (ε ga bog'liq ravishda) ko'rsatish mumkin bo'lsaki, barcha $k > K$ tartib raqamli

hadlar $M_k \in S_\varepsilon(M_0)$ bo'lsa, M_0 nuqtaga $\{M_k\}$ nuqtalar ketma-ketligining limiti deyiladi va $\lim_{k \rightarrow \infty} \{M_k\} = M_0$ ko'rinishida yoziladi.

Mustaqil yechish uchun misollar:

20.1. Umumiy hadi orqali berilgan ketma-ketlikning birinchi beshta hadini yozing:

a) $x_n = \frac{1}{2n+1}$

b) $x_n = \frac{n+2}{n^3+1}$

c) $x_n = \frac{n}{2n+1}$

d) $x_n = (-1)^n \frac{n+1}{n^2}$.

20.2. Ketma-ketlikning berilgan hadlari orqali umumiy hadining formulasini yozing:

a) $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{6}; \frac{1}{24}; \dots$

b) $1; 2\frac{1}{4}; 2\frac{7}{9}; 3\frac{1}{16}; 3\frac{6}{25}; \dots$

c) $2; 10; 26; 82; 242; 730; \dots$

20.3. Sonli ketma-ketlik chegaralanganligini isbotlang:

a) $x_n = \frac{n^2+1}{n^2+2}$

Isbot: $\frac{n^2+1}{n^2+2} = 1 - \frac{1}{n^2+2}$ va $0 < \frac{1}{n^2+2} \leq \frac{1}{2}$ shuning uchun $\frac{1}{2} < x_n < 1$.

b) $x_n = \frac{(-1)^n n+1}{\sqrt{n^2+2}}$

c) $x_n = \sin n$

d) $x_n = (1 - (-1)^n)$

20.4. Sonli ketma-ketlik monotonligini isbotlang:

a) $x_n = \lg n - \lg(n-1), (n > 1)$

Isbot: $x_n = \lg n - \lg(n-1) = \lg \frac{n}{n-1}$

$x_{n+1} - x_n = \lg \frac{n+1}{n} - \lg \frac{n}{n-1} = \lg \frac{n^2-1}{n^2} = \lg(1 - \frac{1}{n^2}) < 0$. Demak, $x_{n+1} - x_n < 0$, $x_{n+1} < x_n$,

shuning uchun bu ketma-ketlik monoton kamayuvchi.

b) $x_n = 3^n - 2^n$

c) $x_n = \sqrt{n^2-1}$

$$d) x_n = \sum_{k=1}^n k.$$

20.5. Ketma-ketlik limiti ta'rifidan foydalanib, quyidagilarni isbotlang:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Isbot: ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son olamiz, $|x_n - 1| = \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1}; \quad |x_n - 1| < \varepsilon$

tengsizlikni qanoatlantiruvchi n larni topish uchun $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$ tengsizlikni yechamiz.

$n > \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}$. Shunday qilib, $\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}$ sonining butun qismi $N = \left[\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right]$ bo'ladi, u holda

$|x_n - 1| < \varepsilon$ tengsizlik barcha $n > N$ larda bajariladi. ε -ixtiyoriy son bo'lgani uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

Agar $\varepsilon = 0.01$ bo'lsa, $N = \left[\frac{1-0.01}{0.01} \right] = 99$, $n > 99$ larda $|x_n - 1| < 0.01$ bo'ladi.

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-1}{2n+1} = 2$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{5n-1} = \frac{3}{5}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2-3n} = -\frac{2}{3} \quad \text{qaysi } n \text{ dan boshlab, } \left| \frac{2n-1}{2-3n} - \left(-\frac{2}{3} \right) \right| < 0.0001 \text{ tengsizlik}$$

o'rinli bo'ladi?

Quyidagi limitlarni toping:

$$20.6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3+2}{4n^3-1}$$

$$20.7. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3+3}{n^3+n-1}$$

$$20.8. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{5n^3+1}$$

$$20.9. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2+n}}{4+n}$$

$$20.10. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n^4+n^2+1}}{2n+n^2-1}$$

$$20.11. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!-n!}$$

$$20.12. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3^n}}$$

$$20.13. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+6+9+\dots+3n}{n^2+4}$$

$$20.14. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n-3})$$

$$20.15. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)! + (2n+2)!}{(2n+3)! - (2n+2)!}$$

$$20.16. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^3 + 8}(\sqrt{n^3 + 2} - \sqrt{n^3 - 1}) \quad 20.17. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{1}{4n^2 - 1} \right)$$

$$20.18. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n} \cos n^3 - \frac{3n}{6n+1} \right) \quad 20.19. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} \sin n! + \frac{2n^2}{1 - 9n^2} \right)$$

20.20. R^2 fazoda quyidagi ketma-ketliklarning limiti $a \in R^2$ ekanligini isbotlang:

a) $\{x^{(n)}\} = \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right\} \quad a = (0, 0), \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \text{son olaylik.}$

$$\rho(x^n, a) = \rho\left(\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right), (0, 0)\right) = \sqrt{\left(\frac{1}{n} - 0\right)^2 + \left(\frac{1}{n} - 0\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{n^2}} < \varepsilon, \quad n > \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon}; \quad N = \left\lceil \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon} \right\rceil$$

bo'ldi, u holda $\rho(x^{(n)}, a) < \varepsilon$ tengsizlik barcha $n > N$ larda bajariladi. Ta'rifga

ko'ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) = (0, 0) = a.$

b) $\{x^{(n)}\} = \left\{ \left(\frac{3}{n}, \frac{1}{n^2} \right) \right\}, \quad a = (0, 0)$

c) $\{x^{(n)}\} = \left\{ \left(\frac{3n}{2n-1}, \frac{2-n}{2+n} \right) \right\}, \quad a = \left(\frac{3}{2}, -1 \right)$

R^2 fazoda ketma-ketliklar limitini toping:

$$20.21. x^{(n)} = \left(\left(\frac{n-1}{n} \right)^5, \frac{n^3 + 27}{n^4 - 15} \right) \quad 20.22. x^{(n)} = \left(\frac{9n+5}{4n}, \frac{1}{2n+4} \right)$$

$$20.23. x^{(n)} = \left(\frac{3n^4 - 2}{\sqrt{n^8 + 3n}}, \sqrt{n^2 + 8n} - \sqrt{n^2 + 4n} \right)$$

20.24. Berilgan ketma-ketliklarning 5 ta hadini va umumiy hadi formulasini yozing:

a) $x_1 = 1; \quad x_{n+1} = n!$

b) $x_1 = 1; \quad x_{n+1} = x_n + 3$

20.25. Ketma-ketlik chegaralanmaganligini isbotlang:

a) $x_n = n^{(-1)^n}$

b) $x_n = (-1)^n n$

c) $x_n = n \cdot \log_{\frac{1}{2}} n$

d) $x_n = \operatorname{tg} n$

20.26. Ketma-ketlik limitini ta'rifidan foydalanib isbotlang:

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-1}{5n+1} = \frac{4}{5}$$

$$\text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} = 1$$

$$\text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{5n+1} = \frac{3}{5}, \text{ qaysi } n \text{ dan boshlab } \left| \frac{3n-1}{5n+1} - \frac{3}{5} \right| < 0.001 \text{ tengsizlik o'rinli}$$

bo'ladi?

Quyidagi limitlarni toping:

$$20.27. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3-4}{n^3+6}$$

$$20.28. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+n+1}{(n+1)^2}$$

$$20.29. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4 + (n-1)^4}{n^4+10}$$

$$20.30. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{4n^3+2n-1}}{2n+2}$$

$$20.31. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n^2+1}}{\sqrt[4]{n^4+3n-1}}$$

$$20.32. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!+n!}{(n+2)!}$$

$$20.33. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n^2}$$

$$20.34. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \cos \frac{n\pi}{2} + 1 \right)$$

$$20.35. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+\dots+(2n-1)}{n\sqrt{n^2+1}}$$

$$20.36. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a(n+1)!}{\log_a n!} \quad (n > 2, a > 1)$$

$$20.37. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\dots+a^{n-1}}{1+b+b^2+\dots+b^{n-1}} \quad (b > a > 0)$$

$$20.38. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+k)!+n!}{(n+k)!-n!}$$

$$20.39. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\ln(n+2\sqrt{n}+1) - \ln n)$$

$$20.40. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2+4+6+\dots+2n} - \sqrt{1+3+5+\dots+(2n-1)})$$

21. FUNKSIYA. FUNKSIYA ANIQLANISH SOHASI, QIYMATLAR TO‘PLAMI, JUFT-TOQLIGIGA DOIR MISOLLAR

$y=f(x)$ ($y=f(M)=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$) funksiya berilgan R (R_n) fazoning qism osti to‘plamiga uning *aniqlanish sohasi* deyiladi va $D(f)$ yoki $D(y)$ yozuv bilan ifodalanadi.

$y=f(x)$ ($y=f(M)$) funksiya o‘z aniqlanish sohasi $D(f)$ ning har bir nuqtasida qabul qilishi mumkin bo‘lgan barcha qiymatlari to‘plamiga esa uning *qiymatlari to‘plami* yoki *o‘zgarish sohasi* deyiladi. Funksiya qiymatlar to‘plami R_f haqiqiy sonlar to‘plamining qism osti to‘plami bo‘lib, $E(f)$ yoki $E(y)$ belgilar bilan yoziladi.

Agar har qanday $\pm x \in V$ lar uchun $f(-x)=f(x)$ tenglik o‘rinli bo‘lsa, bir o‘zgaruvchili $y=f(x)$ funksiya V to‘plamda *juft funksiya* deyildi. Juft funksiya grafigi Oy ordinata o‘qiga nisbatan simmetrikdir.

Agar har qanday $\pm x \in V$ lar uchun $f(-x)=-f(x)$ munosabat o‘rinli bo‘lsa, $y=f(x)$ funksiya V to‘plamda *toq funksiya* deyiladi. Toq funksiya grafigi esa koordinatalar boshiga nisbatan simmetrikdir.

$y=f(x)$ funksiya uchun shunday bir musbat t son mavjud bo‘lsaki, funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli har qanday x va $x+t$ nuqtalari uchun $f(x+t)=f(x)$ tenglik bajarilsa, $y=f(x)$ funksiya *davriy funksiya* deyiladi. t son esa funksiya davri deb yuritiladi. Amalda funksiya davrlari ichidan eng kichigi T ni topish masalasi qo‘yiladi.

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi funksiyalarning aniqlanish sohasini toping:

$$21.1. f(x) = \sqrt{1-2x} + 3\arcsin \frac{3x-1}{2}$$

Birinchi qo‘shiluvchi $1-2x \geq 0$ da haqiqiy qiymatlarni qabul qiladi, ikkinchi qo‘shiluvchi esa $-1 \leq \frac{3x-1}{2} \leq 1$ bo‘lganda. Shunday qilib, funksiyaning aniqlanish sohasini topish uchun

$$\begin{cases} 1-2x \geq 0 \\ \frac{3x-1}{2} \leq 1 \\ \frac{3x-1}{2} \geq -1 \end{cases} \text{ tengsizliklar sistemasini yechib topamiz}$$

$$x \leq \frac{1}{2}, \quad x \leq 1, \quad x \geq -\frac{1}{3}$$

$$\text{Demak, } D(f) = \left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right].$$

$$21.2. \quad y = \lg(x^2 - 4x + 3)$$

$$21.3. \quad y = \arcsin(3x - 4)$$

$$21.4. \quad y = \frac{1}{\lg(1-x)} + \sqrt{x+2}$$

$$21.5. \quad y = \sqrt{\sin(x)} - \sqrt{9-x^2}$$

$$21.6. \quad y = \arcsin \frac{1+x^2}{2x}$$

$$21.7. \quad y = x^{\frac{1}{\lg x}}$$

$$21.8. \quad y = \operatorname{tg} \sqrt{16-x^2}$$

$$21.9. \quad y = \frac{1}{\sqrt{|x|-2|x-1|}}$$

$$21.10. \quad f(x) = \ln \cos(x).$$

Quyidagi funksiyalarning qiymatlar to'plamini toping:

$$21.11. \quad y = 1 + 2^{x+1},$$

$y = 2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$ ko'rsatkichli funksiya, uning qiymatlar to'plami $y \in (0; +\infty)$, demak berilgan funksiyaning qiymatlar to'plami $(1; +\infty)$ bo'ladi yoki berilgan funksiyaning qiymatlar to'plami uning teskari funksiyasi $x = \log_2(y-1)-1$ ning aniqlanish sohasi $y > 1$ bilan ustma-ust tushadi, shuning uchun $E(y) = (1; +\infty)$.

$$21.12. \quad y = \sin(x) - \cos(x)$$

$$21.13. \quad y = x + \frac{1}{x}$$

$$21.14. \quad y = \sqrt{-x^2 - x + 2}$$

$$21.15. \quad y = \frac{x+1}{x-2}$$

$$21.16. \quad y = \frac{1}{x^2+1} + 1$$

$$21.17. \quad y = \frac{1}{\arcsin(1-x)}.$$

Quyidagi funksiyalarni juft yoki toqligini tekshiring:

$$21.18. \quad y = 2^x + 2^{-x},$$

$f(-x) = 2^{-x} + 2^x = f(x)$ bo'lganligi uchun bu juft funksiyadir.

$$21.19. y = \frac{1}{x + \frac{1}{x + \frac{1}{x}}}$$

$$21.20. y = \sin \sqrt{x}$$

$$21.21. y = |x| - 5e^{x^2}$$

$$21.22. y = \frac{|\sin x|}{1 - \cos x}$$

$$21.23. y = \sin(\arccos x)$$

$$21.24. y = \left| \frac{10^x + 1}{10^x - 1} \right|$$

$$21.25. y = \lg \frac{x+3}{x-3}$$

$$21.26. f(x) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x - \text{ratsional son bo'lsa} \\ -1, & \text{agar } x - \text{irratsional son bo'lsa} \end{cases}$$

Funksiyalarni asosiy davrini toping:

$$21.27. y = \sin 6x + \operatorname{tg} 4x$$

Birinchi qo'shiluvchi uchun asosiy davr $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ bo'ladi, ikkinchi qo'shiluvchi uchun davr $\frac{\pi}{4}$ bo'ladi. $\frac{\pi}{3}$ va $\frac{\pi}{4}$ sonlarining eng kichik umumiy bo'luvchisi π bo'lgan funksiyaning asosiy davri bo'ladi. $f(x+T) = f(x)$; $T = \pi$.

$$21.28. y = 2$$

$$21.29. y = \sin \frac{3}{2}x + 1$$

$$21.30. y = \sin x - \cos x$$

$$21.31. y = \sin 2x - 2\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$21.32. y = \cos^2 x$$

$$21.33. y = x - [x].$$

Quyidagi 2 o'zgaruvchili funksiyalarni aniqlanish sohasini toping:

$$21.34. f(x, y) = \arcsin(x + y),$$

$f(x, y)$ funksiya ma'noga ega bo'lishi uchun x va y lar ushbu $-1 \leq x + y \leq 1$ munosabatda bo'lishi lozim. Bu tengsizliklarni tekislikning $x + y + 1 = 0$ va $x + y - 1 = 0$ to'g'ri chiziqlar orasidagi nuqtalarning koordinatalari qanoatlantiradi.

$$D(f) = \{(x, y) \in R^2; |x + y| \leq 1\}$$

$$\begin{array}{ll}
21.35. f(x, y) = \sqrt{x+y} & 21.36. f(x, y) = \sqrt{-x} + \sqrt{y} \\
21.37. f(x, y) = \arccos \frac{x^2 + y^2}{9} & 21.38. f(x, y) = \sqrt{x - \sqrt{y}} \\
21.39. f(x, y) = 1 + \sqrt{-(x-y)^2} & 21.40. f(x, y) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{y} \\
21.41. f(x, y) = \frac{\sqrt{4x-y^2}}{\lg(1-x^2-y^2)} & 21.42. f(x, y) = \sqrt{x^2-4} + \sqrt{1-y^2} .
\end{array}$$

Funksiyalarning aniqlanish sohasini toping:

$$\begin{array}{ll}
21.43. y = \sqrt{x^2 + x - 2} & 21.44. y = \log_2(-x) \\
21.45. y = \arccos\left(\frac{x}{2} - 1\right) & 21.46. y = \sqrt{3^x - 5^x} \\
21.47. y = \frac{1}{xe^x} & 21.48. y = \sin \sqrt{x-3}
\end{array}$$

Funksiyalarning qiymatlar sohasini toping:

$$\begin{array}{ll}
21.49. y = \sin^2 x - \cos^2 x & 21.50. y = -x^2 - 5x + 6 \\
21.51. y = 1 - |x| & 21.52. y = \frac{2-x}{x+3} \\
21.53. y = \lg \frac{2}{\sqrt{4-x^2}} & 21.54. y = \sqrt{\sin x - 1}
\end{array}$$

Funksiyalarni juft yoki toqligini tekshiring:

$$\begin{array}{ll}
21.55. y = x^2 \sin \frac{1}{x} & 21.56. y = \lg \cos x \\
21.57. y = \frac{16^x - 1}{4^x} & 21.58. y = x^4 \sin 7x
\end{array}$$

Funksiyalarni asosiy davrini toping:

$$\begin{array}{ll}
21.59. y = -2\cos \frac{x}{3} + 1 & 21.60. y = \sin \frac{x}{3} + \operatorname{ctg} \frac{x}{4} \\
21.61. y = 2^{\sin 2x} \cdot 2^{\cos 2x} & 21.62. y = \log_2 \sin x
\end{array}$$

Funksiyalarni aniqlanish sohasini toping:

$$21.63. f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

$$21.64. f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

$$21.65. f(x, y) = \sqrt{y \sin x}$$

$$21.66. f(x, y) = \ln(x + y)$$

$$21.67. f(x, y) = \ln\left(\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} - 1\right)$$

$$21.68. f(x, y) = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)}$$

22. FUNKSIYANING LIMITI

Ta’rif. $y=f(x)$ funksiya berilgan bo’lsin. Har qanday $\varepsilon > 0$ son uchun shunday bir $\delta > 0$ son tanlash mumkin bo’lsaki, V to‘plamga tegishli va $|x - x_0| < \delta$ munosabatlarni qanoatlantiruvchi har bir x uchun $|f(x) - b| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa b soni $f(x)$ funksiyaning $x \rightarrow x_0$ dagi limiti deyiladi va $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$ kabi yoziladi.

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ ko‘rinishdagi aniqmasliklarni ochishda

quyidagi ajoyib limitlardan foydalaniladi:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, a > 0$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^P - 1}{x} = P$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Ta’rif. Har qanday oldindan tayinlanadigan $\varepsilon > 0$ son uchun M_0 nuqtaning δ atrofi $S_\delta(M_0)$ ni ko‘rsatish mumkin bo’lsaki, barcha $M \in S_\delta(M_0) \cap V, M \neq M_0$ nuqtalar uchun $|f(M) - b| < \varepsilon$ tengsizlik o‘rinli bo’lsa, u holda b soni $f(M)$ funksiyaning $M \rightarrow M_0$ dagi limiti deyiladi va

$$b = \lim_{M \rightarrow M_0} f(M) \text{ yoki } b = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0 \\ \dots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(M)$$

ko‘rinishda yoziladi.

Mustaqil yechish uchun misollar:

Funksiya limiti ta'rifidan foydalanib quyidagilarni isbotlang:

$$22.1. \lim_{x \rightarrow 3} (3x - 5) = 4$$

Ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ topilib, $|x - 3| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x lar uchun $|(3x - 5) - 4| < \varepsilon$ tengsizlik o'rinli bo'lishini ko'rsatishimiz kerak. Ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son olaylik.

$$|(3x - 5) - 4| = |3x - 9| = |3(x - 3)| = 3|x - 3| < \varepsilon \quad |x - 3| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Agar $\delta < \frac{\varepsilon}{3}$ deb olsak, $|x - 3| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi x lar uchun $|(3x - 5) - 4| < \varepsilon$ tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Shu bilan $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 5) = 4$ ekanligi isbotlandi.

$$22.2. \lim_{x \rightarrow 1} (4x - 1) = 3$$

$$22.3. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x = 1$$

$$22.4. \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1) = 3, \quad \delta \text{ ning qanday qiymatlarida } 0 < |x - 2| < \delta \text{ tengsizlikdan}$$

$$|(x^2 - 1) - 3| < 0.001 \text{ tengsizlik kelib chiqadi?}$$

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishidagi aniqmasliklarni oching:

$$22.5. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{(x - 2)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 1} = 1$$

$$22.6. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}$$

$$22.7. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{tg} x}{\sin 2x}$$

$$22.8. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x}$$

$$22.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 + 3x} - 1}$$

$$22.10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

$$22.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + mx} - 1}{x}$$

$$22.12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}}{x}$$

$$22.13. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sqrt{1 - \operatorname{tg} x} - \sqrt{1 + \operatorname{tg} x}}{\sin 2x}$$

$$22.14. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 7x}{1 - 2x^3}$$

$$22.15. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1}$$

$$22.16. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} - 6x}{3x + 1}$$

$$22.17. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x + 6}{x^3 + 8}$$

$$22.18. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1}$$

$$22.19. \lim_{x \rightarrow \pi+0} \frac{\sqrt{1 + \cos x}}{\sin x}$$

$$22.20. \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x - 3}}{x^2 - 49}$$

$$22.21. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1}{3x^4 - 5x^3 + 2x^2 - x + 1}$$

$$22.22. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{6 - x} - 1}{3 - \sqrt{4 + x}}$$

$$22.23. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 2 - \sqrt{4x^2 - x - 2}}{x^2 - 3x + 2}$$

$$22.24. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{1 - x + x^2}}{x^2 - x}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ajoyib limitdan foydalanib quyidagi limitlarni toping:

$$22.25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{\sin 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 6x}{6x} \cdot 6x}{\frac{\sin 7x}{7x} \cdot 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{7x} = \frac{6}{7}$$

$$22.26. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$$

$$22.27. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x}$$

$$22.28. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin(x - h)}{h}$$

$$22.29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$22.30. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x + 1} - 1}$$

$$22.31. \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{\sqrt{1 - \cos 2x}}{x}$$

$$22.32. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \sin x}{\sec x - 1}$$

$$22.33. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x + \operatorname{tg}^2 x}{x \sin x}$$

$$22.34. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\arcsin(x + 2)}{x^2 + 2x}$$

$$22.35. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{1 - \cos 3x}$$

$$22.36. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 5x}{\sin 4x}$$

$$22.37. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \cos x} - \sqrt{2 \cos x}}{\sqrt{3 + \cos x} - 2\sqrt{\cos x}}$$

$$22.38. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$$

$$22.39. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{\cos x}$$

Limitlarni toping:

$$22.40. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1}$$

$$22.41. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - x^2}{\sqrt{3x} - 3}$$

$$22.42. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{ax} - x}{x - a}$$

$$22.43. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 4x + 1}$$

$$22.44. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 2^{\frac{1}{x}}}{1 - x^2}$$

$$22.45. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x - \cos 2x - 1}{\cos x - \sin x}$$

$$22.46. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2}$$

$$22.47. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}$$

$$22.48. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{5}} \frac{\arcsin(1 - 2x)}{4x^2 - 1}$$

$$22.49. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos mx}{x^2}$$

$$22.50. \lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{\sin(x-2)}{x^2 - 4} + 2^{\frac{-1}{(x-2)^2}} \right]$$

$$22.51. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3}$$

$$22.52. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{h}$$

$$22.53. \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} x_0}{x - x_0}$$

$$22.54. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\pi - 4x}$$

$$22.55. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 + 3x^2 + 5x - 6}{x^3 + 3x^2 + 7x - 1}$$

$$22.56. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x^3 + 4x + 5)(x^2 + x + 1)}{(x + 2)(x^4 + 2x^3 + 7x^2 + x - 1)}$$

$$22.57. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} - x)(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3}{2}$$

$$22.58. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} \right)$$

$$22.59. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x})$$

$$22.60. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} \right)$$

$$22.61. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{4 \sin^2 \frac{x}{2}} \right)$$

$$22.62. \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 4x})$$

$$22.63. \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{1}{x+2} + \frac{4}{x^2-4} \right)$$

$$22.64. \lim_{x \rightarrow \pi} \sin 2x \cdot \operatorname{ctg} x$$

22.65. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^x$; Bu limitni hisoblashda $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ ajoyib limitdan

foydalanamiz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-x^2}\right)^{-x^2} \right]^{\frac{x}{-x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x}{x^2}\right)} = e^{-\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

22.66. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^{2x}$

22.67. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x-1}\right)^x$

22.68. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 4x)^{\frac{1-x}{x}}$

22.69. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+8}{x-2}\right)^x$

22.70. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 4x + 1}\right)^x$

22.71. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+1}{3x-1}\right)^{3x+1}$

22.72. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{2-5x}$

Ko'p o'zgaruvchili funksiyalarning limitini toping:

22.73. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 3}} \frac{\sin(x^2 \cdot y)}{x^2}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 3}} \frac{\sin(x^2 \cdot y)}{x^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 3}} \frac{\sin(x^2 \cdot y)}{x^2 \cdot y} \cdot y = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 3}} y = 3$$

22.74. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{a - \sqrt{a^2 - xy}}{xy}, \quad a \neq 0$

22.75. $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\operatorname{tg}(xy)}{y}$

22.76. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \cdot \sin \frac{1}{xy}$

22.77. $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{y}{x}\right)^x$

22.78. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{1 + x^2 y^2} - 1}{x^2 + y^2}$

22.79. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1 + x^2 + y^2)^{\frac{1}{x^2 + y^2}}$

23. FUNKSIYA UZLUKSIZLIGI. UZLUKLI FUNKSIYALAR

Ta'rif. Agar x_0 nuqtaning biror atrofida (x_0 nuqtaning o'zida ham) $y=f(x)$ funksiya aniqlangan bo'lsa va agar

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0 \quad (1)$$

bo'lsa, $x=x_0$ qiymatda (yoki x_0 nuqtada) funksiya uzluksiz deyiladi.
(1)ifodaning uzluksizlik shartini bunday yozish mumkin:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) \quad \text{yoki} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

x_0 nuqtada uzluksiz $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar bo'lsa, u holda x_0 nuqtada quyidagi funksiyalar ham uzluksiz bo'ladi:

- a) $f(x)+g(x)$
- b) $k f(x)$ (k -o'zgarmas)
- c) $f(x) \cdot g(x)$
- d) $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x_0) \neq 0$)

Agar $f(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada uzluksiz bo'lsa va kesmaning chetki nuqtalarida turli ishorali qiymatlarga erishsa ($f(a) \cdot f(b) < 0$), u holda $(a; b)$ internalga tegishli kamida bitta c nuqta topiladiki, $f(c)=0$ tenglik bajariladi.

Agar $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada uzluksiz bo'lmasa, funksiya x_0 nuqtada urilgan yoki x_0 nuqta uning *urilish nuqtasi* deyiladi.

$y=f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtada chapdan va o'ngdan limitlari mavjud bo'lib, o'zaro teng bo'lmasa, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x),$$

u holda x_0 nuqta *funksiyaning birinchi tur urilish nuqtasi* deyiladi.

Agar x_0 nuqtada funksiyaning chapdan va o'ngdan limitlari $f(x_0-0)$ va $f(x_0+0)$ lar o'zaro teng bo'lib, funksiyaning x_0 nuqtasida erishadigan qiymati $f(x_0)$ dan farq qilsa, unda x_0 nuqta *bartaraf etilishi mumkin uzilish nuqtasi* deb ataladi.

$y=f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtada chapdan yoki o'ngdan limitlarining biri mavjud bo'lmasa (xususan, cheksiz bo'lsa), u holda x_0 nuqta *funksiyaning ikkinchi tur uzilish nuqtasi* deyiladi.

23.1. Quyidagi fuksiyalarning ko'rsatilgan nuqtalarida bir tomonli limitlarini toping:

$$a) f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{agar } 0 < x < 1 \\ 3x+1, & \text{agar } 1 \leq x \leq 3 \end{cases} \quad x=1 \text{ nuqtasida}$$

$$f(1-0) = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} (x+1) = 2$$

$$f(1+0) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (3x+1) = 4$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 3x, & \text{agar } -1 \leq x \leq 1 \\ 2x, & \text{agar } 1 < x \leq 3 \end{cases} \quad x=1 \quad x=2 \text{ nuqtalarda}$$

$$c) y = \{x\}, \quad \{x\} - x \text{ ning kasr qismi; } x=1, x=2, x=3 \text{ nuqtalarda}$$

$$d) f(x) = \frac{3x+1}{x-1}, \quad x=1 \text{ nuqtada}$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

23.2. Quyidagi funksiylarning uzluksizligini ta'rifga binoan isbotlang.

$$a) f(x) = x^2 + x - 2 \text{ barcha } x \in (-\infty; +\infty) \text{ larda}$$

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x + \Delta x) - f(x)) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} ((x + \Delta x)^2 + (x + \Delta x) - 2 - (x^2 + x - 2)) = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x \cdot \Delta x + \Delta x^2 + \Delta x) = 0 \end{aligned}$$

Demak, $f(x)$ barcha $x \in (-\infty; +\infty)$ larda uzluksiz.

$$b) f(x) = \sin(3x + 2), \text{ barcha } x \in (-\infty; +\infty) \text{ larda}$$

$$c) f(x) = \frac{1}{x+1}, \text{ barcha } (-1; +\infty) \text{ larda}$$

Quyidagi funksiylarning uzilish nuqtalari va ularning turlarini aniqlang. Grafiklarini yasang:

$$23.3. f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{agar } -\infty < x \leq 0 \\ (x-1)^2, & \text{agar } 0 < x \leq 2 \\ 5-x, & \text{agar } 2 < x < \infty \end{cases}$$

$f(x)$ funksiya $(-\infty; 0)$, $(0; 2)$ va $(2; +\infty)$ intervallarda aniqlangan va uzluksiz bo'lgan elementar funksiyalar bilan berilgan. Demak, faqat $x_1 = 0$ va $x_2 = 2$ nuqtalarda uzilishga ega bo'lishi mumkin.

$x_1 = 0$ nuqta uchun chap va o'ng limitlarni hisoblaymiz:

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} x^2 = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} (x-1)^2 = 1; \quad f(0) = 0$$

Bu esa $x_1 = 0$ nuqtada $f(x)$ funksiya birinchi tur uzilishga ega bo'lishini bildiradi.

$x_2 = 2$ nuqta uchun:

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} (x-1)^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+0} (5-x) = 3 \quad f(2) = 1$$

bo'ladi.

$x_2 = 2$ nuqtada funksiya 1-tur uzilishga ega bo'ladi.

$$23.4. \quad y = \frac{4}{x-2}$$

$$23.5. \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

$$23.6. \quad y = 1 + \frac{|x+1|}{x+1}$$

$$23.7. \quad y = 2^{\frac{1}{x}}$$

$$23.8. \quad f(x) = \begin{cases} 0.5x^2, & \text{agar } |x| < 2 \\ 2.5, & \text{agar } |x| = 2 \\ 3, & \text{agar } |x| > 2 \end{cases}$$

$$23.9. \quad f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

$$23.10. \quad f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ \cos x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 1-x, & x > \pi \end{cases}$$

$$23.11. \quad f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 1 \\ \frac{2}{x-1}, & x > 1 \end{cases}$$

$$23.12. \quad f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x}, & x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 3, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Funksiyalarning uzilish nuqtalarini toping va uzilish turlarini aniqlang:

$$23.13. \quad y = \frac{4}{4-x^2}$$

$$23.14. \quad y = 5^{\frac{4}{1-x}} + 1$$

$$23.15. y = \frac{x+5}{x-3}$$

$$23.16. f(x) = 9^{\frac{1}{2-x}}$$

Quyidagi tenglamalar ko'rsatilgan kesmalarda yechimga ega ekanligini ko'rsating:

23.17. a) $x^3 + 3x + 1 = 0$; $[-1; 0]$ kesmada. Bu funksiya $[-1; 0]$ da uzluksiz. Kesmaning uchlaridagi qiymatlari $f(1) = -3$, $f(0) = 1$ bo'lib, turli ishorali. Boltsano – Koshi teoremasiga binoan $(-1; 0)$ da biror C nuqta topib $f(x) = c^3 + 3c + 1 = 0$ bo'lib, c berilgan tenglamalarning yechimi bo'ladi.

$$b) x^5 - 6x^2 + 3x - 7 = 0; [0; 2]$$

$$c) 3\sin^3 x - 5\sin x + 1 = 0; \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$

$$d) \cos^4 x + 3\cos x + 1 = 0; [0; \pi]$$

23.18. Quyidagi funksiyalar ko'rsatilgan kesmalarda chegaralangan ekanligini isbotlang:

$$a) f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x - \sqrt{x+1}, [0; 10]$$

$y = \sin x$, $y = \cos^2 x$ va $y = \sqrt{x+1}$ funksiyalarning har biri $[0; 10]$ da uzluksiz bo'lganligi uchun, $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x - \sqrt{x+1}$ funksiya ham $[0; 10]$ da uzluksiz. Shuning uchun Veyershtass teoremasiga binoan $f(x)$ funksiya $[0; 10]$ da chegaralangan.

$$b) f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3x + 1}}{x - 1}, [2; 7]$$

$$c) f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 1} \cdot \cos^7 x, [0; 2\pi]$$

23.19. Bir tomonlama limitlarini toping:

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{agar } -1 < x \leq 2 \\ 2x + 1, & \text{agar } 2 < x < 3 \end{cases} \quad x = 2 \text{ nuqtada}$$

$$b) y = E(x), \quad E(x) - x \text{ ning butun qismi}$$

$x = -2, x = 0, x = 1$ nuqtalarda

$$c) f(x) = \frac{1}{x-2}, \quad x = 2 \text{ nuqtada.}$$

23.20. Funksiyalarning uzluksizligini ta'rifga binoan izbotlang:

a) $f(x) = x^3 - 3$

b) $f(x) = \cos(2x + 1)$

Quyidagi funksiyalarning uzilish nuqtalari va uzilish turlarini aniqlang:

23.21. $y = \frac{x}{x+2}$

23.22. $y = 2 - \frac{|x|}{x}$

23.23. $f(x) = \begin{cases} 2, & \text{agar } x = 0 \text{ va } x = \pm 2 \\ 4 - x^2, & \text{agar } |x| < 2 \\ 4, & \text{agar } |x| > 2 \end{cases}$

23.24. $y = \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x}}}$

23.25. $y = 2^{\frac{1}{x-2}}$

24. HOSILA

$y=f(x)$ funksiya grafigining $M_0(x_0; y_0)$ nuqtasiga o'tkazilgan urinma tenglamasi

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

normal tenglamasi

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

ko'rinishga ega bo'ladi.

$M_0(x_0; y_0)$ nuqtada kesishuvchi $y=f_1(x)$ va $y=f_2(x)$ egri chiziqlar orasidagi burchak

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{f_2'(x_0) - f_1'(x_0)}{1 + f_1'(x_0)f_2'(x_0)}$$

formula orqali topiladi.

Funksiya differensial $dy=y'dx$ orqali hisoblanadi.

Agar Δx yetarlicha kichik miqdor bo'lsa, u holda $\Delta y = dy$ bo'ladi va $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$ taqribiy formula o'rinnidir.

$y = f[g(x)]$ murakkab funksiya differensial: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ yoki x_0 nuqtadagi

hosilasi: $y'(x_0) = f'(u_0) \cdot g'(x_0)$ bo'ladi.

Hosilalar jadvali:

<i>Funksiyalar</i>	<i>Hosilalar</i>
$y=C$ (bunda C -const)	$y'=0$
$y = x$	$y'=1$
$y=Cu$ (bunda C -const)	$y'=Cu'$
$y = u \pm v$	$y' = u' \pm v'$
$y = u \cdot v$	$y' = u'v + uv'$
$y = \frac{u}{v}$	$y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$y = \frac{C}{u}$, (bunda C -const)	$y' = -\frac{C}{u^2}u'$

$y = u^n$	$y' = nu^{n-1}u'$
$y = \sqrt{u}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{u}}u'$
$y = a^u$	$y' = a^u \ln a \cdot u' \quad a > 1, a \neq 1$
$y = \log_a u$	$y' = \frac{1}{u}u' \log_a e = \frac{u'}{u \ln a}$
$y = \ln u$	$y' = \frac{1}{u}u'$
$y = \sin u$	$y' = \cos u \cdot u'$
$y = \cos u$	$y' = -\sin u \cdot u'$
$y = \operatorname{tg} u$	$y' = \frac{1}{\cos^2 u}u'$
$y = \operatorname{ctg} u$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 u}u'$
$y = \sec u$	$y' = \sec u \cdot \operatorname{tg} u \cdot u'$
$y = \operatorname{cosec} u$	$y' = -\operatorname{cosec} u \cdot \operatorname{ctg} u \cdot u'$
$y = \arcsin u$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$
$y = \arccos u$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$
$y = \operatorname{arctg} u$	$y' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$
$y = \operatorname{arcctg} u$	$y' = -\frac{1}{1+u^2} \cdot u'$
$y = u \cdot v$	$y^{(n)} = u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + C_n^2 u^{(n-2)}v'' + \dots + uv^{(n)}$
$y = [f(x)]^{\varphi(x)}$	$y' = [f(x)]^{\varphi(x)} \left\{ \varphi'(x) \ln f(x) + \varphi(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right\}$
$y = \operatorname{sh} u$	$y' = \operatorname{ch} u \cdot u'$
$y = \operatorname{ch} u$	$y' = \operatorname{sh} u \cdot u'$
$y = \operatorname{th} u$	$y' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} \cdot u'$
$y = \operatorname{cth} u$	$y' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 u} \cdot u'$

Hosila ta'rifidan foydalanib, $y=f(x)$ funksiyalar uchun y' hosilasini toping:

24.1. $y = 2x^3 + 5x^2 - 7x - 4$ funksiya orttirmasini topamiz:

$$\Delta y = (2(x + \Delta x)^3 + 5(x + \Delta x)^2 - 7(x + \Delta x) - 4) - (2x^3 + 5x^2 - 7x - 4) = \\ = 6x^2 \Delta x + 6x \Delta x^2 + 2\Delta x^3 + 10x \Delta x + 5\Delta x^2 - 7\Delta x$$

$\Delta x \rightarrow 0$ intilganda quyidagi limitni topamiz:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x^2 + 6x \Delta x + 2\Delta x^2 + 10x + 5\Delta x - 7) = 6x^2 + 10x - 7 \quad \text{Shunday qilib,}$$

ta'rifga ko'ra hosila $y' = 6x^2 + 10x - 7$.

Mustaqil yechish uchun misollar:

24.2. a) $y = \frac{1}{x}$

b) $y = \sqrt{x}$

c) $y = \frac{1}{x^2}$

d) $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$

Differensiallash qoida va formulalaridan foydalanib, quyidagi funksiyalarning hosilasini toping:

24.3. $y = x + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{5x^5}$

24.4. $y = 3x^2 + 5\sqrt[3]{x^5} - \frac{4}{x^3}$

24.5. $y = x^3 \sin x$

24.6. $y = \sin x \cdot \ln x$

24.7. $y = \frac{x^4 + 1}{x^4 - 1}$

24.8. $y = x^2 \operatorname{ctgx}$

24.9. $y = x \arccos x$

24.10. $y = e^x \arctg x$

24.11. $y = \frac{\cos x}{x^2}$

24.12. $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

24.13. $y = 3x^3 \ln x - x^3$

24.14. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

24.15. $y = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$

24.16. $y = x^2 \log_3 x$

24.17. $y = \frac{\ln x}{\sin x} + x \operatorname{ctgx}$

24.18. $y = \frac{x \operatorname{tg} x}{1 + x^2}$

24.19. $y = \arctg x - \operatorname{arctg} x$

24.20. a) $y = |\ln x|$ funksiya $x=1$ da hosilaga egami? Tekshiring.

b) $y = |x|$ funksiyani $x=0$ da bir tomonli hosilalarini toping. Bu funksiya $x=0$ da hosilaga egami?

Quyidagi masalalarda egri chiziqlarga o'tkazilgan urinmalarning tenglamalari yozilsin va egri chiziqlar hamda urinmalari yasalsin:

24.21. $x^2 + 2xy^2 + 3y^4 = 6$ egri chiziqqa $M(1, -1)$ nuqtada.

Egri chiziq tenglamasidan y' hosilani topamiz:

$$2x + 2y^2 + 4xyy' + 12y^3y' = 0, \text{ ya'ni } y' = -\frac{x + y^2}{2xy + 6y^3}.$$

$$\text{Demak } y'(-1; 1) = -\frac{1 + (-1)^2}{2 \cdot 1(-1) + 6(-1)^3} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Urinma tenglamasi} \quad y + 1 = \frac{1}{4}(x - 1)$$

$$x - 4y + 5 = 0$$

$$\text{Normal tenglamasi} \quad y + 1 = -4(x - 1)$$

$$4x + y - 3 = 0.$$

$$24.22. \quad y = \frac{x^3}{3} \quad x = -1 \text{ nuqtada;}$$

$$24.23. \quad y = \frac{8}{4 + x^2} \quad x = 2 \text{ nuqtada;}$$

$$24.24. \quad y = \sin x \quad x = \pi \text{ nuqtada;}$$

24.25. $y = x^2 + 2x - 1$ parabolaning $y = 2x^2$ parabola bilan kesishgan nuqtasida o'tkazilgan urinma va normal tenglamalarini yozing.

$$24.26. \quad y = x^2 \text{ va } y^2 = x \text{ parabolalar qanday burchak ostida kesishadi?}$$

$$24.27. \quad y = \sin x \text{ sinusoida } Ox \text{ o'qini qanday burchak ostida kesib o'tadi?}$$

$$24.28. \quad y = x - x^3 \text{ va } y = 5x \text{ chiziqlar orasidagi burchakni toping.}$$

$$24.29. \quad y = 1 + \sin x, \quad y = 1 \text{ chiziqlar orasidagi burchakni toping.}$$

$$24.30. \quad y = 2x^3 + 5x^2 \text{ funksiyaning orttirmasini va differensialini toping.}$$

24.31. $f(x) = x^3 - 7x^2 + 8$ funksiya uchun $\Delta x = 0.01$ bo'lsa, $\Delta f(5)$ va $df(5)$ ni hisoblang.

24.32. Quyidagi funksiyalarning differensialini toping:

$$a) y = \frac{3}{4}x\sqrt[3]{x}$$

$$b) y = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$$

$$c) y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$$

$$d) y = \frac{2^{3x}}{3^{2x}}$$

Quyidagilarni taqribiy hisoblang:

$$24.33. \arcsin 0.51$$

$y = \arcsin x$ funksiya uchun $x=0.5$ va $\Delta x = 0,01$ deb olamiz. Taqribiy hisoblash formulasiga ko'ra topamiz. $\arcsin(x + \Delta x) \approx \arcsin x + (\arcsin x)' \cdot \Delta x$

$$\arcsin 0.51 \approx \arcsin 0.5 + \frac{1}{\sqrt{1-(0.5)^2}} \cdot 0.01 = \frac{\pi}{6} + 0.011 = 0.513.$$

$$24.34. \sqrt[3]{1.02}$$

$$24.35. \sqrt[5]{33}$$

$$24.36. \sin 29^\circ$$

$$24.37. \arctg 1.05$$

Funksiyalarning hosilasini toping:

$$24.38. y = (1 + \sqrt[3]{x})^2$$

$$24.39. y = \frac{3}{\sqrt[3]{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$24.40. y = x^{\frac{3}{2}} \sin x$$

$$24.41. y = \sqrt[5]{x} \arctg x$$

$$24.42. y = \frac{x^7 - 5x^4 + 1}{x^2 + 1}$$

$$24.43. y = \frac{\cos x}{1 + 2 \sin x}$$

24.44. $y = x^2 - 3x + 5$ parabolaning $M_0(2; 3)$ nuqtasida o'tkazilgan urinma va normal tenglamasini tuzing.

24.45. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{8} = 1$ gipirbolaga $M_0(-9; -8)$ nuqtasida o'tkazilgan urinma tenglamasini tuzing.

24.46. $y = x^2$ parabolaning qaysi nuqtasida o'tkazilgan urinma

a) $y = 4x - 5$ to'g'ri chiziqqa parallel;

b) $2x - 6y + 5 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'ladi?

24.47. $2y = x^2$ va $2y = 8 - x^2$ egri chiziqlar qanday burchak ostida kesishadi?

Funksiyalar differensialini toping:

24.48. $y = \operatorname{arctg} \frac{x}{a}; \quad dy - ?$

24.49. $y = e^{2x} \arcsin x; \quad dy - ?$

24.50. $y = x \ln x; \quad dy - ?$

24.51. $y = \frac{(x+1)^2}{(x+2)^3(x+3)^4} \quad dy - ?$

Quyidagilarni taqribiy hisoblang:

24.52. $\operatorname{tg} 46^\circ$

24.53. $\operatorname{Cos} 31^\circ$

24.54. $\ln \operatorname{tg} 47^\circ 15'$

24.55. $\sqrt[4]{15.8}$

25. YUQORI TARTIBLI HOSILALAR

$y=f(x)$ funksiya uchun birinchi tartibli hosilasi y' aniqlangan bo'lsin. Birinchi hosiladan olingan hosila *ikkinchi tartibli hosila* yoki boshlang'ich funksiyaning *ikkinchi hosilasi* deyiladi va y'' yoki $f''(x)$ simvol bilan belgilanadi:

$$y''=(y')'=f''(x).$$

Ikkinchi hosiladan olingan hosila *uchinchi tartibli hosila* yoki boshlang'ich funksiyaning *uchinchi hosilasi* deyiladi va y''' yoki $f'''(x)$ simvol bilan belgilanadi:

Umuman $f(x)$ funksiyaning *n-tartibli hosilasi* deb uning $(n-1)$ -tartibli hosilasidan (birinchi tartibli) hosilasiga aytiladi va $y^{(n)}$ yoki $f^{(n)}(x)$ simvol bilan belgilanadi:

$$y^{(n)}=(y^{(n-1)})'=f^{(n)}(x).$$

Bunda ushbu formulalar o'rinli:

$$(U+V)^{(n)}=U^{(n)}+V^{(n)};$$

$$(CU)^{(n)}=C \cdot U^{(n)};$$

$$(U \cdot V)^{(n)}=U^{(n)}V+nU^{(n-1)}V'+\frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}U^{(n-2)}V''+\dots+UV^{(n)} \text{ (Leybnits formulasi).}$$

Yuqori tartibli differensiallar ham shunday ta'riflanadi:

n-tartibli differensial deb $(n-1)$ -tartibli differensialning birinchi differensialiga aytiladi:

$$d^n y = d(d^{n-1} y) = [f^{(n-1)}(x)dx^{n-1}]dx$$

$$d^n(y) = f^{(n)}(x)dx^n.$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Murakkab funksiya hosilasini toping:

$$25.1. \quad y = \frac{1}{3} \sin^3 \sqrt{x} - \frac{2}{5} \sin^5 \sqrt{x} + \frac{1}{7} \sin^7 \sqrt{x}$$

$$y' = \frac{1}{3} \cdot 3 \sin^2 \sqrt{x} \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{5} \cdot 5 \sin^4 \sqrt{x} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{7} \cdot 7 \sin^6 \sqrt{x} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin^2 \sqrt{x} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot (1 - 2 \sin^2 \sqrt{x} + \sin^4 \sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sin^2 \sqrt{x} \cdot \cos^5 \sqrt{x}$$

$$25.2. y = \ln(2x^3 + 3x^2)$$

$$25.3. y = \sqrt{4x + \sin 4x}$$

$$25.4. y = \sqrt{\frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}$$

$$25.5. y = e^{\frac{x}{a}} \cdot \cos \frac{x}{a}$$

$$25.6. y = \sqrt{1 - 3x^2}$$

$$25.7. y = \cos^3\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$25.8. y = -\operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2} - 2 \ln\left(\sin \frac{x}{2}\right)$$

$$25.9. y = \arccos \frac{9 - x^2}{9 + x^2}$$

$$25.10. y = 1 - e^{\sin^2 3x} \cdot \cos^2 3x$$

$$25.11. y = e^{\sqrt{2x}} (\sqrt{2x} - 1)$$

$$25.12. y = -\operatorname{cosec}^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$25.13. y = \arcsin \sqrt{1 - 0.2x^2}$$

$$25.14. y = \frac{1}{\sqrt{1 - mx^2}}$$

$$25.15. y = \frac{\sin x}{1 + \ln \sin x}$$

$$25.16. y = \operatorname{arctg}(x+1) + \frac{x+1}{x^2 + 2x + 2}$$

$$25.17. y = \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x$$

$$25.18. y = \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x}$$

$$25.19. y = \ln \ln x (\ln \ln x - 1)$$

$$25.20. y = \operatorname{tg}^3 \operatorname{tg} x + 3 \operatorname{tg} \operatorname{tg} x$$

$$25.21. y = 2^{\cos 3x - 3 \cos x}$$

$$25.22. y = \frac{x^2 e^{x^2}}{x^2 + 1}$$

$$25.23. y = \operatorname{arctg} \frac{2x^4}{1 - x^2}$$

$$25.24. y = \arccos \sqrt{1 - 2^x}$$

$$25.25. y = \log_2 \sin^2 x$$

$$25.26. y = x e^x (\sin x - \cos x) + e^x \cos x$$

$$25.27. y = \log_x e$$

$$25.28. y = x^x$$

$$25.29. y = \sqrt[3]{x \sqrt{x \sqrt{x}}}$$

$$25.30. y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$$

Oshkormas ko‘rinishda berilgan funksiyalar hosilasini toping:

$$25.31. x^3 + \ln y - x^2 e^y = 0 \quad 3x^2 + \frac{y'}{y} - x^2 e^y y' - 2x e^y = 0, \text{ ya'ni } y' = \frac{(2x e^y - 3x^2)y}{1 - x^2 y e^y}$$

$$25.32. Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

$$25.33. x^4 - 6x^2y^2 + 9y^4 - 5x^2 + 15y^2 - 100 = 0$$

$$25.34. x^y - y^x = 0$$

$$25.35. x \sin y + y \sin x = 0$$

$$25.36. e^x + e^y - 2^{xy} - 1 = 0$$

$$25.37. \sin(y - x^2) - \ln(y - x^2) + 2\sqrt{y - x^2} - 3 = 0$$

$$25.38. \frac{y}{x} + e^{\frac{y}{x}} - 3\sqrt{\frac{y}{x}} = 0$$

Parametrik ko‘rinishda berilgan quyidagi funksiyalarni differensiallang:

$$25.39. \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$$

$$25.40. \begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$$

$$25.41. \begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^2} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases}$$

$$25.42. \begin{cases} x = \operatorname{cht} \\ y = \operatorname{sht} \end{cases}$$

25.43. Funksiyalarning 2-tartibli hosilalari topilsin:

$$1) y = \sin^2 x; \quad 2) y = \operatorname{tg} x; \quad 3) y = \sqrt{1+x^2}.$$

25.44. Quyidagi funksiyalarning 3-tartibli hosilalari topilsin:

$$1) y = x \ln x; \quad 2) s = t \cdot e^{-t}; \quad 3) y = \operatorname{arctg} \frac{x}{a}.$$

Quyidagi funksiyalarning n-tartibli hosilalari topilsin:

$$25.45. y = \ln x$$

$$y' = \frac{1}{x} = x^{-1}; \quad y'' = -1 \cdot x^{-2}; \quad y''' = 1 \cdot (-2) \cdot x^{-3}; \quad y^{(IV)} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x^{-4};$$

$$y^{(n)} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot (-1)^{n-1} \cdot x^{-n} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{x^n}.$$

$$25.46. y = e^{-\frac{x}{a}};$$

$$25.47. y = \sqrt{x};$$

$$25.48. y = x^n;$$

$$25.49. y = \sin x;$$

$$25.50. y = \cos^2 x;$$

$$25.51. \begin{cases} x = \ln t \\ y = 1/t \end{cases}$$

Quyidagi funksiyalarning 1, 2, 3-tartibli differensiallarini toping:

25.52. $y = x \sin x$

25.53. $y = x(\ln x - 1)$

Funksiyalarning hosilasini toping:

25.54. $y = \frac{3}{4} \cdot 4x^3 \sqrt{x}$

25.55. $y = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$

25.56. $y = \ln(2x^3 + 3x^2)$

25.57. $y = \ln \operatorname{tg} \frac{2x+1}{4}$

25.58. $y = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}$

25.59. $y = \operatorname{arctg} \sqrt{4x^2 - 1}$

25.60. $y = e^{-x} - \sin e^{-x} \cos e^{-x}$

25.61. $y = \ln \frac{x^5}{x^5 + 2}$

25.62. $y = \frac{x - e^{2x}}{x + e^{2x}}$

25.63. $y = 3x \sin^3 x + 3 \cos x - \cos 3x$

25.64. $y = \ln \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x + 1}$

25.65. $y = \frac{\ln x}{x^5} + \frac{1}{5x^5}$

25.66. $y = 2(\operatorname{tg} \sqrt{x} - \sqrt{x})$

25.67. $y = \log_a (x + \sqrt{x^2 + 9})$

25.68. $y = \log_{\cos x} \sin x$

25.69. $y = x^{1/\ln x}$

25.70. $y = x^2 e^{x^2} \ln x$

25.71. $(u^v)' = vu^{v-1}u' + u^v v' \ln u$ ekanini ko'rsating.

Quyidagi tenglamalardan y' ni toping:

25.72. 1) $x^2 + y^2 = a^2$; 2) $y^2 = 2px$ 3) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

25.73. 1) $x^2 + xy + y^2 = 6$; 2) $x^2 + y^2 - xy = 0$

25.74. 1) $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$; 2) $e^y - e^{-x} + xy = 0$

25.75. $e^x \sin u - e^{-y} \cos x = 0$

25.76. $x = y + \operatorname{arctg} y$

25.77. 1) $x^2 + y^2 = a^2$; 2) $ax + ay - xy = c$; 3) $x^m y^n = 1$ tenglamalardan

y'' topilsin.

25.78. Tenglamalardan $\frac{d^2y}{dx^2}$ topilsin:

$$1) \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x = t^2 \\ y = \frac{t^3}{3} - t \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

25.79. Funktsiyalarning 2-tartibli hosilalari topilsin:

$$1) y = e^{-x^2}; \quad 2) y = \operatorname{ctgx}; \quad 3) \arcsin \frac{x}{2}$$

Funksiyalarning n-tartibli hosilalari topilsin:

$$25.80. y = x^{\sqrt[n]{x}} \quad 25.81. y = \frac{1}{2x+1}$$

$$25.82. y = 5 - 3\cos^2 x \quad 25.83. y = 2^x + 2^{-x}$$

$$25.84. y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad 25.85. y = e^{kx}$$

25.86. $y = (2x-3)^3$ funksiyaning 1, 2, 3-tartibli differensiallarini toping.

26. LOPITAL QOIDASI

Roll teoremasi: $y = f(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. Agar funksiya $(a;b)$ intervalda differensiallanuvchi bo'lib, $f(a)=f(b)$ tenglik o'rinli bo'lsa, u holda $(a;b)$ intervalga tegishli hech bo'lmaganda bitta shunday bir c nuqta topiladiki, $f'(c)=0$ bo'ladi.

Lagranj teoremasi: $y = f(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lib, $(a;b)$ intervalda differensiallanuvchi bo'lsa, u holda $(a;b)$ intervalga tegishli hech bo'lmaganda bitta shunday bir c nuqta topiladiki, $f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$ munosabat o'rinli bo'ladi.

Taylor-Makloren formulasi

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \text{ ifoda}$$

Taylor formulasi, $R_n(x)$ Taylor formulasining qoldiq hadi.

Taylor formulasining $a=0$ dagi hususiy ko'rinishi

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

Makloren formulasi deyiladi.

Bu formula funksiyaning erkli o'zgaruvchi x ning darajalari bo'yicha yoyilmasini beradi.

Roll, Lagranj, Koshi teoremlariga doir misollar.

26.1. $f(x) = \frac{x^4}{4}$ funksiya uchun $[-1;1]$ segmentda Roll teoremasini tatbiq etish mumkinmi?


a) $f(x)$ funksiya uchun Roll teoremasining birinchi sharti bajariladi: $f(x)$ funksiya $[-1;1]$ da uzluksiz.

b) $f(x)$ funksiya uchun ikkinchi shart ham bajariladi. $f'(x) = x^3$ hosila mavjud.

a) $f(x)$ funksiya uchun $f(-1)=f(1)=1/4$ tenglik o‘rinli. Demak, $f'(c)=0$ bo‘ladigan nuqta mavjud: $f'(x)=x^3=0$, $x=c=0$ da o‘rinli.

$$f'(c)=f'(0)=0$$

26.2. $y=x^2$ parabolaning qaysi nuqtasiga o‘tkazilgan urinma $A(-1;1)$ va $B(3;9)$ nuqtalarni birlashtiruvchi vatarga parallel bo‘ladi?



$$a = -1; b = 3$$

$$AB \text{ vatarining burchak koeffitsienti } K = \frac{9-1}{3+1} = 2$$

$f'(x)=2x$; $2x=2$ tenglik faqat $x=1$ bo‘lganda o‘rinli, demak $x=1$ nuqtaga o‘tkazilgan urinma vatarga parallel.

Mustaqil yechish uchun misollar:

26.3. Roll teoremasini $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$ funksiya uchun $[-1;1]$ segmentda tatbiq qilish mumkinmi?

26.4. $f(x)=x^2-6x+100$ funksiya uchun Roll teoremasi shartlari x ning qanday qiymatlarida qanoatlantiradi?

$$a=1, b=5.$$

26.5. $[a, b]$ segmentda $f(x)=x^2$ funksiya uchun Lagranj formulasi yozilsin va $C(x,y)$ nuqta topilsin

26.6. $[1;4]$ segmentda $f(x)=\sqrt{x}$ funksiya uchun Lagranj formulasi yozilsin va $C(x,y)$ nuqta topilsin.

26.7. $y=2x-x^2$ egri chiziqning AB yoyi ustida shunday $M(x,y)$ nuqtani topingki, bu nuqtaga o‘tkazilgan urinma AB vatarga parallel bo‘lsin: $A(1;1)$ $B(3;-3)$

26.8. $f(x)=x^3$ va $\varphi(x)=x^2$ funksiyalar uchun Koshining

$$\frac{f(b)-f(a)}{\varphi(b)-\varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}$$
 formulasi yozilsin hamda c topilsin.

Quyidagi funksiyalarni Makloren formulasi bo'yicha yozing:

$$26.9. f(x) = e^x$$

$$26.10. f(x) = \sin x$$

$$26.11. f(x) = \ln(1+x)$$

26.12. $\sqrt{e^x}$ ni Makloren formulasiga ko'ra $x=1$ da hisoblang (4 ta hadini olib).

Lopital qoidasi

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{\varphi''(x)} = \dots$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f''(x)}{\varphi''(x)} = \dots$$

Quyidagi funksiyalar limitini hisoblang:

$$26.13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax}{b \cos ax} = \frac{a}{b}$$

$$26.14. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 6x + 8}$$

$$26.15. \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{x - a}$$

$$26.16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$$

$$26.17. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 4 \sin^2 \frac{\pi x}{6}}{1 - x^2}$$

$$26.18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$26.19. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$$

$$26.20. \lim_{x \rightarrow \infty} (1-x)^{\frac{1}{x}} y = (1-x)^{\frac{1}{x}} \text{ deb belgilab, tenglikning ikkala qismini}$$

ligarifmlaymiz $\ln y = \frac{1}{x} \ln |1-x| = \frac{\ln |1-x|}{x}$. Endi limitga o'tamiz

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln |1-x|}{x} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1/|1-x|}{1} = 0. \ln y = 0, y = 1$$

$$26.21. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x}$$

$$26.22. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right)^{\sin x}$$

$$26.23. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\tan x)^{2 \cos x}$$

$$26.24. \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\sin x}$$

$$26.25. \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$$

26.26. $f(x) = \sqrt[3]{8x - x^2}$ funksiya uchun $a=0$, $b=8$ bo'lganda Roll teoremasi shartlari x ning qanday qiymatlarida bajariladi?

26.27. $[-1;2]$ segmentda $4/x$ va $1 - \sqrt[3]{x^2}$ funksiyalariga Lagranj teoremasini tatbiq qilish mumkin emasligi ko'rsatilsin.

26.28. Tenglamalari $x=t^2$, $y=t^3$ parametrik ko'rinishda berilgan egri chiziqlarning AB yoyida shunday M nuqtani topingki, bu nuqtada o'tkazilgan urinma AB vatarga parallel bo'lsin, A va B nuqtalarga $t=1$, $t=3$ qiymatlar mos keladi.

26.29. $y=x^3-3x$ egri chiziqlarning AB yoyining qaysi nuqtasida o'tkazilgan urinma AB vatarga parallel bo'ladi: $A(0;0)$, $B(3;8)$

26.30. Quyidagi funksiyalar uchun Lagranj formulasi yozilsin va $C(x,y)$ nuqta topilsin.

1) $[0;1]$ segmentda $f(x) = \arctg x$

2) $[0;1]$ segmentda $f(x) = \arcsin x$

3) $[1;2]$ segmentda $f(x) = \ln x$

26.31. Quyidagi funksiyalar uchun Koshi formulasi yozilsin va C nuqta topilsin:

1) $[0; \pi/2]$ segmentda $\sin x$ va $\cos x$ 2) $[1;4]$ segmentda x^2 va \sqrt{x}

Quyidagi funksiyalarni Makloren formulasi bo'yicha yozing:

26.32. $f(x) = \cos x$

26.33. $f(x) = (1+x)^a$

Quyidagi funksiyalar limitini toping:

26.34. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi - 2\arctg x}{e^x - 1}$

26.35. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - (e^x + e^{-x})\cos x}{x^4}$

26.36. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 3x - 1}{\sin^2 5x}$

26.37. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3xe^x + 3x}{\arctg x - \sin x - \frac{x^3}{6}}$

26.38. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{1 + 2\ln \sin x}$

26.39. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{\operatorname{ctg} \pi x}$

26.40. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) \operatorname{ctg} x$

26.41. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x \right)$

26.42. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}}$

26.43. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

27. FUNKSIYANI HOSILA YORDAMIDA TO'LA TEKSHIRISH

Funksiyani tekshirish va grafigini yasash quyidagi umumiy sxema bo'yicha bajariladi:

1) Funksiyaning aniqlanish sohasi topiladi.

2) Funksiya juft ($f(-x) = f(x)$, $\pm x \in D(f)$), toqligi ($f(-x) = -f(x)$, $\pm x \in D(f)$) yoki juft ham emas, toq ham emasligi aniqlanadi. Agar funksiyaning juft yoki toqligi aniqlansa, funksiyaning musbat yoki manfiy haqiqiy sonlar yarim o'qida tekshirish yetarli.

Agar funksiya juft funksiya bo'lsa, bu funksiyaning grafigi Oy o'qiga nisbatan simmetrik, toq bo'lsa koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi.

3) Davriy yoki davriymasligi aniqlanadi. Davriy funksiyaning bir davr oralag'ida tekshirish yetarli.

4) Funksiya grafigining koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari topiladi. Ox o'qi bilan kesishish nuqtalari $\begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \end{cases}$ sistema, Oy o'qi bilan kesishish nuqtalari esa

$\begin{cases} y = f(x) \\ x = 0 \end{cases}$ sistemani yechish bilan topiladi. Funksiya grafigining asimptotalari quriladi.

5) Uzilish nuqtalari aniqlanadi va ularning atrofida funksiyaning o'zini tutishi tekshiriladi. Funksiyaning og'ma asimptotasi

$$(k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx], \quad y = kx + b) \text{ tekshiriladi}$$

6) Funksiyaning o'sish va kamayish intervallari, maksimum va minimum nuqtalari topiladi.

7) Funksiya grafigining qavariqligi va egilish nuqtalari topiladi.

8) Yig'ilgan ma'lumotlar jadval ko'rinishida tuziladi.

9) Funksiya grafigi yasaladi.

27.1. Quyidagi berilgan funksiyaning tekshirib, grafigini chizing:

$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ berilgan funksiya $D = \{(-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty)\}$ to'plamda aniqlangan.

Bu funksiya uchun $f(-x) = f(x)$ bo'lganidan u juftdir va uni $[0; +\infty]$ oraliqda tekshirish kifoya.

Funksiyaning birinchi va ikkinchi tartibli hosilalari:

$$f'(x) = \frac{-4x}{(x^2 - 1)^2} \quad f''(x) = \frac{4(1 + 3x^2)}{(x^2 - 1)^3}$$

Birinchi tartibli hosila $[0; +\infty)$ oraliqning $x=1$ nuqtasidan boshqa barcha nuqtalarida aniqlangan va $x=0$ nuqtada nolga aylanadi. Ikkinchi tartibli hosilaning $x=0$ nuqtadagi qiymati $f''(0) = -4 < 0$, shuning uchun $f(x)$ funksiya $x=0$ nuqtada maksimumga ega va bu maksimum qiymat $f(0) = -1$ bo'ladi.

Endi $(0; 1)$ va $(1; +\infty)$ da $f'(x) < 0$ bo'lganidan bu to'plamda $f(x)$ ning kamayuvchiligi kelib chiqadi. So'ngra:

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = +\infty$$

bo'lgani uchun $x = \pm 1$ (funksiyaning ikkinchi tur uzilish nuqtalari) to'g'ri chiziqlar vertical asimptotalar ekanligini va


$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \cdot \frac{1}{x} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = 1$$

limitlarga ko'ra $y=1$ gorizontaal to'g'ri chiziq $f(x)$ funksiya grafigining asimptotasi ekanligini hosil qilamiz.

Endi $1 + 3x^2 = 0$ tenglama xaqiqiy sonlar o'qida yechimga ega bo'lmaganligi sababli funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi nolga teng bo'lmasligi, ya'ni egilish nuqtasi yo'qligi kelib chiqadi. Ikkinchi tartibli hosilaning qiymatlari $[0; 1)$ da $f''(x) > 0$, $(1; +\infty)$ da $f''(x) < 0$. Demak, funksiya grafigi $(-1; 1)$ da qavariq, hamda $(-\infty; -1)$ va $(1; +\infty)$ da botiq bo'ladi.

	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 0)$	0	$(0; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$f'(x)$	+		+	0	-		-
$f''(x)$	+		-	-4	-		+
$f(x)$	\nearrow		\nearrow	-1	\searrow		\searrow
	\cup	II tur uzilish	\cap	max	\cap	II tur uzilish	\cup



Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi funksiyalar grafiklarining asimptotalarini toping:

$$27.2. y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 2}$$

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 2} = \infty$, ya'ni $x = -2$ to'g'ri chiziq vertical asimptotadir.

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 3}{x(x + 2)} = 1 \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 2} - x \right] = -4 \text{ demak } y = kx + b \text{ formulaga}$$

ko'ra $y = x - 4$ to'g'ri chiziq og'ma asimptotadir.

$$27.3. y = \frac{2x}{x - 1}$$

$$27.4. y = \frac{x}{2x - 1} + x$$

$$27.5. y = \frac{\ln x}{x}$$

$$27.6. y = \frac{1}{x} + 4x^2$$

$$27.7. y = 2\sqrt{x^2 + 4}$$

$$27.8. y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$27.9. y = x + \frac{\sin x}{x}$$

$$27.10. \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Quyidagi berilgan funksiyalarni tekshirib, grafiklarini chizing:

$$27.11. y = \sqrt[3]{1-x^3}$$

$$27.12. y = \sin^2 x$$

$$27.13. y = \ln x - \ln(x-1)$$

$$27.14. y = \frac{x^3}{x^2-4}$$

$$27.15. y = 16x(x-1)^3$$

$$27.16. y = 2\sin x + \cos 2x \quad ([0, \pi)) \text{ oraliqda}$$

$$27.17. y = \frac{x^2}{x-2}$$

$$27.18. y = (x-1)\sqrt{x}$$

$$27.19. y = \ln \frac{x}{x-1}$$

$$27.20. y = \sin 2x - x \quad \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \text{ oraliqda}$$

$$27.21. y = 2x \pm \operatorname{ctg} x$$

$$(0, \pi) \text{ oraliqda}$$

$$27.22. y = x + e^{-x}$$

$$27.23. y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$27.24. y = \frac{x^3}{(x-2)^2}$$

Quyidagi funksiyalar grafiklarining asimptotalarini toping:

$$27.25. y = 2x - \frac{\cos x}{x}$$

$$27.26. y = \frac{\ln^2 x}{x} - 3x$$

$$27.27. y = x^2 \cdot e^{-x}$$

$$27.28. y = 0.5x + \operatorname{arctg} x$$

$$27.29. y = -x \operatorname{arctg} x$$

28. TO‘LA DIFFERENSIALGA DOIR MISOLLAR YECHISH

Ikki, uch va undan ko‘p o‘zgaruvchiga bog‘liq bo‘lgan funksiyalar *ko‘p o‘zgaruvchiga bog‘liq funksiyalar* deyiladi va

$$z=f(x;y)$$

$$u=f(x;y;z) \dots$$

$$v=f(x;y;z; \dots; t)$$

kabi yoziladi. Ko‘p o‘zgaruvchiga bog‘liq funksialardan bir o‘zgaruvchisi bo‘yicha xususiy hosila hisoblaganda boshqa o‘zgaruvchilari o‘zgarmas deb qaraladi. *Ko‘p o‘zgaruvchiga bog‘liq funksiyaning to‘la differensial*i quyidagi formula bo‘yicha topiladi:

$z=f(x,y)$ funksiya uchun

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$u=f(x,y,z)$ funksiya uchun

$$du = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

28.1. $z(x,y) = y\sqrt{x} + \frac{x}{\sqrt{y}}$ funksiya xususiy hosilalarini toping. $z(x,y)$

funksiyadan x bo‘yicha xususiy hosilani hisoblaganda o‘zgaruvchi y ni o‘zgarmas son deb qaraymiz:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} y + \frac{1}{\sqrt{y}};$$

$z(x,y)$ funksiya dan o‘zgaruvchi y bo‘yicha xususiy hosilani hisoblaganda o‘zgaruvchi x ni o‘zgarmas son deb qaraymiz:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \sqrt{x} - \frac{x}{2y \cdot \sqrt{y}}$$

28.2. $z(x,y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$ funksiyaning to‘la differensialini toping:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\left(x + \sqrt{x^2 + y^2}\right)'_x}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1 + \frac{(x^2 + y^2)'_x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\left(x + \sqrt{x^2 + y^2}\right)'_y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2} \left(x + \sqrt{x^2 + y^2}\right)};$$

$$dz = \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{dy}{\sqrt{x^2 + y^2} \left(x + \sqrt{x^2 + y^2}\right)};$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi funksiyalarning xususiy hosilalarini toping:

$$28.3. \quad z(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$$

$$28.4. \quad u = e^{\frac{x}{y}} + e^{\frac{y}{x}}$$

$$28.5. \quad z(x, y) = -\frac{\cos x}{\cos y}$$

$$28.6. \quad z(x, y) = \ln(x^2 - y^2);$$

$$28.7. \quad z(x, y) = x \sin(x + y);$$

$$28.8. \quad z(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$28.9. \quad z(x, y) = \arcsin \frac{y}{x}$$

$$28.10. \quad u = 2y\sqrt{x} + 3y^2 \sqrt[3]{z^2};$$

$$28.11. \quad z(x, y) = \sqrt{xy + \frac{x}{y}}$$

$$28.12. \quad z(x, y) = e^{\sin \frac{y}{x}};$$

Quyidagi funksiyalar to'la differensiallarini toping:

$$28.13. \quad z = 5x^3 y^2;$$

$$28.14. \quad z = \frac{y}{x} - \frac{x}{y};$$

$$28.15. \quad z = (\sin x)^{\cos y};$$

$$28.16. \quad z = e^{x^2 + y^2};$$

$$28.17. \quad z = \arctg \frac{x}{y};$$

$$28.18. \quad z = \sin^2 x + \cos^2 y;$$

$$28.19. \quad z = x \ln \frac{y}{x};$$

$$28.20. \quad z = x^y;$$

$$28.21. \quad z = \tg \frac{y}{x} + \ctg \frac{x}{y};$$

$$28.22. \quad z = \tg(2x + \sqrt{y});$$

28.23. $z = e^{xy}$.

28.24. $z = \sqrt{x} \sin \frac{y}{x}$; $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{2}$ ekani isbot qilinsin.

28.25. $z = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$; $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{2}$ ekani isbot qilinsin.

Quyidagi funksiyalar xususiy hosilalarini toping:

28.26. $z = \cos(ax - by)$; 28.27. $z = \frac{x}{3y-2x}$;

28.28. $z = \ln \sin(x - 2y)$; 28.29. $z = 2\cos^2\left(x - \frac{y}{2}\right)$;

28.30. $z = \ln tg \frac{y}{x}$; 28.31. $z = \arctg \sqrt{xy}$;

28.32. $z = y e^{\frac{x}{y}}$; 28.33. $u = (x-y)(x-z)(y-z)$.

Quyidagi funksiyalar to'la differensialini toping:

28.34. $z = x^m y^n$; 28.35. $z = y \sqrt[3]{x}$;

28.36. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$; 28.37. $z = e^{\cos(xy)}$;

28.38. $z = \frac{x}{y} e^{xy}$; 28.39. $u = x y^2 z$.

29. YUQORI TARTIBLI XUSUSIY HOSILALAR

$z = f(x, y)$ funksiyaning biror $M_0(x_0, y_0) \in R^2$ nuqtadagi gradienti deb, koordinatalari M_0 nuqtadagi $f(x, y)$ funksiyaning mos xususiy hosilalar qiymatlariga teng bo'lgan ikki o'lchovli vektorga aytiladi va $grad|_{M=M_0}$ kabi yoziladi.

$$grad u|_{M_0} = \left\{ \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x}; \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} \right\}$$

Gradient uzunligi $|grad z| = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$ formula bo'yicha hisoblanadi.

$u = f(x; y; z)$ funksiya uchun $M_0(x_0; y_0; z_0)$ nuqtadagi gradiyent va uzunligi

$$grad u|_{M_0} = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y}; \frac{\partial u}{\partial z} \right\}$$

$$|grad u| = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}$$

formulalar bo'yicha hisoblanadi.

29.1. Quyidagi funksiylarning nuqtalardagi gradiyenti va uzunligini toping:

a) $u = xy^2z^3$ funksiyaning $M_0(3; 2; 1)$ nuqtada toping.

Buning uchun berilgan funksiya xususiy hosilalarini topamiz:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2z^3; \frac{\partial u}{\partial y} = 2xyz^3; \frac{\partial u}{\partial z} = 3xy^2z^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}|_{M_0} = 4; \frac{\partial u}{\partial y}|_{M_0} = 12; \frac{\partial u}{\partial z}|_{M_0} = 36$$

$$gradu|_{M_0} = \{4; 12; 36\}$$

$$|gradu|_{M_0} = \sqrt{4^2 + 12^2 + 36^2} = \sqrt{1456}$$

b) $z = \ln(x^2 + y^2)$, $M(3; 4)$ nuqtada.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial z(3,4)}{\partial x} = \frac{6}{25}; \frac{\partial z(3,4)}{\partial y} = \frac{8}{25};$$

$$|gradu| = \sqrt{\left(\frac{6}{25}\right)^2 + \left(\frac{8}{25}\right)^2} = \frac{2}{5}$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi funksiyalarning nuqtalardagi gradiyenti va uzunligini toping:

29.2. $z = \sqrt{4 + x^2 + y^2}$, (2; 1) da

29.3. $z = \arctg \frac{x}{y}$, $(x_0; y_0)$ da

29.4. $u = xyz$, (1; 2; 1) da

29.5. $u = t g x - x + 3 \sin y - \sin^3 y + z + ct g z$, $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right)$ da

Quyidagi funksiyalarning ekstremum nuqtalarini toping:

29.6. $z = e^{\frac{x}{2}}(x + y^2)$

Avvalo kritik nuqtalarni topamiz. Buning uchun ikki o'zgaruvchi bo'yicha hosilani topib, ularni nolga tenglab, sistemani yechamiz:

$$\begin{cases} z'_x = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}(x + y^2 + 2) \\ z'_y = e^{\frac{x}{2}} \cdot 2y \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}(x + y^2 + 2) = 0 \\ e^{\frac{x}{2}} \cdot 2y = 0 \end{cases}$$

Bu sistema $\begin{cases} x + y^2 + 2 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ sistemaga teng kuchli.

Bu sistemaning yechimi $x = -2, y = 0$ bo'ladi. Demak $(-2; 0)$ kritik nuqta. II tartibli xususiylar hosilalarni $A = z''_{xx}$; $B = z''_{xy}$; $C = z''_{yy}$ ko'rinishda belgilab, ularni kritik nuqtalardagi qiymatlarini topamiz:

$$z''_{xx} = \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}}(x + y^2 + 4), \quad z''_{xy} = e^{\frac{x}{2}} \cdot y, \quad z''_{yy} = 2e^{\frac{x}{2}}$$

$$A = \frac{e^{-1}}{2}, \quad B = 0; \quad C = 2e^{-1}$$

Bundan $\Delta = B^2 - A \cdot C = -\frac{e^{-1}}{2} \cdot 2e^{-1} = -e^{-2}$, $\Delta < 0$ bo'lgani uchun

$(-2; 0)$ da funksiya ekstremumga ega $A > 0$ bo'lgani uchun $(-2; 0)$ minimumga ega.

$$29.7. z = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$$

$$29.8. z = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$$

$$29.9. z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1$$

$$29.10. z = 2xy - 4x - 2y$$

Funksiyaning ko'rsatilgan sohalardagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping:

$$29.11. z = x^2 - y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 4 \text{ doirada}$$

1) Funksiyaning berilgan sohadagi kritik nuqtalarini topamiz:

$$\begin{cases} z'_x = 2x \\ z'_y = -2y \end{cases} \quad \begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Demak, $(0, 0)$ kritik nuqta va u sohaga tegishli.

2) Funksiyaning topilgan nuqtadagi qiymatini topamiz: $z_1 = (0; 0) = 0$

3) Funksiyaning sohaning chegarasidagi eng kichik va eng katta qiymatini topamiz.

Bu sohaning chegarasi $x^2 + y^2 = 4$ aylanadan iborat, $y^2 = 4 - x^2$ buni berilgan funksiya qo'ysak $z = x^2 - (4 - x^2)$, $z = 2x^2 - 4$, $x^2 + y^2 = 4$ aylana ustidagi nuqtalar uchun $x \in [-2, 2]$, shuning uchun $z = 2x^2 - 4$ funksiyaning $[-2, 2]$ dagi eng kichik va eng katta qiymatlarini topamiz. Buning uchun bu funksiyaning kritik nuqtalarini topamiz $z' = 4x$, $4x = 0$, $x = 0$

b) Funksiyaning kritik nuqtalaridagi $z_2(0) = -4$ ni topamiz.

c) Funksiyaning chegaraviy nuqtalardagi qiymatini topamiz:

$$z_4(2) = 2 \cdot 2^2 - 4 = 4, \quad z_3(-2) = 2 \cdot (-2)^2 - 4 = 4$$

4) Topilgan z_1, z_2, z_3, z_4 qiymatlarni taqqoslaymiz. Demak, -4 funksiyaning eng kichik, 4 esa eng katta qiymatidir.

$$29.12. z = 2xy, \quad x^2 + y^2 \leq 1 \text{ doirada}$$

29.13. $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$. $x = 0$, $y = 0$, $x + y = -3$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan uchburchakda.

$$29.14. z = 1 - x^2 - y^2, \quad (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 1 \text{ doirada.}$$

Berilgan nuqtada funksiyalarning gradiyentlarini va ularning uzunliklarini toping.

$$29.15. z=x^2+y^2 \quad (3; 2) \text{ da}$$

$$29.16. z=2xy \quad (x_0; y_0) \text{ da}$$

$$29.17. z = \frac{4}{x^2+y^2}, \quad (-1; 2) \text{ da}$$

$$29.18. u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad (0; 3; 4) \text{ nuqtada}$$

Quyidagi funksiyalarning ekstremal nuqtalarini toping:

$$29.19. z=xy^2(1-x-y)$$

$$29.20. z = 4 - (x^2 + y^2)^{\frac{2}{3}}$$

$$29.21. z = \sqrt{(a-x)(a-y)(x+y-a)}$$

$$29.22. z=x^3+y^3-15xy$$

$$29.23. z = (x^2 + y^2)(e^{-(x^2+y^2)} - 1)$$

Funksiyalarning ko'rsatilgan sohalardagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping:

29.24. $z=x^2+2xy-4x+8y$, $x=0$, $y=0$, $x=1$, $y=2$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan to'rtburchakda

29.25. $z=\arctg(x^2-xy+y)$, $x=-2$, $x=2$, $y=-3$, $y=3$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan to'rtburchaklarda.

30. ANIQMAS INTEGRALNI INTEGRALLASH USULLARI

Integrallash amali differensiallashga teskari amal bo'lgani uchun asosiy integrallash formulalarini bevosita topish mumkin. Barcha formulalarda $u = u(x)$ x ning differensiallanuvchi funksiyasi deb belgilanadi. Ixtiyoriy formulani o'ng tomonidan hosila olib tekshirish mumkin.

Asosiy integrallash jadvali:

- | | |
|--|--|
| 1. $\int du = u + C$ | 2. $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$ |
| 3. $\int \frac{du}{u} = \ln u + C$ | 4. $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ |
| 5. $\int e^u du = e^u + C$ | 6. $\int \sin u du = -\cos u + C$ |
| 7. $\int \cos u du = \sin u + C$ | 8. $\int \frac{du}{\cos^2 u} = \operatorname{tg} u + C$ |
| 9. $\int \frac{du}{\sin^2 u} = -\operatorname{ctg} u + C$ | 10. $\int \operatorname{tg} u du = -\ln \cos u + C$ |
| 11. $\int \operatorname{ctg} u du = -\ln \sin u + C$ | 12. $\int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{u}{a} + C$ |
| 13. $\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2} \ln \left \frac{u-a}{u+a} \right + C$ | 14. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{arcsin} \frac{u}{a} + C$ |
| 15. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln u + \sqrt{u^2 + a^2} + C.$ | |

Aniqmas integral $I = \int f(x) dx$ ko'rinishida yoziladi. Asosiy masala $y=f(x)$ funksiya uchun boshlang'ich $F(x)$ funksiyani topishdan iborat.

Boshlang'ich funksiya $F(x)$ uch usulda topiladi:

I. Bevosita integrallash. Bu usulda boshlang'ich funksiya integrallar jadvalidagi formulalar orqali amalga oshiriladi.

Misol keltiramiz:

$$30.1. \int (\ln x)^4 \frac{dx}{x}; \quad \frac{dx}{x} \text{ ifodani diferensialning tarifiga ko'ra } d(\ln x) \text{ kabi}$$

yozish mumkin. Shuning uchun $\int (\ln x)^4 \frac{dx}{x} = \int (\ln x)^4 d(\ln x)$ tenglik o'rinli, bu ifoda $\ln x$ ga nisbatan darajaning integrali, demak,

$$\int (\ln x)^4 \frac{dx}{x} = \frac{\ln^5 x}{5} + C.$$

30.2.

$$\int \frac{2-x^4}{1+x^2} dx = \int \frac{1-x^4+1}{1+x^2} dx = \int (1-x^2) dx + \int \frac{dx}{1+x^2} = x - \frac{x^3}{3} + \arctg x + C$$

Bu yerda

$$\int dx = x + C, \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + C$$

formulalardan foydalandik.

II. Aniqmas integralni yangi o'zgaruvchi kiritish usuli bilan integrallash.

Bu usulga ko'ra integral ostida biror funksiyani yangi o'zgaruvchi kiritish bilan integral jadvaldagi formula ko'rinishiga keltiriladi.

30.3. A) $J = \int \left(2\sin\frac{x}{2} + 3\right)^2 \cos\frac{x}{2} dx$ aniqmas integralni yangi o'zgaruvchi kiritish usuli bilan integrallang.

Buning uchun integral ostida shunday yangi o'zgaruvchi kiritish kerakki, bu ifodani differensiallasak qolgan ifoda kelib chiqishi kerak.

$$J = \int (2\sin\frac{x}{2} + 3)^2 \cos\frac{x}{2} dx = \left. \begin{array}{l} 2\sin\frac{x}{2} + 3 = t \text{ differiansiallaymiz} \\ 2\cos\frac{x}{2} * \frac{1}{2} dx = dt \\ \cos\frac{x}{2} dx = dt \end{array} \right| =$$

$$= \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C = \frac{(2\sin\frac{x}{2} + 3)^3}{3} + C$$

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ formuladan foydalandik.

$$B) \int \frac{\sin 4x dx}{\cos^4 2x + 4} = \left. \begin{array}{l} \cos^2 2x = t \\ -2\cos 2x * \sin 2x * 2dx = dt \\ -2\sin 4x dx = dt \\ \sin 4x dx = -\frac{dt}{2} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + 2^2} = -\frac{1}{2} \arctg \frac{t}{2} + C = -\frac{1}{2} \arctg \frac{\cos^2 2x}{2} + C;$$

Bu yerda $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + C$ formuladan foydalandik.

C) $I = \int \sqrt{4-x^2} dx$ aniqmas integralni integrallang.

Bu integral trigonometrik almashtirish yordamida integrallanadi:

$$J = \int \sqrt{4-x^2} dx = \left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \end{array} \right| = \int \sqrt{4-4\sin^2 t} * 2 \cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt = 2t + \sin 2t + C$$

$x=2\sin t$ dan $\sin t = \frac{x}{2}$, $t = \arcsin \frac{x}{2}$ ni oxirgi tenglikka qo'yamiz

$$I = 2\arcsin \frac{x}{2} + \sin 2\arcsin \frac{x}{2} + C;$$

III. Aniqmas integralni bo'laklab integrallash.

Aniqmas integralni bo'laklab integrallash formulasi $\int u dv = uv - \int v du$.

Bu formulaga ko'ra $\int f(x) dx$ integral ostidagi ifoda ikki bo'lakka bo'linadi.

Shunday ikki bo'lakka bo'linadiki $\int u dv$ ni hisoblash berilgan integralni hisoblashga qaraganda qulayroq bo'lsin.

$$30.4. \int x^2 \arctg x dx = \left| \begin{array}{l} u = \arctg x, du = \frac{dx}{1+x^2} \\ x^2 dx = dv, v = \frac{x^3}{3} \end{array} \right| = \frac{x^3}{3} \arctg x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= \frac{x^3}{3} \arctg x - \frac{1}{3} \int \left(x - \frac{x}{x^2+1} \right) dx = \frac{x^3}{3} \arctg x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(x^2+1) + C.$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi integrallarni toping:

30.5. $\int x\sqrt{x} dx;$

30.6. $\int \frac{dx}{\sqrt[5]{x}};$

30.7. $\int \frac{2-\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

30.8. $\int \left(x^2 + 2x + \frac{1}{x} \right) dx ;$

30.9. $\int \frac{x-2}{x^2} dx;$

30.10. $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx ;$

30.11. $\int \frac{(\sqrt{x}-1)^3}{x} dx;$

30.12. $\int \frac{x-1}{\sqrt[3]{x^2}} dx;$

30.13. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx;$

30.14. $\int \operatorname{ctg}^2 x dx;$

30.15. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x};$

O'zgaruvchini almashtirish usulidan foydalanib integrallarni toping:

$$\begin{aligned}
30.16. \int x \cos(x^2) dx; & \quad 30.17. \int \frac{e^{\sqrt{2x-1}}}{\sqrt{2x-1}} dx; \\
30.18. \int x^3(1-2x^4)^3 dx; & \quad 30.19. \int x\sqrt{a-x} dx, \quad a-x=t^2; \\
30.20. \int \frac{dx}{x \ln x}; & \quad 30.21. \int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+2\sin^2 x}}; \\
30.22. \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{2+\cos^2 x}} dx; &
\end{aligned}$$

Boʻlaklab integrallash usulidan foydalanib integrallarni toping:

$$\begin{aligned}
30.23. \int (x+1)e^x dx; & \quad 30.24. \int e^{2x} \cos x dx; \\
30.25. \int \frac{\ln x}{x^2} dx; & \quad 30.26. \int x^2 e^{3x} dx; \\
30.27. \int x \cos x dx; & \quad 30.28. \int \ln^2 x dx; \\
30.29. \int \frac{x \cos x dx}{\sin^3 x}; & \quad 30.30. \int \frac{\arcsin \frac{x}{2}}{\sqrt{2^2-x^2}} dx;
\end{aligned}$$

Quyidagi integrallarni toping:

$$\begin{aligned}
30.31. \int \frac{dx}{x^3}; & \quad 30.32. \int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}}; \\
30.33. \int \frac{dx}{2x^2-6}; & \quad 30.34. \int (1+e^x)^2 dx; \\
30.35. \int \frac{2x+3}{x^2-5} dx; & \quad 30.36. \int \operatorname{tg}^2 \varphi d\varphi; \\
30.37. \int \frac{2x dx}{x^4+3}; & \quad 30.38. \int \frac{\sin x dx}{\sqrt{1+2\cos x}}; \\
30.39. \int \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}; \quad (e^x+1=t^2); & \quad 30.40. \int \frac{e^x dx}{3+4e^x}; \\
30.41. \int e^{\sin x} \cos x dx; & \quad 30.42. \int \frac{\sin 4x}{\cos^4 2x+4} dx; \\
30.43. \int \frac{2e^x dx}{\sqrt{16-e^{2x}}}; & \quad 30.44. \int \frac{\sqrt{2-x^2}+\sqrt{2+x^2}}{\sqrt{4-x^4}} dx; \\
30.45. \int x \sin x dx; & \quad 30.46. \int x^3 e^x dx; \\
30.47. \int \sqrt{a^2-x^2} dx, \quad a>0, \quad u=\sqrt{a^2-x^2}; & \\
30.48. \int \sin \sqrt{x} dx; \quad \sqrt{x}=t; & \quad 30.49. \int (x^2+2x+3) \cos x dx; \\
30.50. \int \frac{3-2\operatorname{ctg}^2 x}{\cos^2 x} dx. &
\end{aligned}$$

31. ANIQ INTEGRAL

Aniq integral $I = \int_a^b f(x)dx$ ko'rinishida yoziladi va Nyuton-Leybnits formulasiga ko'ra hisoblanadi:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

$F(x)$ funksiya $y=f(x)$ uchun boshlang'ich funksiya, a -integralning quyi, b -yuqori chegaralari.

Aniq integralni ham xuddi aniqmas integralga o'xshab integrallab, so'ngra Nyuton-Leybnits formulasiga ko'ra hisoblanadi.

Aniq integralni yordamida egri chiziqlar bilan chegaralangan yuzalarni, aylanma jismlar hajmini, egri chiziq yuyining uzunligini va h.k.larni hisoblash mumkin.

Quyidagi aniq integralni hisoblang:

$$31.1. \quad \int_0^1 \sqrt{1+t} dt = \int_0^1 (1+t)^{\frac{1}{2}} d(t+1) = \frac{2}{3} (1+t)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (\sqrt{8} - 1)$$

$$31.2. \quad \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx = \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 x) \sin x dx = \left| -\sin x \cos x = -\frac{1}{2} \sin 2x \right|_0^{\pi/2} = -\frac{1}{2} \sin \pi = 0$$

$$31.3. \quad \int_0^1 x e^{-x} dx = \left[\begin{matrix} u = x, & du = dx \\ dv = e^{-x} dx, & v = -e^{-x} \end{matrix} \right] = -x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = (-x e^{-x} - e^{-x}) \Big|_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$$

$$31.4. \quad \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx = \left[\begin{matrix} x = \sin t \\ dx = \cos t dt \\ t = \arcsin x \\ x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4} \\ x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{matrix} \right] = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin^2 t} \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin^2 t}{\sin^2 t} dt =$$

$$= (-ctgt - t) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} + 1 + \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

31.5. $x^2 + y^2 = 8$ aylana $y = x^2/2$ bilan ikki qismga bo'lingan. Ikkala qismini yuzasini toping.

Yechish: Grafiklar kesishish nuqtalarini topamiz:

$$\frac{1}{2}x^2 = \sqrt{8-x^2}$$

$$\frac{x^4}{4} = 8 - x^2$$

$$\frac{x^4}{4} = 8 - x^2$$


$$-32 + 4x^2 + x^4 = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -2,$$

$$S_d = \pi r^2 = 8\pi \quad r = 2\sqrt{2}$$

$$S_1 = \int_{-2}^2 (\sqrt{8-x^2}) dx = \left(4 \arcsin \frac{x}{\sqrt{8}} + \frac{1}{2} x \sqrt{8-x^2} - \frac{x^3}{6} \right) \Big|_{-2}^2 = 2\pi + \frac{4}{3} \text{ (kv.birl.)}$$

$$S_2 = S_d - S_1 = 8\pi - \left(2\pi + \frac{4}{3} \right) = 6\pi - \frac{4}{3} \text{ (kv.birl.)}$$



31.6. $y = 2 - x^2$ va $y^3 = x^2$ egri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping:


Yechish: Egri chiziqlar kesishish nuqtalarini topamiz:

$$2 - x^2 = \sqrt[3]{x^2}$$

$$8 - 12x^2 + 6x^4 - x^6 = x^2$$

$$x^6 - 6x^4 + 13x^2 - 8 = 0$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 1,$$



$$S = \int_{-1}^1 \left(2 - x^2 - \sqrt[3]{x^2} \right) dx = \left(2x - \frac{x^3}{3} - \frac{3}{5} \sqrt[3]{x^5} \right) \Big|_{-1}^1 = \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5} \right) - \left(-2 + \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \right) = \frac{32}{15} \text{ (kv.birl.)}$$

31.7. $y=x^2$ va $x=y^2$ parabolalar bilan chegaralangan figurani Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini hisoblang:

Yechish: $\begin{cases} y=x^2 \\ x=y^2 \end{cases}$ sistemasidan kesishish nuqtalarini topamiz:

$$x_1 = 0, x_2 = 1, y_1 = 0, y_2 = 1$$

$$V = V_1 + V_2 = \pi \int_0^1 x dx - \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{3}{10} \pi \text{ (kub.birlik)}$$

31.8. $y^2 = \frac{2}{3}(x-1)^3$ yarim kubik parabolaning $y^2 = \frac{x}{3}$ parabola ichki qismi bilan chegaralangan yoy uzunligini hisoblang:

Yechish: Egri chiziqlarning kesishish nuqtasini aniqlaymiz: $\frac{2}{3}(x-1)^3 = \frac{x}{3}$

$$x = 2, \text{ da } y = \sqrt{\frac{2}{3}}, \text{ chunki } y = \sqrt{\frac{2}{3}(x-1)(x-1)}, \text{ u holda } y' = \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{x-1},$$

$$L = 2 \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{3}{2}(x-1)} dx = 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \int_1^2 \sqrt{3x-1} dx = \frac{2\sqrt{2}}{9} (5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})$$

Mustaqil yechish uchun misollar:

Quyidagi aniq integralni hisoblang:

$$31.9. \int_1^5 \sqrt{x-1} dx$$

$$31.10. \int_1^2 \frac{dx}{x^2 - 4x + 5}$$

$$31.11. \int_{-1}^4 \frac{x}{\sqrt{x+5}} dx$$

$$31.12. \int_1^e \frac{\sqrt[3]{1+\ln x}}{x} dx$$

$$31.13. \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$31.14. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$31.15. \int_0^{\pi/4} \sin 4x dx$$

$$31.16. \int_1^e x^2 \ln x dx$$

$$31.17. \int_0^{\pi} e^x \sin x dx$$

$$31.18. \int_0^1 \arcsin x dx$$

$$31.19. \int_0^1 \ln(x+1) dx$$

$$31.20. \int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x dx$$

$$31.21. \int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1}$$

$$31.22. \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{2x+1}}$$

$$31.23. \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$31.24. \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$$

$$31.25. \int_1^3 \frac{dx}{x+x^2}$$

$$31.26. \int_1^2 \frac{dx}{2x-1}$$

$$31.27. \int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}$$

$$31.28. \int_1^e x \arcsin x dx$$

$$31.29. \int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx$$

Berilgan chiziqlar bilan chegaralangan figuralar yuzalarini hisoblang:

$$31.30. y = 4 - x^2 \text{ va } Ox \text{ o'q bilan}$$

$$31.31. y = (x-1)^2 \text{ va } x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$$

31.32. $y = x^2 + 1$ va $y = 3 - x$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping.

Egri chiziqlar yoylari uzunliklari hisoblansin:

$$31.33. y = 1 - \ln \cos x, x = 0 \text{ dan } x = \frac{\pi}{6} \text{ gacha}$$

$$31.34. x = 8 \sin t + 6 \cos t, y = 6 \sin t - 8 \cos t, t = 0 \text{ dan } t = \frac{\pi}{2} \text{ gacha}$$

$$31.35. x = \frac{1}{3} t^3 - t, y = t^2 + 2, t = 0 \text{ dan } t = 3 \text{ gacha}$$

31.36. $x^2 - y^2 = 4, y = \pm 2$ chiziqlar bilan chegaralangan figurani Oy o'qi atroqida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini toping.

31.37. $y = \frac{1}{1+x^2}, x = \pm 1, y = 0$ chiziqlar bilan chegaralangan figurani Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini toping.

31.38. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

Integrallarni hisoblang:

$$31.39. \int_2^3 \frac{dx}{x^2}$$

$$40. \int_0^{\sqrt{3}} \frac{xdx}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$31.41. \int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{\cos^2 2x}$$

$$31.42. \int_1^4 \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^2}$$

$$31.43. \int_0^1 \frac{e^x dx}{1+e^{2x}}$$

$$31.44. \int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2} dx$$

$$31.45. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$$

$$31.46. \int_0^{\frac{\pi}{4}} tg^3 x dx$$

31.47. $y = x^2 + 1$ parabolani $y=0, x=-1, x=4$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping.

31.48. $y = (x-1)^2$ va $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini toping.

31.49. $y^4 = 4x^3$ egri chiziqning $O(0,0)$ dan $V(\sqrt{3}; 2\sqrt{3})$ gacha bo'lgan yoyning uzunligini toping.

31.50. $y = \ln(\sin x)$ egri chiziqning $x = \frac{\pi}{3}$ dan $x = \frac{\pi}{2}$ gacha bo'lgan yoyning uzunligini toping.

31.51. $xy = 4, x = 1, x = 4, y = 1$, chiziqlar bilan chegaralangan figurani Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

31.52. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ellipsining hajmini hisoblang.

32. HOSMAS INTEGRALLAR. ANIQ INTEGRALNI TAQRIBIY HISOBLASH FORMULALARI

I. Xosmas integrallar ikki hil turda bo‘ladi:

1-tur xosmas integrallar chegaralari cheksiz bo‘lgan integrallardir.

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx \quad (1)$$

Bu tenglikda o‘ng tomonda turgan limit mavjud bo‘lsa, u holda xosmas integral

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ yaqinlashuvchi integrallar deyiladi.

Agar ko‘rsatilgan limit cheksizga teng bo‘lsa yoki mavjud bo‘lmasa xosmas integral uzoqlashuvchi deyiladi.

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \text{ xosmas integrallar ham shunday aniqlanadi.}$$

2-tur xosmas integrallar.

Agar $y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmaning $x=a$ nuqtasida, $x=b$ nuqtasida yoki $[a; b]$ ga tegishli biror $x=c$ nuqta atrofida aniqlanmagan bo‘lsa, bunday funksiya olingan integrallar 2-tur xosmas integrali deyiladi.

$y = f(x)$ funksiya $[a; b]$ oraliqda aniqlangan va uzliksiz bo‘lib, $x=b$ nuqta atrofida chegaralanmagan funksiya bo‘lsa, u holda $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$ limitga $f(x)$

funksiyaning 2-tur xosmas integrali deyiladi va $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$ tenglik bilan

aniqlanadi. Agar o‘ng tomonda turgan limit mavjud bo‘lsa, xosmas integral yaqinlashuvchi deyiladi. Agar limit mavjud bo‘lmasa, xosmas integral uzoqlashuvchi deyiladi.

Boshqa 2-tur integrallar ham xuddi shunday aniqlanadi.

II. Aniq integrallarni taqribiy hisoblash. $I = \int_a^b f(x)dx$ aniq integralda $y = f(x)$

funksiya uchun boshlang'ich funktsiyani har doim ham topib bo'lmaydi, bunday holda aniq integralni taqribiy hisoblash formulalaridan foydalaniladi.

1. To'g'ri to'rtburchaklar formulasi:

$$h = \int_a^b f(x)dx \approx h(y_0 + y_1 + \dots + y_{n-1}) = h \sum_{i=0}^{n-1} y_i$$

2. Trapetsiya formulasi:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\left(\frac{y_0 + y_1}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1}\right)$$

3. Simpson formulasi:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n) \quad (n=\text{juft son})$$

Misollar ko'ramiz:

Xosmas integrallarni aniqlang:

32.1. $I = \int_0^{+\infty} \cos x dx$ xosmas integrallarni taqribiy hisoblang va yaqinlashishini tekshiring:

$$I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \cos x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \sin x \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\sin b - \sin 0) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \sin b \quad \text{demak xosmas integral}$$

uzoqlashuvi.

32.2. $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ xosmas integralni hisoblang va yaqinlashishni tekshiring:

$$I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg x \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\arctg b - \arctg 0) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctg b = \frac{\pi}{2} \quad \text{xosmas integral}$$

yaqinlashuvchi.

32.3. $\int_0^1 \frac{dx}{x}$; $f(x) = \frac{1}{x}$ funksiya $x=0$ nuqtada chegaralanmagan.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{a \rightarrow +0} \int_a^1 \frac{dx}{x} = \lim_{a \rightarrow +0} \ln x \Big|_a^1 = \lim_{a \rightarrow +0} (\ln 1 - \ln a) = \lim_{a \rightarrow +0} \ln a. \quad \text{Bu limit mavjud emas.}$$

Berilgan xosmas integral uzoqlashuvchi.

32.4. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ xosmas integralni hisoblang va yaqinlashishini tekshiring:

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ funksiya $x=1$ nuqtada uzulishga ega

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \arcsin \Big|_0^{1-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\arcsin(1-\varepsilon) - \arcsin(0)) = \frac{\pi}{2}$$

32.5. $I = \int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 4x + 3}$ xosmas integralni hisolans.

$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3}$ $x=1$ nuqtada uzilishga ega, shuning uchun

$$I = \int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} + \int_1^2 \frac{dx}{x^2 - 4x + 3};$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{(x-2)^2 - 1} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \ln \frac{x-3}{x-1} \Big|_0^{1-\varepsilon} = \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\ln \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon} - \ln 3) = \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \ln \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon} = \infty$$

Integral uzoqlashuvchi, demak berilgan xosmas integral ham uzoqlashuvchi.

32.6. $I = \int_0^6 (x^2 + 3)dx$ integralni taqribiy (trapetsiyalar formulasi yordamida)

hisoblang ($n=6$). $[0;6]$ oraliqni 6 teng qismga bo'lamiz:

x_i	0	1	2	3	4	5	6
y_i	3	4	7	12	19	28	39

$h = \frac{b-a}{n} = \frac{6-0}{6} = 1$ trapetsiyalar formulasi asosida:

$$I = h \left(\frac{y_0 + y_6}{2} + \sum_{i=1}^5 y_i \right) = \frac{3 + 39}{2} + (4 + 7 + 12 + 19 + 28) = 21 + 70 = 91$$

32.7. Simpson formulasi yordamida $I = \int_0^{10} x^3 dx$ integralni taqribiy hisoblang va aniq

qiymati bilan taqqoslang:

$$\text{N'yuton-Leybnits formulasiga asosan } I = \int_0^{10} x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^{10} = \frac{10^4}{4} = 2500$$

Simpson formulasini qo'llash uchun $[0;10]$ oraliqni 10 teng qismga bo'lamiz:

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i	0	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000

$2k=10$, demak $k=5$

$$I = \int_0^{10} x^3 dx = \frac{10-0}{10 \cdot 3} [0 + 4(1 + 27 + 125 + 343 + 729) + 2(8 + 64 + 216 + 512) + 1000] = 2500$$

Quyidagi xosmas integralni hisoblang va ularni yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchiligini aniqlang:

$$32.8. \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$32.9. \int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx$$

$$32.10. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$32.11. \int_0^{\infty} x^2 e^{\frac{x}{2}} dx$$

$$32.12. \int_2^6 \frac{dx}{\sqrt[3]{(4-x)^2}}$$

$$32.13. \int_1^{\infty} \frac{\arctg x dx}{x^2}$$

$$32.14. \int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$$

$$32.15. \int_1^{\infty} \frac{\sin x dx}{x^2}$$

$$32.16. \int_1^{\infty} x^2 e^{-x^3} dx$$

$$32.17. \int_1^e \frac{dx}{x \ln x}$$

$$32.18. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2}$$

$$32.19. \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2-3}}$$

$$32.20. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$$

$$32.21. \text{Trapetsiyalar formulasi yordamida hisoblang: } \ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$$

$$32.22. \text{Simpson formulasi yordamida hisoblang: } \int_1^2 \sqrt{1+x^3} dx \quad (2n=4)$$

$$32.23. \text{Simpson formulasi yordamida hisoblang: } \int_0^4 \frac{dx}{1+x^4} \quad (2n=4)$$

$$32.24. \text{Simpson formulasi yordamida } \pi = 6 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} \text{ ni taqribiy hisoblang.}$$

Quyidagi xosmas integrallarni hisoblang va yaqinlashishini tekshiring:

$$32.25. \int_0^{+\infty} \frac{\arctg x}{1+x^2} dx$$

$$32.26. \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{4+x^2}$$

$$32.27. \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$$

$$32.28. \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$$

$$32.29. \int_1^{+\infty} (1 - \cos \frac{x}{2}) dx$$

$$32.30. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$$

$$32.31. \int_0^1 \frac{\cos^2 x}{\sqrt[3]{1-x^2}} dx$$

$$32.32. \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^3}$$

$$32.33. \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Simpson formulasi yordamida taqribiy hisoblang:

$$32.34. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3 - \cos 2x} dx \quad (2n = 6)$$

$$32.35. \int_1^3 \sqrt{1+x^2} dx \quad (2n = 6)$$

$$32.36. \int_{-1}^3 \ln(x+2) dx \quad (2n = 10)$$

Trapetsiyalar formulasi yordamida taqribiy hisoblang:

$$32.37. \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \quad (n = 4)$$

$$32.38. \int_1^4 \frac{x dx}{\sqrt{1+2x}} \quad (n = 6)$$

33. O'ZGARUVCHISI AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR

Differensial tenglama deb, erkli o'zgaruvchi x noma'lum funksiya $y(x)$ va uning turli tartibli hosilalari yoki differensiallarini bog'lovchi tenglamaga aytiladi va $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ ko'rinishda yoziladi.

Agar noma'lum funksiya birgina erkli o'zgaruvchiga bog'liq bo'lsa, bunday differensial tenglama oddiy differensial tenglama deyiladi. Birinchi tartibli differensial tenglama $F(x, y, y') = 0$ yoki hosilaga nisbatan yechilgan bo'lsa $y' = f(x, y)$ ko'rinishda yoziladi.

Birinchi tartibli differensial tenglamalarning umumiy yechimi deb, bitta ixtiyoriy o'zgarmas C miqdorga bog'liq bo'lgan hamda quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi $y = \varphi(x, C)$ funksiyaga aytiladi.

a) bu funksiya differensial tenglamani C o'zgarmas miqdorning har qanday aniq qiymatida ham qanoatlantiradi.

b) $x = x_0$ bo'lganda $y = y_0$ boshlang'ich shart har qanday bo'lganda ham C miqdorning shunday $C = C_0$ qiymatini topish mumkinki,

$y = \varphi(x, C_0)$ funksiya berilgan boshlang'ich shartni qanoatlantiradi.

$y = \varphi(x, C_0)$ berilgan tenglamaning xususiy yechimi bo'ladi.

Biz o'zgaruvchilari ajratilgan va o'zgaruvchilari ajraladigan hamda bir jinsli va chiziqli differensial tenglamalarni qaraymiz.

$M(x)dx + N(y)dy = 0$ ko'rinishdagi tenglama o'zgaruvchilari ajralgan tenglama deyiladi. Bu tenglama yechimini topish uchun har bir o'zgaruvchi bo'yicha integrallanadi.

I. $M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0$ ko'rinishdagi tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama deyiladi. Bu tenglamada oldin o'zgaruvchilar ajratiladi, so'ngra integrallanadi.

Mislollar keltiramiz:

33.1. $y' = y \operatorname{ctg} x$, $(0 < x < \pi, -\infty < y < \infty)$ differensial tenglamaning $x_0 = \frac{\pi}{6}$,

$y_0 = 2$ shartni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin:

Yechimi: $-\frac{dy}{dx} = y \operatorname{ctg} x, \quad \frac{dy}{y} = \operatorname{ctg} x \, dx, \quad \ln y = \ln \sin x + \ln C;$

$y = C \sin x$ umumiy yechim.

$x_0 = \frac{\pi}{6}, y_0 = 2$ shartlarni qo'yamiz, $2 = C \sin \frac{\pi}{6}; C = 4;$

$y = 4 \sin x$ xususiy yechim.

33.2 $x \, dx + y \, dy = 0$ o'zgartiruvchilari ajralgan tenglamani har bir o'zgaruvchi bo'yicha integrallaymiz

$$\int x \, dx + \int y \, dy = C, \quad \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = C, \quad x^2 + y^2 = C_1^2$$

tenglamani umumiy yechimi bo'lib, markazi koordinata boshida yotgan, radiusi C_1 ga teng bo'lgan aylanalar oilasining tenglamasidir.

33.3. $(1+x)y \, dx + (1-y)x \, dy = 0$ bu o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamadir.

O'zgaruvchilarni ajratish uchun tenglamani har bir hadini $xy \neq 0$ ga bo'lamiz

$$\frac{1+x}{x} \, dx + \frac{1-y}{y} \, dy = 0, \text{ integrallaymiz } \ln|x| + x + \ln|y| - y = \ln C,$$

$$\ln\left|\frac{xy}{C}\right| = y - x; \quad \frac{xy}{C} = e^{y-x}, \quad xy = Ce^{y-x} \text{ bu tenglamani umumiy}$$

yechimi.

II $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ ko'rinishdagi tenglamaga bir jinsli differensial tenglama deyiladi.

$\frac{y}{x} = u$ almashtirish bilan integrallanadi. $\frac{y}{x}$ - no'l o'lchovli bir jinsli funksiya.

33.4. $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2y}{x^3 - y^3}$ tenglama bir jinsli differensial tenglama. Bu

tenglamani $y = ux$ almashtirish bajarib integrallaymiz, $y = ux$ dan $\frac{dy}{dx} = u + \frac{du}{dx}x;$

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{x^2 \cdot ux}{x^3 - u^3 x^3}; \quad x \frac{du}{dx} = \frac{u}{1 - u^3} - u; \quad x \frac{du}{dx} = \frac{u^4}{1 - u^3};$$

o'zgaruvchilarni ajratamiz

$$\frac{dx}{x} = \frac{1-u^3}{u^4} du \text{ integrallaymiz } \ln x + \ln C = \frac{1}{3} \frac{1}{u^3} - \ln u ;$$

$$\ln Cxu = \frac{-1}{3u^3} ; \quad \ln Cx \frac{y}{x} = -\frac{x^3}{3y^3} ; \quad \ln Cy = -\frac{x^3}{3y^3} ;$$

tenglamaning umumiy yechimi.

III. Chiziqli differensial tenglamalar

I – tartibli chiziqli differensial tenglama deb

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad (1)$$

ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi. I-tartibli chiziqli tenglama ikki usulda integrallanadi.

1-usul. (1) tenglama yechimi ikki funksiya ko'paytmasi shaklida qidiriladi

$$y = u(x) v(x) \quad (2)$$

u, v lardan birini topish ixtiyoriy.

2-usul o'zgarmasni variatsiyalash usuli (1) tenglamaning umumiy yechimini topishda $Q(x)=0$ deb olib, o'zgarmas sonni, x ning funksiyasi deb qaraladi va $y' + P(x)y = 0$ bir jinsli chiziqli tenglamani yechamiz.

Mislollar keltiramiz:

33.5. $\frac{dy}{dx} - 2xy = x - x^3$ chiziqli tenglamaning umumiy yechimini toping:

$$P(x) = -2x; \quad Q(x) = x - x^3.$$

Tenglamaning umumiy yechimini

$$y = u * v \quad (2)$$

ko'rinishda qidiramiz (2) tenglikni differensiallaymiz:

$$\frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad (3);$$

(2), (3) ni berilgan tenglamaga qo'yamiz

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - 2x * u * v = x - x^3; \quad u \left(\frac{dv}{dx} - 2xv \right) + v \frac{du}{dx} = x - x^3 \quad (4)$$

u, v lardan birini topish ixtiyoriy bo'lgani uchun v ni $\frac{dv}{dx} - 2xv = 0$ tenglikdan topamiz.

$$\frac{dv}{v} = 2x dx, \ln |v| = x^2 + \ln C, v = Ce^{x^2} \text{ xususiy holda } C=1 \text{ deb olsak } v = e^{x^2}$$

Bularni (4) ga qo'yib, o'zgaruvchilarni ajratib integrallaymiz:

$$du = (x - x^3) e^{-x^2} dx$$

$$u = \int (x - x^3) e^{-x^2} dx = \int x e^{-x^2} dx - \int x^3 e^{-x^2} dx$$

Bu integrallarni bo'laklab integrallaymiz:

$$u = -e^{-x^2} \left(1 - \frac{1}{2} x^2 \right) + C$$

$$y = u * v = -e^{-x^2} * e^{x^2} \left(1 - \frac{x^2}{2} \right) + C = \frac{x^2}{2} - 1 + C;$$

$$33.6. y' + 2xy = x e^{-x^2},$$

$$Q(x) = x e^{-x^2} = 0 \text{ deb olib,}$$

$$y' + 2xy = 0 \text{ tenglamani hosil qilamiz}$$

$$\frac{dy}{dx} = -2xy; \quad \frac{dy}{y} = -2x dx; \quad \ln |y| = -x^2 + \ln C, y = C e^{-x^2}$$

Tenglamaning umumiy echimidagi C ni x ning funksiyasi deb qarab, y ni x bo'yicha integrallaymiz

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dC}{dx} e^{-x^2} - 2Cxe^{-x^2} \text{ ni berilgan tenglamaga qo'yamiz.}$$

$$\frac{dC}{dx} e^{-x^2} - 2Cxe^{-x^2} + 2Cxe^{-x^2} = xe^{-x^2}$$

$$\frac{dC}{dx} e^{-x^2} = xe^{-x^2}; \quad dC = x dx, \quad C = \frac{x^2}{2} + C_1,$$

$$y = C e^{-x^2} = \left(\frac{x^2}{2} + C_1 \right) e^{-x^2} \text{ tenglamaning umumiy yechimi hosil bo'ladi}$$

Mustaqil yechish uchun mashqlar:

Quyidagi differensial tenglamalarni integrallang va boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimni toping:

$$33.7. \quad xy \, dx + (x+1)dy = 0;$$

$$33.8. \quad \sqrt{y^2+1} \, dx = xy \, dy;$$

$$33.9. \quad (x^2-1)y' + 2xy^2 = 0 \quad y(0)=1$$

$$33.10. \quad y' \operatorname{ctgx} + y = 2 \quad y(0)=-1$$

$$33.11. \quad y' = 3\sqrt[3]{y^2}, \quad x=2 \text{ ga } y=0$$

$$33.12. \quad 2x^2y \, y' + y^2 = 2$$

Quyidagi bir jinsli tenglamalarni yeching:

$$33.13. \quad \frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - y^2}$$

$$33.14. \quad x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$33.15. \quad x \, dy = (x+y)dx$$

$$33.16. \quad (x+2y)dx - x \, dy = 0$$

$$33.17. \quad (x-y)dx + (x+y)dy = 0$$

Tenglamalarni integrallang:

$$33.18. \quad y' - y = 2x - 3$$

$$33.19. \quad z' = 10^{x+z}$$

$$33.20. \quad e^{-s} \left(1 + \frac{ds}{dt} \right) = 1$$

$$33.21. \quad x \frac{dx}{dt} + t = 1$$

$$33.22. \quad (y^2 - 2xy)dx + x^2 dy = 0$$

$$33.23. \quad 2x^3 y' = y(2x^2 - y^2);$$

$$33.24. \quad y^2 + x^2 y' = 2x y' y$$

$$33.25. \quad (x^2 + y^2) y' = 2xy$$

$$33.26. \quad x y' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}$$

Quyidagi chiziqli differensial tenglamalarni har ikki usulda yeching

$$33.27. \quad x y' - 2y = 2x^4$$

$$33.28. \quad y' + y \operatorname{tg} x = \sec x$$

$$33.29. \quad x^2 y' + xy + 1 = 0$$

$$33.30. \quad y' = 2x(x^2 + y)$$

$$33.31. \quad x y' + (x+1)y = 3x^2 e^{-x}$$

$$33.32. \quad (2x+1) y' = 4x+2y$$

$$33.33. \quad x(y' - y) = e^x$$

$$33.34. \quad y + x(y' - x \operatorname{Cos} x)$$

$$33.35. \quad (x y' - 1) \ln x = 2y$$

34. CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR

I. Bernulli tenglamasi

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad (1)$$

ko'rinishdagi tenglama Bernulli tenglamasi deyiladi, $P(x)$, $Q(x)$ - x ning uzluksiz funksiyalari. Bu tenglamaning $n \neq 0$, $n \neq 1$ bo'lganda tenglamaning har ikki tomonini y^n ga bo'lib osongina I-tartibli chiziqli tenglama ko'rinishiga keltiriladi.

Misol:

1. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -xy^2$ Bernulli tenglamasini integrallang:

Tenglamaning har ikki tomonini y^2 ga bo'lamiz.

$$\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{yx} = -x; \quad \frac{1}{y} = z \quad \text{belgilash} \quad \text{kiritamiz} \quad \frac{1}{y} = z \text{ ni } x \text{ bo'yicha}$$

differensiallaymiz $-\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$, $\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = -x$ chiziqli tenglama hosil

bo'ladi, $z = u \cdot v$; $\frac{dz}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ $u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - \frac{uv}{x} = -x$,

$$u \left(\frac{dv}{dx} - \frac{v}{x} \right) + v \frac{du}{dx} = -x \quad \frac{dv}{dx} - \frac{v}{x} = 0, \quad \frac{dv}{v} = \frac{dx}{x}, \quad v = x \quad x \frac{du}{dx} = -x,$$

$$u = x + C; \quad z = x(x + C) \quad \frac{1}{y} = x(x + C), \quad y = \frac{1}{x(x + C)} \quad \text{umumiy yechim.}$$

II. To'la differensialli tenglama.

$$\text{Agar } M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \quad (2)$$

tenglamaning chap qismi biror $F(x,y)$ funksiyaning to'la differensialli bo'lsa berilgan tenglama to'la differensialli tenglama deyiladi, bunda

$$dF = M(x,y)dx + N(x,y)dy \quad (3)$$

(2) tenglama to'la differensialli bo'lishi uchun $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ shart bajarilishi kerak.

Misol:

$$2. (2x + 3x^2y)dx + (x^3 - 3y^2)dy = 0 \quad (4)$$

differensial tenglama to'la differensialli tenglama ekanini aniqlang va tenglamani yeching. $M = 2x + 3x^2y$, $N = x^3 - 3y^2$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2 \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \text{ tenglik o'rinli, demak berilgan}$$

tenglama to'la differensial tenglama. To'la differensial

$$dF = F'_x dx + F'_y dy \text{ bo'ladigan } F(x, y) \text{ funksiyaning topamiz. } F'_x = 2x + 3x^2 y,$$

$$F'_y = x^3 - 3y^2 \quad (5) \text{ tenglamaning birinchisini o'zgaruvchi } y \text{ ni o'zgarmas}$$

deb olib, x bo'yicha integrallaymiz:

$$F = \int (2x + 3x^2 y) dx = x^2 + x^3 y + \varphi(y)$$

Bu ifodani (5) ning ikkinchi tenglamasiga qo'yib

$$[x^2 + x^3 y + \varphi(y)]' = x^3 - 3y^2, \text{ bu tenglikdan } x^3 + \varphi'(y) = x^3 - 3y^2, \quad \varphi'(y) = -3y^2$$

hosil bo'ladi.

$$\text{Integrallasak} \quad \varphi(y) = -\frac{3y^3}{3} + C = -y^3 + C. \quad \text{Demak} \quad F(x, y) = x^2 + x^3 y - y^3 + C$$

tenglamaning umumiy yechimi hosil bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun mashqlar:

Berilgan Bernulli tenglamalarini integrallang:

$$34.1. \frac{dy}{dx} - \frac{4y}{x} = x\sqrt{y}$$

$$34.2. \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} = 2y^3 x$$

$$34.3. 2x^2 y y' + 3x^2 y^2 + 7 = 0$$

$$34.4. 3xy^2 y' - 2y^3 = x^2$$

Quyidagi differensial tenglamalarni to'la differensialli tenglama ekanini aniqlang va tenglamalarni yeching:

$$34.5. 2xy dx + (x^2 - y^2) dy = 0$$

$$34.6. (2 - 9xy^2) dx + (4y^2 - 6x^3) dy = 0$$

$$34.7. e^y dx - (2y + xe^y) dy = 0$$

$$34.8. \frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x) dy = 0$$

$$34.9. \frac{3x^2 + y^2}{y^2} dx - \frac{2x^3 + 5y}{y^3} dy = 0$$

Berilgan differensial tenglamalarni integrallang:

$$34.10. y' = \frac{y}{3x - y^2}$$

$$34.11. y' = y^2 e^{x^2} - 2xy$$

$$34.12. 2y' + y \operatorname{tg} x = y^2 \sin x$$

$$34.13. xy \, dy = (y^2 + x^2) dx$$

$$34.14. 2x(1 + \sqrt{x^2 - y}) dx - \sqrt{x^2 - y} \, dy = 0 \quad 34.15. (1 + y^2 \sin 2x) dx - 2y \cos^2 x \, dy = 0$$

$$34.16. 3x^2(1 + \ln y) dx = (2y - \frac{x^3}{y}) dy$$

$$34.17. (\frac{x}{\sin y} + 2) dx + \frac{|x^2 + 1| \cos y}{\cos 2y - 1} dy = 0$$

35. SONLI QATORLARGA DOIR MISOLLAR

1. $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ ko'rinishdagi yig'indiga sonli qator deyiladi va

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

kabi belgilanadi. Agar $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ sonli qatorning birinch n ta hadining yig'indisi S_n , $n \rightarrow \infty$ da chekli S limitga intilsa:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

qator yaqinlashuvchi deyiladi. S son yaqinlashuvchi qatorning yig'indisi deyiladi. Yaqinlashuvchi bo'lmagan qator uzoqlashuvchi qator deyiladi.

Berilgan qatorni yaqinlashuvchi bo'lishi uchun $n \rightarrow \infty$ da a_n ning nolga intilishi $a_n \rightarrow 0$ zarurdir (ammo yetarli emas).

Qator yaqinlashishining yetarli shartlari quyidagilar:

a) Musbat hadli qator deb barcha hadlari manfiy bo'lmagan qatorga aytiladi, yani $a_n \geq 0$. Musbat hadli qator yaqinlashishining Dalamber alomati: Agar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = d \begin{cases} d < 1, & \text{qator yaqinlashuvchi} \\ d > 1, & \text{qator uzoqlashuvchi} \\ d = 1, & \text{masala yechilmaydi} \end{cases}$$

b) Musbat hadli qatorni taqqoslash.

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n \dots = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

ikkita musbat hadli qator bo'lsin.

1) agar $a_n \leq b_n$ bo'lib, ikkinchi qator yaqinlashuvchi, u holda birinchi qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi;

2) agar birinchi qator uzoqlashuvchi bo'lsa, u holda ikkinchi qator ham uzoqlashuvchi bo'ladi.

c) Integral alomati (Koshining integral alomati). Agar $a_n = f(n)$ deb olinsa, bunda $f(n)$ kamayuvchi va

$$\int_1^{\infty} f(x)dx = \begin{cases} A \text{ bo'lsa, u holda qator yaqinlashuvchi} \\ \infty \text{ bo'lsa, u holda qator uzoqlashuvchi} \end{cases}$$

d) Agar ishoralari navbat bilan o'zgaruvchi

$$a_1 - a_2 + a_3 - \dots + (-1)^{n-1} a_n + \dots \quad \text{qatorda } u_1 > u_2 > u_3 > \dots \quad \text{va} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

bo'lsa, qator yaqinlashadi, bu Leybnits alomatidir.

e) Absolyut yaqinlashish:

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ (1) qator hadlarining absolyut qiymatlaridan tuzilgan $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n| + \dots$ (2) qator yaqinlashsa, (1) qator ham yaqinlashadi. Bu holda (1) qator absolyut yaqinlashuvchi qator deyiladi. (1) qator yaqinlashuvchi bo'lib, (2) qator uzoqlashuvchi bo'lsa, (1) qator shartli yaqinlashuvchi deyiladi.

$$35.1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{5n-3} = \frac{3}{2} + \frac{5}{7} + \frac{7}{12} + \dots + \frac{2n+1}{5n-3} + \dots \text{sonli qatorning yaqinlashuvchi}$$

bo'lishining zaruriy sharti bajarilishini tekshiring.

$$\text{Yechimi: } a_n = \frac{2n+1}{5n-3} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{5n-3} = \frac{2}{5} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{5} \neq 0. \text{ Demak yaqinlashuvchi}$$

bo'lishining zaruriy sharti bajarilmaydi, qator uzoqlashuvchi.

$$35.2. \text{ Umumiy hadi } a_n = \frac{2^n}{n!} \text{ bo'lgan sonli qator yaqinlashishini Dalmber}$$

belgisi yordamida tekshiring:

$$\text{Yeching: } d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+2} * n!}{(n+1)! * 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0; \quad d=0 < 1, \text{ demak sonli qator}$$

yaqinlashuvchi.

35.3. Koshi, belgisi yordamida sonli qatorni yaqinlashishini tekshiring:

$$\text{Yechimi: Qatorning umumiy hadi. } a_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2} < 1 \quad \text{demak} \quad \text{qator}$$

yaqinlashuvchi.

35.4. Koshining integral belgisi yordamida $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{(n^2+1)^2}$ qatorning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanini toping:

Yechimi: $f(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ deb olaylik.

$$\int_1^{\infty} \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{d(1+x^2)}{(x^2+1)^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x^2+1}\right) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+1} - \frac{1}{b^2+1}\right) = -\frac{1}{2} \quad \text{demak}$$

hosmas integral yaqinlashadi shuning uchun berilgan qator yaqinlashadi.

35.5. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$ qatorning yaqinlashuvchanligini

tekshiring:

Yechimi: berilgan qator uchun Leybnits alomatining shartlari bajarilyapti.

Ya'ni $1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \dots > \frac{1}{n} > \dots$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ demak qator yaqinlashadi.

35.6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^3} = \frac{\sin a}{1^3} + \frac{\sin 2a}{2^3} + \dots + \frac{\sin na}{n^3} + \dots$ qatorning yaqinlashuvchanligini

tekshiring:

Yechimi: qatorni qaraymiz $|\sin na| \leq 1$ bo'lgani uchun

$$U_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin na|}{n^3} \leq \frac{1}{n^3} = V_n * \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \quad \text{qator yaqinlashuvchi. Demak berilgan } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^3} \text{ qator}$$

absolyut yaqinlashuvchi.

Qatorlar uchun yaqinlashuvchi bo'lishining zaruriy sharti bajarilishini tekshiring:

35.7. $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{7}{8} + \dots$

35.8. $\frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{6}{27} + \frac{8}{81} + \dots$

Koshining integral belgisi yordamida yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanini tekshiring:

$$35.9. \frac{1}{1} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{10}} + \dots$$

$$35.10. \frac{1}{1+1^2} + \frac{1}{1+2^2} + \frac{1}{1+3^2} + \dots$$

$$35.11. \frac{1}{2\ln^2 2} + \frac{1}{3\ln^2 3} + \frac{1}{4\ln^2 4} + \dots$$

Dalamber belgisi yordamida qatorlarning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanligini tekshiring:

$$35.12. 1 + \frac{2}{21} + \frac{4}{31} + \frac{8}{41} + \dots$$

$$35.13. 1 + \frac{3}{2*3} + \frac{3^2}{2^2*5} + \frac{3^3}{2^3*7} + \dots$$

$$35.14. \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{5}{\sqrt{2*3^2}} + \frac{9}{\sqrt{3*3^3}} + \frac{13}{\sqrt{4*3^4}} + \dots$$

Taqqoslash belgisi yordamida qatorlarning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanini tekshiring:

$$35.15. 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$$

$$35.16. \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} + \dots$$

Quyidagi qatorlarning shartli yoki absalyut yaqinlashishini tekshiring:

$$35.17. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$35.18. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n-2}{3n-1}$$

$$35.19. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n*2^n}$$

$$35.20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$$

Quyidagi qatorlarning yaqinlashuvchi yoki uzoqlashuvchi ekanini tekshiring:

$$35.21. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$$

$$35.22. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4n}$$

$$35.23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$$

$$35.24. 1 + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \dots$$

$$35.25. 1 + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{10^2} + \dots$$

$$35.26. \frac{21}{3} + \frac{41}{9} + \frac{61}{27} + \dots$$

$$35.27. \frac{2}{1} + \frac{4}{3!} + \frac{6}{5!} + \dots$$

Qatorlarning yig'indisini toping:

$$35.28. \frac{1}{1*3} + \frac{1}{3*5} + \frac{1}{5*7} + \dots$$

$$35.29. \frac{1}{1*2*3} + \frac{1}{2*3*4} + \frac{1}{3*4*5} + \dots$$

Quyidagi qatorlarning shartli yoki absalyut yaqinlashishini tekshiring:

$$35.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2na}{n^2 + 1}$$

$$35.31. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$35.32. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^4}{n^2}$$

36. FUNKSIONAL QATORLARGA DOIR MISOLLAR

$$36.1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^4} + \dots + \frac{1}{1+x^{2x}} + \dots \quad \text{funksional qatorning}$$

yaqinlashish sohasini toping.

Yechimi: qatorning umumiy hadi $U_n(x) = \frac{1}{1+x^{2n}}$. Agar $|x| < 1$ bo'lsa. U holda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = 1. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} U_n \neq 0 \quad \text{bo'lgani uchun, qator uzoqlashuvchidir.}$$

Agar $|x| = 1$ bo'lsa, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots$ uzoqlashuvchi qatorni hosil qilamiz. Agar $|x| > 1$

bo'lsa, $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \dots + \frac{1}{x^{2x}} + \dots$ qatorning hadlari cheksiz kamayuvchi. Geometrik progressiya hadlaridan kichik bo'ladi, demak taqqoslash belgisiga ko'ra qator yaqinlashadi.

Demak, berilgan funksional qatorning yaqinlashish sohasi $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ dan iborat.

Qatorlarning yaqinlashish sohasini toping:

$$36.2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1};$$

$$36.3. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \ln^n x;$$

$$36.4. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}};$$

$$36.5. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{2^n};$$

$$36.6. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(2n-1) \cdot 4^n};$$

$$36.7. \quad \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n-1)};$$

$$36.8. \quad 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \dots + \frac{1}{n^x} + \dots;$$

$$36.9. \quad \frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{2^2(x^2+1)^2} + \frac{1}{3^2(x^2+1)^3} + \dots + \frac{1}{n^2(x^2+1)^n} + \dots$$

$$36.10. \quad x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} + \dots + \frac{x^n}{2^{n-1}} + \dots; \quad \text{qatorning } (-2; 2) \text{ oraliqda tekis}$$

yaqinlashishini tekshiring.

$$36.11. \quad 1 + \frac{x^3}{10} + \frac{x^6}{10^2} + \frac{x^9}{10^3} + \dots + \frac{x^{3n}}{10^n} + \dots \quad \text{qatorni yaqinlashishini tekshiring.}$$

Yechimi: $a_n = \frac{1}{10^n}$, shuning uchun yaqinlashish radiusini $R = \sqrt[n \rightarrow \infty]{10} = \sqrt[3]{10}$

formuladan topamiz. Demak berilgan qatorning yaqinlashish oralig'i $(-\sqrt[3]{10}; \sqrt[3]{10})$ bo'ladi. Qatorning yaqinlashishini oraliqning chekka nuqtalarini tekshiramiz. Agar $x = \sqrt[3]{10}$ bo'lsa, qator $1+1+1+1+\dots$ ko'rinishga ega. Agar $x = -\sqrt[3]{10}$ bo'lsa, qator $1-1+1+\dots$ ko'rinishga ega. Bu qatorlar uzoqlashadi. Demak, qatorning yaqinlashish sohasi $(-\sqrt[3]{10}; \sqrt[3]{10})$.

Quyidagi qatorlarning yaqinlashish sohasini toping:

$$36.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{(2n-1)!}$$

$$36.13. \sum_{n=1}^{\infty} (nx)^n$$

$$36.14. \sum_{n=1}^{\infty} n! x^{n-1}$$

$$36.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} * x^{2n-1}}{(4n-3)^2}$$

36.16. $f(x) = x^5 - 4x^4 + 2x^3 + 2x + 1$ ko'phadni $(x=1)$ ikkihadning darajalari bo'yicha yoying.

36.17. $f(x) = \ln x$ funksiyani $x_0=1$ nuqta atrofida Teylor qatoriga yoying.

36.18. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ funksiyani Makloren qatoriga yoying.

Qatorlarning yaqinlashish sohasini toping:

$$36.19. 1 + \frac{x}{3*2} + \frac{x^2}{3^2*3} + \frac{x^3}{3^3*4} + \dots$$

$$36.20. 1 - \frac{x}{5\sqrt{2}} + \frac{x^3}{5^2\sqrt{3}} + \frac{x^5}{5^3\sqrt{4}} + \dots$$

$$36.21. 1 + \frac{x}{3^2\sqrt{3}} + \frac{4x^2}{5^2\sqrt{3^2}} + \frac{8x^3}{7^2\sqrt{3^3}} + \dots$$

$$36.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$36.23. \frac{2x-3}{1} - \frac{(2x-3)^2}{3} + \frac{(2x-3)^3}{5}$$

36.24. $f(x) = x^{10} - 3x^5 + 1$ funksiyani $(x=1)$ ikkihadning darajalari bo'yicha yoying.

36.25. $f(x) = \frac{1}{x}$ funksiyasini $x_0 = 3$ nuqta atrofida Teylor qatoriga yoying va yaqinlashish sohasini toping.

36.26. $f(x) = x^2 * e^x$ funksiyani Makloren qatoriga yoying va yaqinlashish sohasini toping.

36.27. $f(x) = e^{-2x}$ funksiyani x ning darajalari bo'yicha qatorga yoying.

36.28. $f(x) = -\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ funksiyani x ning darajalari bo'yicha qatorga yoying.

JAVOBLAR:

$$1.3. \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 0 & -9 \end{pmatrix} \quad 1.4. \begin{pmatrix} 3 & -9 & -13 \\ 8 & -5 & 13 \end{pmatrix} \quad 1.5. \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1.6. (6 \quad 7) \quad 1.7. \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad 1.8. \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 10 & 10 & 33 \\ -11 & -7 & 25 \end{pmatrix}$$

$$1.9. \begin{pmatrix} 11 & 14 \\ 7 & 18 \end{pmatrix} \quad 1.10. \begin{pmatrix} 28 & 15 & 16 \\ 19 & 36 & 15 \\ 30 & 19 & 28 \end{pmatrix} \quad 1.11. \begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$1.12. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 6 & -3 & 15 \\ 34 & 0 & 82 \end{pmatrix} \quad 1.13. \begin{pmatrix} -6 & 1 & 3 \\ 6 & 2 & 9 \\ -12 & -3 & 14 \end{pmatrix} \quad 1.14. \begin{pmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 3 & 10 & 0 \\ 2 & 9 & -7 \end{pmatrix}$$

$$1.15. \begin{pmatrix} 10 & 17 & 19 & 23 \\ 17 & 23 & 27 & 35 \\ 16 & 12 & 9 & 20 \\ 7 & 1 & 3 & 10 \end{pmatrix} \quad 1.16. \begin{pmatrix} 8 & 6 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & -5 & -10 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 10 & 9 & 8 & 7 \end{pmatrix} \quad 1.17. \begin{pmatrix} 16 & 25 \\ 13 & -8 \end{pmatrix}$$

$$1.18. \begin{pmatrix} 4 & 7 & 11 \\ 4 & 2 & -2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad 1.19. \begin{pmatrix} 8 \\ 19 \end{pmatrix} \quad 1.20. \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 6 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1.21. \begin{pmatrix} 73 & 25 \\ 1 & -11 \end{pmatrix} \quad 1.22. \begin{pmatrix} -9 & -16 & -3 \\ 19 & 21 & 17 \end{pmatrix}$$

$$1.23. \begin{pmatrix} 8 & 0 & 7 \\ 16 & 10 & 4 \\ 13 & 5 & 7 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 4 & 6 & 6 \\ 1 & 7 & 3 \\ 8 & 11 & 14 \end{pmatrix} \quad 1.24. \begin{pmatrix} 9 & 6 & 6 \\ 6 & 9 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad 1.25. \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1.26. \begin{pmatrix} 6 & 1 & 10 \\ 3 & 1 & 14 \\ -5 & -9 & 9 \end{pmatrix} \quad 1.27. \begin{pmatrix} 11 & -22 & 29 \\ 9 & -27 & 32 \\ 13 & -17 & 26 \end{pmatrix} \quad 1.28. \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1.29. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 1.30. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad 1.31. \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2^{20} & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.3. -2 \quad 2.4. -35 \quad 2.5. 4\sqrt{ab} \quad 2.6. 1$$

- 2.7. $(x^2+y^2)/x(x^2-y^2)$ 2.8. a) $\sin(a+b)\sin(a-b)$ b) 5
- 2.9. a) $x_1=1/2, x_2=1$ b) $x_1=-5/2, x_2=3$ c) $x_1=2; x_2=3$
- 2.10. a) $x \in [2;3]$ b) $(-\infty, 2) \cup (5, \infty)$ 2.11. -10
- 2.12. $4a$ 2.13. 68 2.14. 15 2.15. 29
- 2.16. 0 2.17. -20 2.18. $-4a^3$ 2.19. 48
- 2.20. 1 2.21. $\sin(b-a)$ 2.22. $\sin(b-y)+\sin(y-a)+\sin(a-b)$
- 2.23. $\cos^2 a + \cos^2 b + \cos^2 y = 1$ 2.24. $(ab+bc+ca)x+abc$ 2.25. 1
- 2.26. $-37/4$ 2.27. 0 2.28. 5 2.29. $-2\sqrt{a}, a>0, a \neq 1$
- 2.30. 10 2.31. 72 2.32. $(x-y)(y-z)(x-z)$ 2.33. amn
- 2.34. $a(x-z)(y-z)(y-x)$ 2.35. $4\sin a \sin^2 a/2$ 2.36. $3abc - a^3 - b^3 - c^3$
- 2.37. $2x^3 - (a+b+c)x^2 + abc$ 2.38. 6 2.39. 20 2.40. -8
- 2.41. $x = (-1)^k \pi/12 + \pi k/2$ 2.42. $x < 0$
- 3.1. a) -22 b) 34 3.2. -11 3.3. $-b(b+1)$ 3.4. $-2x$
- 3.5. 68 3.6. 0 3.7. 0 3.8. 0
- 3.9. 0 3.10. 96 3.11. 40 3.12. 0
- 3.13. 54 3.14. 465 3.15. -10 3.16. 10
- 3.17. 17 3.18. 65 3.19. 14 3.20. -12
- 3.21. -1 3.22. -20 3.23. 2 3.24. 160
- 3.25. 0 3.26. $2(ad-bc)$ 3.27. -252 3.28. -4
- 3.29. 900 3.30. 12 3.31. 39520 3.32. $a^2 b^2$
- 3.33. $(n-1)!$ 3.34. $-2(n-2)!$
- 4.1. a) $|A|=4, N(A)=3, r(A)=2$ b) $|A|=133, N(A)=14, r(A)=3$
- c) $|A|=0, N(A)=\sqrt{29}, r(A)=2$ d) $|A|=0, N(A)=\sqrt{116}, r(A)=2$
- 4.2. $r=3$ 4.3. $r=2$ 4.4. $r=2$ 4.5. $r=2$
- 4.6. $r=2$ 4.7. $r=2$ 4.8. $r=2$ 4.9. $r=1$
- 4.10. $r=1$ 4.11. $r=2$ 4.12. $r=2$ 4.13. $r=3$
- 4.14. $r=2$ 4.15. $r=2$ 4.16. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ 4.17. A^{-1} mavjud

$$4.18. \begin{pmatrix} -ctga & 1 \\ 2 & -tga \end{pmatrix} \quad 4.19. \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad 4.20. \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$4.21. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix} \quad 4.22. \begin{pmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad 4.23. \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad 4.24. \begin{pmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.25. \text{ a) } |A|=24, N(A)=7, r(A)=2 \quad \text{ b) } |A|=35, N(A)=\sqrt{61}, r(A)=2$$

$$\text{ c) } |A|=0, N(A)=\sqrt{29}, r(A)=2 \quad \text{ d) } |A|=0, N(A)=6, r(A)=3$$

$$4.26. r(A)=2 \quad 4.27. r(A)=3 \quad 4.28. r(A)=3 \quad 4.29. r(A)=2$$

$$4.30. r=3 \quad 4.31. r=3 \quad 4.32. \text{ Teskari matritsa mavjud emas.}$$

$$4.33. C^I = \begin{pmatrix} 1/134 & 31/134 & -23/134 \\ 13/134 & -1/134 & 31/134 \\ 17/134 & -9/134 & 11/134 \end{pmatrix} \quad 4.34. \begin{pmatrix} -5/2 & -5/2 & -1/5 \\ -6/5 & -4/5 & -4/5 \\ -7/10 & -1/5 & -1/10 \end{pmatrix}$$

$$4.35. \begin{pmatrix} 9/5 & -2/5 & -4/5 \\ 1/5 & 2/5 & -1/5 \\ -12/5 & 1/5 & 7/5 \end{pmatrix} \quad 4.36. \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2/3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5.2. r(A)=2, r(B)=3 \text{ sistema birgalikda emas.}$$

$$5.3. r(A)=2, r(B)=3 \text{ sistema birgalikda emas.}$$

$$5.4. r(A)=r(B) \text{ sistema birgalikda.} \quad 5.5. r(A)=r(B) \text{ sistema birgalikda.}$$

$$5.6. \text{ Sistema birgalikda.} \quad 5.7. r(A)=r(B)=3 \text{ sistema birgalikda.}$$

$$5.8. r(A)=r(B)=2 \text{ sistema birgalikda.}$$

$$5.9. r(A)=2, r(B)=3 \text{ sistema birgalikda emas.}$$

$$5.10. r(A)=r(B)=2 \text{ sistema birgalikda.} \quad 5.11. \text{ Sistema birgalikda.}$$

$$5.12. \text{ Sisema birgalikda.} \quad 5.13. r(A)=r(B)=2 \text{ sistema birgalikda.}$$

$$5.14. r(A)=2, r(B)=2 \text{ sistema birgalikda.}$$

$$5.15. r(A)=2, r(B)=3 \text{ sistema birgalikda emas.}$$

$$5.16. r(A)=r(B)=3 \text{ sistema birgalikda.}$$

$$5.17. r(A)=r(B)=2 \text{ sistema birgalikda.} \quad 5.18. \text{ Sistema birgalikda emas.}$$

$$6.2. (1; 1; 1) \quad 6.3. (2; -1; 0) \quad 6.4. (1; 2; 3) \quad 6.5. x_1=x_2=1, x_3=x_4=-1$$

$$6.6. x_1=1; x_2=x_3=2; x_4=0 \quad 6.7. x=-3, y=0, z=-0,5, t=2/3$$

$$6.8. x=2, y=-3, z=-1,5, t=0,5 \quad 6.9. (-1; 3; 2) \quad 6.10. (1; -2; -5)$$

$$6.11. (5; 6; 10) \quad 6.12. (-1; 0; 1) \quad 6.13. (2; -1; -3) \quad 6.14. (1; -1; 2)$$

- 6.15. (1; 0; 2) 6.16. Sistema yechimga ega emas. 6.17. (1; -2; 3)
- 6.18. $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = -1$ 6.19. $x_1 = 2, x_2 = -2, x_3 = 1, x_4 = -1$
- 6.20. Sistema yechimga ega emas. 6.21. Sistema yechimga ega emas.
- 7.2. $\left\{ \frac{8}{5} - x_3; 2x_3 - \frac{7}{5}; x_3 \in R \right\}$ 7.3. Sistema yechimga ega emas.
- 7.4. (1; 0; 2; -3) 7.5. Sistema yechimga ega emas. 7.6. $\left\{ \frac{12}{5} - x_3; -\frac{4}{5}; x_3 \in R \right\}$
- 7.7. Sistema yechimga ega emas. 7.8. $x_1 = -1; x_2 = 3; x_3 = -2; x_4 = 2$.
- 7.9. $x_1 = 5; x_2 = 4; x_3 = 3; x_4 = 2; x_5 = 1$. 7.10. (1; -1; 2)
- 7.11. $\left\{ \frac{4}{5} - \frac{1}{5}x_4; -\frac{17}{5} + x_3 - \frac{7}{5}x_4; x_3 \in R; x_4 \in R \right\}$. 7.12. Sistema yechimga ega emas.
- 7.13. $\left\{ -\frac{2}{7}; \frac{13}{7}; 0 \right\}$ 7.14. (1; 2) 7.15. Sistema yechimga ega emas.
- 7.16. (1; 2; 3; 4) 7.17. Sistema yechimga ega emas. 7.18. (2; 1; -3; 1)
- 7.19. (3; -5; 4; -2; 1) 7.20. (1; 2; -1)
- 8.1. $r=7, \cos\alpha=2/7, \cos\beta=3/7, \cos\gamma=6/7$.
- 8.2. $M(3\sqrt{2}; 3; -3), \vec{r} = 3(\sqrt{2}\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$ 8.3. $\vec{a} = 2\vec{b} - 0,8\vec{c}$
- 8.4. Ko'rsatma $AD=BC$ tenglikdan ular koordinatalarining tengligi
($x-1=6-3$) kelib chiqadi (4; 0; 6) 8.5. $B=C=45^\circ$ 8.6. 90°
- 8.7. $\Pr_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ $\Pr_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ 8.8. 1) $2+\sqrt{3}$ 2) 40 8.9. $\sqrt{39}$
- 8.10. $\overline{OM} = \sqrt{(2+\overline{m})^2} = \sqrt{7}; \overline{ON} = \sqrt{(3\overline{m}+\overline{n})^2} = \sqrt{13};$
 $\cos\varphi = \frac{\overline{OM} * \overline{ON}}{|\overline{OM}| * |\overline{ON}|} = \frac{17}{2\sqrt{91}} = 0,891; \varphi = 27^\circ$
- 8.11. (4; -2; 6; 8); (25; 1; 9; 38); (-8; -5; 7; -8) 8.12. $\vec{b} = 2\vec{a}_1 - 3\vec{a}_2$
- 8.13. $\vec{b} = \vec{a}_1 + 3\vec{a}_2 - 2\vec{a}_4$ 8.14. Yoyib bo'lmaydi.
- 8.15. $\vec{b} = \vec{a}_1 - 7\vec{a}_2 - 7\vec{a}_3$ 8.16. $\lambda \neq 12$ da 8.17. $\vec{u} = 3\sqrt{5}; \cos\alpha = -\frac{2}{3\sqrt{5}}$
- 8.18. $(a+b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi$ (kosinuslar teoremasi)
 $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$ (parallelogramm diagonallarining xossasi).

8.19. $\sqrt{7}; \sqrt{13}$

8.20. $5/6$

8.21. $\cos\varphi = \frac{2}{\sqrt{7}}$

8.22. $\cos\varphi = 0,26\sqrt{10}; \varphi = 34^{\circ}42'$

8.23. 120°

8.24. a) c va d b) $\cos(a,b) = \frac{6}{\sqrt{105}}; \cos(b,c) = \frac{31}{3 \cdot \sqrt{26}}; \cos(b;d) = -\frac{5}{6 \cdot \sqrt{15}}$

9.1. Chiziqli erkli. 9.2. Chiziqli bog'liq. 9.3. Chiziqli bog'liq.

9.4. Chiziqli bog'liq. 9.5. Chiziqli erkli. 9.6. Chiziqli erkli.

9.7. Chiziqli erkli. 9.8. Chiziqli erkli. 9.9. Chiziqli bog'liq.

9.10. Chiziqli bog'liq emas. 9.11. Chiziqli bog'liq. 9.12. Chiziqli bog'liq.

9.13. Chiziqli bog'liq emas. 9.14. Chiziqli bog'liq. 9.15. $\lambda = 0$.

9.16. Chiziqli bog'liq emas. 9.17. Chiziqli bog'liq emas.

9.18. Chiziqli bog'liq. 9.19. Chiziqli bog'liq emas.

9.20. Chiziqli bog'liq emas. 9.21. Chiziqli bog'liq emas.

9.22. Chiziqli bog'liq. 9.23. a) $(6; 5; 8,5; 3,5)$ b) $(-77; -44; 24; -10)$ 9.24. $(-8; -5; -12; -5)$ 9.25. $(-11,5; 7,25; 6,75; -2,25)$ 9.26. Yoyish mumkin.

9.27. Yoyish mumkin. 9.28. Yoyish mumkin. 9.29. Yoyish mumkin.

9.30. Yoyish mumkin emas. 9.31. Yoyish mumkin emas. 9.32. $\lambda = 15$.9.33. $\lambda \neq 12$.9.34. $\lambda \in \mathbb{R}$.9.35. Hech qanday λ uchun.10.1. Bazisi a_1, a_2, a_3 , rangi 310.2. Bazisi a_1, a_2, a_3, a_4 rangi 410.4. $b = 0,5a_1 + 2a_2 - 0,5a_3$ 10.6. $(2; -2; 1)$ 10.7. a) a_1, a_2 ; b) a_2, a_3 10.8. Ixtiyoriy ikkita vektor bazis tashkil etadi. 10.9. $r = 2; (a_1 a_2), (a_2 a_3)$ 10.10. $r = 2; (a_1 a_2), (a_1 a_3), (a_1 a_4)$ 10.11. $r = 2; (a_1 a_4), (a_2 a_4), (a_3 a_4)$

10.12. Ortogonal emas. 10.13. Ortogonal. 10.14. Ortogonal emas.

10.15. Ortogonal. 10.16. Ortogonal va ortonormal vektorlar: $b_1(1;0)$, $b_2(0;1)$.

10.17. $b_1(1;1;1;0)$, $b_2(-2;1;1;3)$, $b_3(1;-3;2;1)$ $\frac{b_1}{|b_1|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; 0 \right)$,

$$\frac{b_2}{|b_2|} = \left(-\frac{2}{\sqrt{15}}; \frac{1}{\sqrt{15}}; \frac{1}{\sqrt{15}}; \frac{3}{\sqrt{15}} \right), \quad \frac{b_3}{|b_3|} = \left(\frac{1}{\sqrt{15}}; -\frac{3}{\sqrt{15}}; \frac{2}{\sqrt{15}}; \frac{1}{\sqrt{15}} \right)$$

10.18. a_1, a_2, a_3, a_4 - bazis, $r = 4$ 10.19. a_1, a_2, a_3 - bazis, $r = 3$ 10.20. a) a_1, a_4 b) a_2, a_4 c) a_3, a_4

10.21. a_1, a_2, a_5 va a_3, a_4, a_5 lardan tashqari ixtiyoriy uchta vector bazisni tashkil qiladi. 10.22. Ychta bazis. 10.23. a_1, a_2, a_3, a_5 bazis tashkil qiladi.

$$10.24. \mathbf{b}_1=(1;1); \quad \mathbf{b}_2=(-1;1); \quad \frac{b_1}{|b_1|}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \frac{b_2}{|b_2|}=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$10.25. \mathbf{b}_1=(1;0;1;0); \quad \mathbf{b}_2=(-1;2;1;2); \quad \mathbf{b}_3=(2;1;-2;1)$$

$$\frac{b_1}{|b_1|}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; \frac{1}{\sqrt{2}}; 0\right), \quad \frac{b_2}{|b_2|}=\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}; \frac{2}{\sqrt{10}}; \frac{1}{\sqrt{10}}; \frac{2}{\sqrt{10}}\right), \quad \frac{b_3}{|b_3|}=\left(\frac{2}{\sqrt{10}}; \frac{1}{\sqrt{10}}; -\frac{2}{\sqrt{10}}; 1\right),$$

$$10.26. \mathbf{b}_1=(1;1;1;1); \quad \mathbf{b}_2=(1;1;1;-3); \quad \mathbf{b}_3=(1;-2;1;0)$$

$$\frac{b_1}{|b_1|}=\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right), \quad \frac{b_2}{|b_2|}=\left(\frac{1}{\sqrt{12}}; \frac{1}{\sqrt{12}}; \frac{1}{\sqrt{12}}; -\frac{3}{\sqrt{12}}\right), \quad \frac{b_3}{|b_3|}=\left(\frac{1}{\sqrt{6}}; -\frac{2}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}; 0\right),$$

$$11.1. (-2;1;0;0), \text{ yoki } (1;0;1;0), \text{ yoki } (1;0;0;1) \quad 11.2. \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}; 1\right)$$

$$11.3. (0;0;0;0)$$

$$11.4. (8;-6;1;0), (-7;5;0;1)$$

$$11.5. \mathbf{F}_0(-11;-6;0;0), \mathbf{F}_1(11;7;1;0), \mathbf{F}_2(5;3;0;1)$$

$$11.6. \mathbf{F}_1=(-1;1;1;1), \mathbf{F}_0=(0;0;0;1) \quad 11.7. \mathbf{F}_0=\left(\frac{13}{5}; \frac{6}{5}; 0\right), \mathbf{F}_1=\left(\frac{7}{5}; -\frac{1}{5}; 1\right)$$

$$11.8. \mathbf{F}_0=(1; \frac{7}{2}; 0; 0), \mathbf{F}_1=(-\frac{5}{2}; \frac{9}{2}; 1; 0), \mathbf{F}_2=(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; 0; 1)$$

$$11.10. \mathbf{F}_0=(0;0;0), \mathbf{F}_1=(-\frac{5}{7}; \frac{11}{7}; 1) \quad 11.11. (0;0;0) \quad 11.12. \mathbf{F}_1=(\frac{13}{2}; \frac{7}{3}; \frac{1}{2}; 1)$$

$$11.13. \mathbf{F}_1=(8;-6;1;0), \mathbf{F}_2=(13;-5;0;1)$$

$$11.14. \mathbf{F}_0=(\frac{9}{2}; -\frac{9}{2}; 0; 0), \mathbf{F}_1=(\frac{17}{4}; -\frac{9}{4}; 0; 1) \quad 11.15. \mathbf{F}_1=(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}; 1)$$

$$11.16. \mathbf{F}_1=(-1;1;0;-2;3), \mathbf{F}_2=(4;0;1;-1;-3)$$

$$11.17. \mathbf{F}_0=(-\frac{2}{7}; -\frac{17}{7}; 0; 0; 0), \mathbf{F}_1=(-\frac{6}{7}; -\frac{12}{7}; 1; 0; 0) \quad \mathbf{F}_2=(-\frac{9}{7}; -\frac{12}{7}; 0; 1; 0),$$

$$\mathbf{F}_3=(-\frac{19}{7}; -\frac{23}{7}; 0; 0; 1)$$

$$11.18. (-1;0;1) \text{ --yagona yechim.}$$

12.4. Bazislaridan biri a_1, a_2 ; o'lchami 2;

$$\frac{b_1}{|b_1|}=\left(\frac{3}{\sqrt{14}}; -\frac{1}{\sqrt{14}}; \frac{2}{\sqrt{14}}\right); \quad \frac{b_2}{|b_2|}=\left(\frac{23}{\sqrt{3402}}; \frac{53}{\sqrt{3402}}; -\frac{8}{\sqrt{3402}}\right) \quad 12.5. x\left(\frac{4}{7}; \frac{5}{7}\right)$$

12.6. Ortogonal emas. 12.7. Ortogonal emas. 12.8. Ortogonal emas.

12.9. a) $e_1' = e_2$; $e_2' = e_1 + 2e_2$ b) $e_1' = -e_1 + e_2$, $e_2' = -2e_1 + e_2$ c) $e_1' = e_1 - e_2$, $e_2' = e_1 + e_2$

12.10. $P = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$ 12.11. Bazislaridan biri a_1, a_2, a_4 ; o'lchami 3;

$\frac{b_1}{|b_1|} = \left(\frac{1}{\sqrt{15}}, \frac{2}{\sqrt{15}}, -\frac{1}{\sqrt{15}}, \frac{3}{\sqrt{15}} \right)$ $\frac{b_2}{|b_2|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{219}}, \frac{7}{\sqrt{219}}, \frac{13}{\sqrt{219}}, 0 \right)$

$\frac{b_3}{|b_3|} = \left(\frac{15909}{|b_3|}, \frac{18723}{|b_3|}, \frac{15906}{|b_3|}, -\frac{12483}{|b_3|} \right)$ $|b_3| = \sqrt{1022473135}$ 12.12. $x\left(\frac{5}{3}; -\frac{1}{3}\right)$

12.13. $x\left(\frac{5}{3}; -\frac{1}{3}; 0\right)$ 12.14. Ortogonal. 12.15. Ortogonal emas.

12.16. $\begin{cases} e_1' = -3e_1 + 4e_2 - 3e_3 \\ e_2' = 20e_1 - 17e_2 + 13e_3 \\ e_3' = 24e_1 - 20e_2 + 15e_3 \end{cases}$

13.5. $6\bar{e}_1 - 19\bar{e}_2$ 13.6. $-4\bar{e}_1 + 7\bar{e}_2 + 7\bar{e}_3$ 13.7. $\begin{pmatrix} -3 & 14 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$

13.8. $(4c_1 - c)$, $\lambda = 1$ ($c_1 - c$), $\lambda = -2$

13.9. $(-2c, c, c)$, $\lambda_1 = 1$, $(0, c_1, c_1)$, $\lambda_2 = 3$ $(6c_2, -7c_2, 5c_2)$, $\lambda_3 = -3$

13.10. $(c, c, -c)$, $\lambda = -1$ 13.11. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; 13.12. 1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

2) $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -8 & -7 \\ 1 & 4 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}$ 13.13. $\lambda = 2$, $x = (c_1, 2c_1, c_2)$;

13.14. $\lambda_1 = 1$, $x = (c, c, c)$; $\lambda_2 = 0$ $x = (c, 2c, 3c)$ 13.15. $\lambda_1 = 1$, $x(3c, c, c)$;

13.16. $\lambda_1 = 1$, $x = (2c_1 + c_2; c_1 - c_2)$; $\lambda_2 = -1$, $x = (3c, 5c, 0)$

13.17. $\lambda_1 = 2$, $x = (0, c_1, 0)$ $\lambda_2 = -1$, $x(0, c_2, -c_2)$

13.18. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 13.19. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$14.5. L=(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 5 \\ -3 & 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad 14.6. \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2.5 \\ 1 & 4 & 0.5 \\ 2.5 & 0.5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$14.7. L = (y_1, y_2) = 19y_1^2 - 22y_1y_2 + 6y_2^2 \quad 14.8. \text{ Musbat aniqlangan.}$$

$$14.9. \text{Manfiy aniqlangan.} \quad 14.10. \text{Musbat aniqlangan.} \quad 14.11. \text{Manfiy aniqlangan.}$$

$$14.12. \text{Umumiy ko'rinishda.} \quad 14.13. \text{Manfiy aniqlangan.}$$

$$14.14. \text{Musbat aniqlangan.} \quad 14.15. 4y_1^2 + 4y_2^2 - 2y_3^2 \quad 14.16. 8y_1^2 + 8y_2^2 + 5y_3^2$$

$$14.17. y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 \quad 14.18. 9y_1^2 + 18y_2^2 + 18y_3^2$$

$$15.1. a) x+2y-2\sqrt{5}=0 \quad b) -\frac{1}{2}x+\sqrt{5} \quad c) \frac{x}{2\sqrt{5}}+\frac{y}{\sqrt{5}}=1 \quad 15.2. 54 \text{ kv. birlik.}$$

$$15.3. x+y-4=0 \quad 15.4. x+y-7=0 \quad 15.5. x+y-5=0 \quad x+y+5=0$$

$$15.6. |AB|=10 \quad \text{Pr}_{ox} AB=8 \quad \text{Pr}_{oy} AB=6 \quad 15.7. 1) \arctg \frac{3}{4} \quad 2) 45^\circ \quad 3) 45^\circ$$

$$15.10. y=2x+9 \quad y=-\frac{1}{2}x+4 \quad 15.11. 5x+2y+(-4)=0 \quad 5x+2y=25$$

$$15.12. x+y-2=0 \quad 15.13. AC: x-3y+2=0; BD: 3x+y=10; BE: x+y-2=0$$

$$15.14. (3;-1), (3;3), \left(-\frac{9}{5}; \frac{3}{5}\right), 45^\circ, 71^\circ 31', 63^\circ 24'$$

$$15.15. x+3y+13=0; 3x-y+9=0; 3x-y-11=0 \quad 15.20. 135^\circ$$

$$15.21. \sqrt{3}x+y-1=0 \quad 15.22. 3x+2y=0 \quad 15.23. x+3=0, y+4=0$$

$$15.24. y=0; 4x-3y=0; 4x-3y+12=0; y=4 \quad 15.25. x+y-4=0; x-y+4=0; y=3; y=0$$

$$15.26. \frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1, \quad \frac{x}{-2}+\frac{y}{-6}=1 \quad 15.27. a) 0^\circ, \quad b) 90^\circ$$

$$15.28. AE: 2x-5y=-4, AD: x-2y=-2 \quad |\overline{AE}|=\sqrt{29}$$

$$15.29. tgA=\frac{4}{3} \quad tgB=tgC=2. S=16 \text{ kv.birlik}$$

$$15.30. \frac{a^2}{5} \text{ kv.birlik} \quad 15.31. A=36^\circ 52' \quad B=128^\circ 52'$$

$$15.32. (0; 2), (4; 0) (2; 4), (-2; 6).$$

$$16.1. x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0 \quad 16.2. x^2 + y^2 + 6x = 0 \quad 16.3. tg \alpha = -2,4; \alpha = 112^\circ 37'$$

$$16.4. (x+4)^2 + (y+1)^2 = 25 \quad 16.5. x^2 + y^2 - 8y = 0$$

$$16.8. b=1,4; 3; 4; 4,8; 5 \quad \varepsilon=0,96; 0,8; 0,6; 0,28; 0$$

$$16.9. a=150 \text{ mln. kv. } \varepsilon=\frac{1}{60} \quad 16.10. \frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{28}=1; \quad r_1=11; \quad r_2=5$$

$$16.11. \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1; \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad r_1 = 4 - \sqrt{3}; \quad r_2 = 4 + \sqrt{3}; \quad 16.12. \left(-\frac{15}{4}; \frac{\sqrt{63}}{4} \right)$$

$$16.13. \sqrt{0,4} \quad 16.15. a = 5, b = 10\sqrt{2}, F_1(-15;0), F_2(15;0), y = \pm 2\sqrt{2}x$$

$$16.16. x^2 - y^2 = a^2 \quad 16.18. b; \quad 2\arctg \frac{b}{a} \quad 16.19. \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \text{ (yoki } \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1)$$

$$16.20. y = \pm \frac{4}{3}(x+5) \quad 16.22. 1) y^2 = 9x; \quad 2) y = -x^2$$

$$16.23. y^2 = -3x, \quad x = 0.75y \text{ yoki } x^2 = -3y, \quad y = 0.75x \quad 16.24. (3; \pm 3\sqrt{2})$$

Ko`rsatma: izlanayotgan aylananing tenglamasini $x^2 + y^2 + mx + ny + p = 0$ ko`rinishda yozib olish kerak.

$$16.25. (x+4)^2 + (y+1)^2 = 25 \quad 16.26. \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1; \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad r_1 = 3; \quad r_2 = 9;$$

$$16.27. \left(\pm \frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{3} \right) \quad 16.28. (0; \pm a\sqrt{2}); \quad 90^\circ \quad 16.29. \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$16.30. 1) y^2 = -4x; \quad 2) y = x^2 \quad 16.31. \left(x - \frac{p}{2} \right)^2 + y^2 = p^2; \quad \left(\frac{p}{2}; \pm p \right)$$

$$17.1. x+4y-2z=2 \quad 17.2. x+y=2a \quad 17.3. x-y+z=a \quad 17.4. 2y-3z+7=0$$

$$17.5. 3y+2z=0 \quad 17.6. 2x+y=0 \quad 17.7. \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1 \quad 17.8. x+y+z=4$$

$$17.9. \frac{x}{4} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1 \quad 17.10. 1) 45^\circ; \quad 2) 78^\circ 30' \quad 17.11. x-2y-3z=4$$

$$17.12. 2x+3y+4z=3 \quad 17.13. x-2y-3z+14=0 \quad 17.14. 3x-4z=0$$

$$17.15. x+y=4 \quad 17.16. \frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} = 1 \quad 17.17. 2x+y+z=a \quad 17.18. 2x-2y+z=2$$

$$17.19. 2x-y+z=5 \quad 17.20. 3x-y=0 \text{ va } x+3y=0 \quad 17.21. 3 \quad 17.22. \sqrt{6}$$

$$17.23. 2\sqrt{2} \quad 17.24. (1; -1; 2) \quad 17.25. 3x-4y+z=11$$

$$18.1. P(0;0;1) \quad 18.2. 1) \bar{P} = \bar{i} \quad 2) \bar{P} = \bar{i} + \bar{k} \quad 3) \bar{P} = \bar{j} + \bar{k}$$

$$18.3. \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{-5}; \quad \cos \alpha = 0,3\sqrt{2}; \quad \cos \beta = 0,4\sqrt{2}; \quad \cos \gamma = -0,5\sqrt{2}$$

$$18.4. x=2; \quad z=3 \quad 18.5. 1) \begin{cases} x = -2+t \\ y = 1-2t \\ z = -1+3t \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x = 1+t \\ y = 1-t \\ z = 2+t \end{cases} \quad 18.6. \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

18.7. Ikkala to'g'ri chiziq uchun ham $Am+Bn+Cp=2 \cdot 2+1 \cdot (-1)+(-1) \cdot 3=0$, lekin birinchisining $(-1; -1; 1)$ nuqtasi tekislikda yotadi, ikkinchisining $(-1; -1; -3)$ nuqtasi esa tekislikda yotadi.

18.8. $y+z+1=0$ (to'g'ri chiziqning tenglamalarini $\frac{x-2}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ ko'rinishda yozish mumkin).

18.9. $x-2y+z+5=0$

18.10. $8x-5y+z-11=0$

18.11. 1) $\frac{x-a}{0} = \frac{y-b}{0} = \frac{z-c}{1}$, demak, $\begin{cases} x=a \\ y=b \end{cases}$ 2) $z=c$ va $\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n}$

18.12. $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}}$

18.13. $3x+2y=0$ $z=4$

18.14. $0,3\sqrt{38}$

18.15. $\begin{cases} x=6-3z \\ y=-2z+4 \end{cases}$ $\frac{x-6}{-3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{1}$ izlari: (6;4;0), (0;0;2)

18.16. $\frac{x}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z}{3}$

18.17. $P(0;1;0)$

18.18. $y=-3$; $2x-z=0$

18.19. Tenglamalarni kanonik formaga keltiramiz;

$\frac{x}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-5}{2}$ va $\frac{x}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{6}$; $\cos \varphi = \frac{20}{21} \approx 0,952$; $\varphi = 17^\circ 48'$

18.20. $x+2y-2z=1$

18.21. (5; 5; -2)

18.22. (6; 4; 5)

18.23. $x+2y-5z=0$

18.24. $\frac{x-2}{-9} = \frac{y-1}{8} = \frac{z}{11}$

19.1. yo'q 19.2. ha 19.3. ha 19.4. ha 19.5. yo'q

19.6. ha 19.7. yo'q, yo'q 19.8. yo'q 19.9. yo'q

19.10. yo'q, masalan o'tmas burchakli tomonlari umumiy bo'lgan uchburchaklar.

19.11. yo'q 19.12. yo'q 19.13. yo'q 19.14. ha 19.15. ha

19.16. O, A, C, K, E - chetki, B, D - chegaraviy

19.17. A, C - chetki, O, B - chegaraviy, K - ichki

19.18. A - chetki, B - chegaraviy, C - ichki

19.19. to'g'ri chiziq, chetki nuqtalari yo'q

19.20. chetki nuqtalari: (3; 0), (5; -2/3), (5; -1) bo'lgan uchburchak

19.21. parallel to'g'ri chiziqlar tashqarisi, chetki nuqtalari yo'q

19.22. chetki nuqtalari: (0; 0), (0; 3), (4; 0) bo'lgan uchburchak.

20.2. a) $x_n = \frac{1}{n!}$; b) $\frac{(2n-1)^2}{n^2}$; c) $x_n = 3^n + (-1)^n$.

20.3. b) $|x_n| = \frac{|(-1)^n n + 1|}{\sqrt{n^2 + 2}} \leq \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \leq 2$; c) $|\sin n| \leq 1$; d) $|x_n| = |1 - (-1)^n| \leq 2$.

20.4. b) Monoton o'suvchi $x_{n+1} - x_n = 3^{n+1} - 2^{n+1} - (3^n - 2^n) = 2 \cdot 3^n - 2^n > 0$;

c) Monoton o'suvchi $x_{n+1} - x_n = \sqrt{(n+1)^2 - 1} - \sqrt{n^2 - 1} > 0$;

d) Monoton o'suvchi $x_{n+1} - x_n = \sum_{k=1}^{n+1} k - \sum_{k=1}^n k = n+1 > 0$.

20.6. $\frac{3}{4}$ 20.7. 2 20.8. $\frac{1}{5}$ 20.9. 0 20.10. $\sqrt{2}$

20.11. 0 20.12. $\frac{4}{3}$ 20.13. $\frac{3}{2}$ 20.14. $\frac{5}{2}$ 20.15. 0

20.16. $\frac{3}{2}$ 20.17. $\frac{1}{2}$; Ko'rsatma: $\frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$

20.18. $-\frac{1}{2}$ 20.19. $-\frac{2}{9}$ 20.21. (1, 0) 20.22. $\left(\frac{9}{4}, 0\right)$ 20.23. (3, 2)

20.27. 3 20.28. 1 20.29. 2 20.30. 1 20.31. $\sqrt{2}$

20.32. 0 20.33. $\frac{1}{2}$ 20.34. 1 20.35. 1

20.36. $\frac{\log_a(n+1)!}{\log_a n!}$ cheksiz kichik miqdor; 1 20.37. 1, agar $b < 1$; 0, agar $b \geq 1$

20.38. 1 20.39. 1 20.40. $\frac{1}{2}$

21.2. $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ 21.3. $\left[1; \frac{5}{3}\right]$ 21.4. $[-2; 0] \cup (0; 1)$ 21.5. $[0; 3]$

21.6. $x=-1, x=1$ nuqtalar. 21.7. $(0; 1) \cup (1; +\infty)$ 21.8. $\left\{x \in [-4; 4], x \neq \sqrt{16 - \frac{\pi^2}{4}}\right\}$

21.9. $\left(\frac{2}{3}; 2\right)$ 21.10. $\left(2\pi n - \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$

21.12. $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$; $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$

21.13. $\left|x + \frac{1}{x}\right| \geq 2$; $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ 21.14. $\left[0; \frac{3}{2}\right]$

21.15. $y = 1 + \frac{3}{x-2}$; $y \neq 1$; $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$ 21.16. $(1; 2]$; $\frac{2-y}{y-1} \geq 0$

21.17. $y \in \left(-\infty; -\frac{2}{\pi}\right] \cup \left[\frac{2}{\pi}; +\infty\right)$ 21.19. Toq.

21.20. Juft ham emas, toq ham emas. 21.21. Juft. 21.22. Juft.

21.23. Juft. 21.24. Juft. 21.25. Toq. 21.26. Juft.

21.28. $f(x+T)=f(x)$ tenglik ixtiyoriy T uchun o`rinli, lekin T larning ichida eng kichigi yo`q, davriy emas. 21.29. $\frac{4\pi}{3}$. 21.30. $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$, 2π .

21.31. 2π . 21.32. $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$; π . 21.33. $T=1$.

21.35. $y=-x$ chiziq nuqtalari va bu chiziqdan yuqorida joylashgan barcha nuqtalar to`plami.

21.36. Tekislikning ikkinchi choragidagi nuqtalar to`plami.

21.37. $\{(x;y): x^2 + y^2 \leq 9\}$. 21.38. $x \geq 0, y \geq 0, x \geq \sqrt{y}$. 21.39. $y=x$.

21.40. $\mathbb{R}_2 \setminus \{(x;y): x=1, y=0\}$. 21.41. $\{(x;y): 0 \neq x^2 + y^2 < 1, y^2 \leq 4x\}$.

21.42. $\{(x;y): x \leq -2, x \geq 2, -1 \leq y \leq 1\}$ 21.43. $(-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$.

21.44. $-x > 0; (-\infty; 0)$. 21.45. $[0; 4]$.

21.46. $(\frac{3}{5})^x \geq 1$ tenglik $x \leq 0$ da o`rinli $(-\infty; 0)$.

21.47. $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$. 21.48. $[3; +\infty)$.

21.49. $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$; $[-1; 1]$. 21.50. $(-\infty; \frac{49}{4}]$.

21.51. $0 \leq |x| < +\infty; (-\infty; 1]$. 21.52. $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$.

21.53. $0 \leq \sqrt{4-x^2} \leq 2, 1 \leq \frac{2}{\sqrt{4-x^2}} < +\infty; [0; +\infty)$.

21.54. Funksiyaning aniqlanish sohasi $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$, qiymatlar sohasi $y=0$ nuqta. 21.55. Toq. 21.56. Juft. 21.57. Toq.

21.58. Toq. 21.59. 6π . 21.60. 12π . 21.61. $y = 2^{\sqrt{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})}; \pi$.

21.62. $y = \log_2 \frac{1 - \cos 2x}{2}; \pi$. 21.63. Tekislikning birinchi

choragidagi nuqtalar to`plami. 21.64. $\{(x,y); x^2 + y^2 \leq 1\}$.

22.6. $\frac{3}{2}$. 22.7. $\frac{1}{2}$. 22.8. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$. 22.9. $\frac{2}{3}$.

22.10. $\frac{2}{3}$. 22.11. $\frac{m}{3}$. 22.12. 1. 22.13. $-\frac{1}{2}$.

- 22.14. -2.5 22.15. ∞ . 22.16. -2 . 22.17. $\frac{1}{4}$.
- 22.18. -1 . 22.19. $\lim_{x \rightarrow \pi+0} \frac{|\sin x|}{\sin x \sqrt{1 - \cos x}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. 22.20. $-\frac{1}{56}$.
- 22.21. $\frac{2}{5}$. 22.22. 3 . 22.23. $\frac{1}{2}$. 22.24. -1 .
- 22.26. 4 . 22.27. 2 . 22.28. $2\cos x$. 22.29. $\frac{1}{2}$.
- 22.30. 8 . 22.31. $-\sqrt{2}$. 22.32. 4 . 22.33. 3 .
- 22.34. $-\frac{1}{2}$. 22.35. $\frac{25}{9}$. 22.36. $-\frac{5}{4}$. 22.37. $\frac{\sqrt{2}}{3}$.
- 22.38. $(\frac{\pi}{2}) - x = y$; -1 22.39. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 22.40. -1 . 22.41. -12 .
- 22.42. $-\frac{1}{2}$ agar $a < 0$ va ∞ , agar $a < 0$. 22.43. 2.5 22.44. -5 .
- 22.45. $-\sqrt{2}$. 22.46. $\frac{1}{4}$. 22.47. $6\sqrt{2}$. 22.48. $-\frac{1}{2}$.
- 22.49. $\frac{m^2}{2}$. 22.50. $x = 2 + a; \frac{1}{4}$. 22.51. $\frac{1}{2}$. 22.52. $-2\sin x$;
- 22.53. $\sec^2 x_0$; 22.54. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$. 22.55. ∞ . 22.56. 2 .
- 22.58. $\frac{1}{2}$. 22.59. 1 . 22.60. $\frac{1}{2}$. 22.61. $\frac{1}{4}$.
- 22.62. -2 . 22.63. $-\frac{1}{4}$. 22.64. 2 . 22.66. e^{10} .
- 22.67. e . 22.68. e^{-4} . 22.69. e^{10} . 22.70. e^2 .
- 22.71. e . 22.72. $e^{\frac{15}{2}}$. 22.74. $\frac{1}{2a}$. 22.75. 3 .
- 22.76. 0 . 22.77. e^a . 22.78. 0 . 22.79. e .
- 23.1. b) $f(1-0)=3$, $f(1+0)=2$, $f(2-0)=f(2+0)=4$;
c) $f(1-0)=f(2-0)=f(3-0)=1$, $f(1+0)=f(2+0)=f(3+0)=0$;
d) $f(1-0)=-\infty$, $f(1+0)=+\infty$ 23.4. $x=2$ da 2-tur uzilishga ega.
- 23.5. $x=2$ nuqtada yo'qotiladigan uzilishga ega. 23.6. $x=-1$ 1-tur uzilish
- 23.7. $x=0$ da 2-tur uzilish $f(0-0)=0$ $f(0+0)=+\infty$

23.8. $x = \pm 2$ da 1-tur uzilishga ega. $f(-2)=f(2)=2.5$; $f(-2-0)=f(2+0)=3$;
 $f(-2+0)=f(2-0)=2$. 23.9. $x=2$ da 1-tur uzilish $f(2-0)=2$; $f(2+0)=0$.

23.10. $x=0$ va $x = \pi$ da 1-tur uzilishga ega, $f(0-0)=-1$, $f(0+0)=1$;
 $f(\pi-0)=-1$; $f(\pi+0)=1-\pi$ 23.11. $x=1$ da 2-tur uzilish; $f(1-0)=-1$;
 $f(1+0)=+\infty$ 23.12. $x=0$ da 2-tur uzilishga ega,
 $f(0+0) = f(0) = 1$; $f(0-0) = +\infty$; $x = 2$ da 1-tur uzilishga ega, $f(2-0)=2=f(2)$;
 $f(2+0)=3$ 23.13. $x=2$, $x=-2$ nuqtalarda 2-tur uzilishga ega

23.14. $x=1$ da 2-tur uzilishga ega; $f(1-0) = +\infty$; $f(1+0) = 1$

23.15. $x=3$ da 2-tur uzilishga ega; $f(3-0) = -\infty$; $f(3+0) = +\infty$

23.16. $x=2$ da 2-tur uzilishga ega, $f(2-0)=+\infty$; $f(2+0)=0$

23.19. a) $f(2-0)=4$, $f(2+0)=5$

b) $E(-2-0)=-3$; $E(-2+0)=-2$; $E(0+0)=E(0-0)=0$; $E(1-0)=0$; $E(1+0)=1$

c) $f(2+0) = +\infty$; $f(2-0) = -\infty$ 23.21. $x=-2$ da 2-tur uzilishga ega

23.22. $x=0$ da uzilishga ega $f(0-0)=3$; $f(0+0)=1$

23.23. $f(-2)=f(2)=f(0)=2$; $f(-2-0)=f(2+0)=f(0-0)=f(0+0)=4$;
 $f(2+0)=f(2-0)=0$ 23.24. $f(0-0)=1$; $f(0+0)=0$

23.25. $f(2-0) = 0$; $f(2+0) = +\infty$

24.3. $\left(1 - \frac{1}{x^3}\right)^2$ 24.4. $6x + \frac{25}{3}\sqrt[3]{x^2} + \frac{12}{x^4}$ 24.5. $3x^2 \sin x + x^3 \cos x$

24.6. $\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$ 24.7. $\frac{-8x^3}{(x^4 - 1)^2}$ 24.8. $2x \operatorname{ctgx} - \frac{x^2}{\sin^2 x}$

24.9. $\arccos x - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 24.10. $e^x \operatorname{arctgx} + \frac{e^x}{1+x^2}$ 24.11. $-\frac{x \sin x + 2 \cos x}{x^3}$

24.12. $\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ 24.13. $9x^2 \ln x$ 24.14. $\frac{1}{1 - \sin x}$

24.15. $\frac{1}{2\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)^2}$ 24.16. $\frac{x(\ln x^2 + 1)}{\ln 3}$

24.17. $\frac{\sin x - x \ln x \cos x - x^2 + x \cos x \sin x}{x \sin^2 x}$ 24.18. $\frac{\operatorname{tgx} - x^2 \operatorname{tgx}}{(1+x^2)^2} + \frac{x}{(1+x^2) \cos^2 x}$

24.19. $\frac{2}{1+x^2}$

$$24.20. a) \Delta y = |\ln(1 + \Delta x)| = \begin{cases} \ln(1 + \Delta x), & \Delta x \geq 0 \\ -\ln(1 + \Delta x), & \Delta x < 0 \end{cases}; f'_+(1) = 1, f'_-(1) = -1, \text{ funksiya } x=1$$

da hosilaga ega emas.

$$b) f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1; f'_+(0) \neq f'_-(0). \text{ Demak, } f'(0) \text{ mavjud emas.}$$

$$24.22. y = x + \frac{2}{3} \quad 24.23. y = -\frac{x}{2} + 2 \quad 24.24. y = \pi - x$$

$$24.25. y=4x-2 \text{ va } y = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{4} \quad 24.26. \varphi = 90^\circ \quad \varphi = \arctg \frac{3}{4}$$

$$24.27. \varphi = 45^\circ \text{ va } \varphi = 135^\circ \quad 24.28. tg \varphi = \frac{2}{3} \quad tg \varphi = -\frac{8}{27}$$

$$24.29. \varphi = \frac{\pi}{4}, \quad \varphi = \frac{3\pi}{4}$$

$$24.30. \Delta y = (6x^2 + 10x)\Delta x + (6x + 5)\Delta x^2 + 2\Delta x^3; \quad dy = (6x^2 + 10x)dx$$

$$24.31. \Delta y \approx dy = 0.05$$

$$24.32. a) \sqrt[3]{x}dx; \quad b) -x^2e^{-x}dx; \quad c) x^2\cos xdx; \quad d) \left(\frac{8}{9}\right)^x \ln\left(\frac{8}{9}\right)dx$$

$$24.34. 1.006 \quad 24.35. 2.0125 \quad 24.36. \sin 29^\circ = \sin\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180}\right); \quad 0.484$$

$$24.37. 0.811 \quad 24.38. \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + 1\right) \quad 24.39. \frac{1}{x}\left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)$$

$$24.43. -\frac{2 + \sin x}{(1 + 2\sin x)^2} \quad 24.44. y=x+1, y=-x+5 \quad 24.45. x-y+1=0$$

$$24.46. a) x=2; \quad b) x = -\frac{3}{4} \quad 24.47. \arctg \frac{4}{3} \quad 24.48. \frac{a dx}{a + x^2}$$

$$24.51. \frac{(x+1)(5x^2 + 14x + 5)dx}{(x+2)^4(x+3)^5} \quad 24.52. 1.035 \quad 24.53. 0.851$$

$$24.54. 0.078 \quad 24.55. 1.9938.$$

$$25.2. y' = \frac{6(x+1)}{2x^2 + 3x} \quad 25.3. \frac{4\cos^2 2x}{\sqrt{4x + \sin 4x}} \quad 25.4. \frac{\sin \frac{x}{4}}{2\sqrt{\frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}}$$

$$25.5. \frac{1}{a}e^{\frac{x}{a}}\left(\cos \frac{x}{a} - \sin \frac{x}{a}\right) \quad 25.6. \frac{-3x}{\sqrt{1-3x^2}} \quad 25.7. -\cos^2 \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}$$

$$\begin{array}{lll}
25.8. \operatorname{ctg}^3 \frac{x}{2} & 25.9. \frac{6}{x^2+9} & 25.10. 3e^{\sin^2 3x} \sin 6x \cdot \sin^2 3x \\
25.11. e^{\sqrt{2x}} & 25.12. \operatorname{Cosec}^2 \frac{x}{2} \cdot \operatorname{ctg} \frac{x}{2} & 25.13. -\frac{1}{\sqrt{5-x^2}} \\
25.14. \frac{mx}{(1-mx^2)^{3/2}} & 25.15. \frac{\cos x \ln \sin x}{(1+\ln \sin x)^2} & 25.16. \frac{2}{(x^2+2x+2)^2} \\
25.17. \frac{\cos^4 x}{\sin x} & 25.18. \frac{1}{x^2(x-1)} & 25.19. \frac{\ln \ln \ln x}{x \ln x} \\
25.20. 3 \sec^2 x \cdot \sec^4 \operatorname{tg} x & 25.21. -6 \cdot 2^{\cos 3x-3 \cos x} \cdot \ln 2 \cdot \cos 2x \cdot \sin x & \\
25.22. \frac{2e^{x^2} \cdot x(x^4+x^2+1)}{(x^2+1)^2} & 25.23. \frac{8x^3}{1+x^8} & 25.24. 0.5 \cdot \ln 2 \sqrt{2^x(1-2^x)} \\
25.25. \frac{2}{\ln 2} \cdot \operatorname{ctg} x & 25.26. 2xe^x \sin x & 25.27. -\frac{1}{x}(\log_x e)^2 \\
25.28. x^x(1+\ln x) & 25.29. \frac{7}{12}x^{-\frac{5}{12}} & 25.30. -\frac{2x^2+11}{(x^2-3x+2)(x^2-7+12)} \\
25.32. -\frac{Ax+By+D}{Bx+Cy+E} & 25.33. \frac{x}{3y} & 25.34. \frac{y(y-x \ln y)}{x(x-y \ln x)} \\
25.35. -\frac{y \cos x + \sin y}{x \cos y + \sin x} & 25.36. -\frac{e^x - y \cdot 2^{xy} \ln 2}{e^y - x \cdot 2^{xy} \ln 2} & 25.37. 2x \\
25.38. \frac{y}{x} & 25.39. -\operatorname{ctg} t & 25.40. -\operatorname{tg} t & 25.41. \frac{t(2-t^3)}{1-2t^3} \\
25.42. \operatorname{ctht} & 25.43. 1) 2 \cos 2x; & 2) 2 \operatorname{tg} \sec^2 x; & 3) \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} \\
25.44. 1) -\frac{1}{x^2}; & 2) e^{-t}(3-t); & 3) \frac{2a(3x^2-a^2)}{(x^2+a^2)^3} \\
25.46. \left(-\frac{1}{a}\right)^n e^{-\frac{x}{a}} & 25.47. \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \sqrt{x^{2n-1}}} & 25.48. n! \\
25.49. \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) & 25.50. 2^{n-1} \cos\left(2x+\frac{n-\pi}{2}\right) & 25.51. (-1)^n \frac{1}{t} \\
25.53. dy = \ln x dx, \quad d^2 y = \frac{(dx)^2}{x}; \quad d^3 y = -\frac{(dx)^3}{x^2} & 25.54. \sqrt[3]{x} & 25.55. -x^2 e^{-x} \\
25.56. \frac{6(x+1)}{(2x^2+3x)} & 25.57. \operatorname{cosec} \frac{2x+1}{2} & 25.58. \sqrt{a^2-x^2}
\end{array}$$

$$25.59. \frac{1}{x\sqrt{4x^2-1}} \quad 25.60. -2e^{-x}\sin^2 e^{-x} \quad 25.61. \frac{10}{x(x^5+2)}$$

$$25.62. \frac{2e^{2x}(1-2x)}{(x+e^{2x})^2} \quad 25.68. \frac{\operatorname{ctgx} \ln \operatorname{Cos} x + \operatorname{tg} x \ln \operatorname{Sin} x}{\ln^2 \operatorname{Cos} x} \quad 25.69. 0$$

$$25.72. 1) -\frac{x}{y}; \quad 2) \frac{p}{y}; \quad 3) \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

$$25.73. 1) -\frac{2x+y}{x+2y}; \quad 2) \frac{2x-y}{x-2y} \quad 25.74. 1) -\sqrt[3]{\frac{x}{y}}; \quad 2) \frac{e^{-x}+y}{e^y+x}$$

$$25.75. -\frac{e^x \operatorname{Sin} y + e^{-y} \operatorname{Sin} x}{e^x \operatorname{Cos} y + e^{-y} \operatorname{Cos} x} \quad 25.76. \frac{1}{y^2} + 1 \quad 25.77. 1) -\frac{a^2}{y^3}; \quad 2) \frac{2(y-1)}{(1-x)^2}$$

$$25.78. 1) -\frac{1}{a \operatorname{Sin}^3 t}; \quad 2) \frac{t^2+1}{4t^3}; \quad 3) -\frac{1}{4a \operatorname{Sin}^3 \frac{t}{2}}$$

$$25.79. 1) 2e^{-x^2}(2x^2-1); \quad 2) \frac{t^2+1}{4t^3}; \quad 3) -\frac{1}{4a \operatorname{Sin}^3 \frac{x}{2}}$$

$$25.80. \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}{2^n} \sqrt{x} \quad 25.81. \frac{n!(-2)^n}{(2x+1)^{n+1}} \quad 25.82. -1.5 \cdot 2^n \operatorname{Cos}\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$25.84. \frac{n!(ad-bc)(-c)^{n-1}}{cx+d} \quad 25.85. k^n e^{kx}$$

$$25.86. \mathbf{dy = 6(2x-3)^2 dx; \quad d^2 y = 24(2x-3)(dx)^2; \quad d^3 y = 48(dx)^3.}$$

26.3. Tatbiq qilib bo'lmaydi, chunki $x=0$ bo'lganda hosila mavjud emas.

$$26.4. x=3 \text{ da} \quad 26.5. C = \left(\frac{a+b}{2}; \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \right) \quad 26.6. c = \frac{9}{4}$$

$$26.7. M(2; 0) \quad 26.8. \frac{b^3-a^3}{b^2-a^2} = \frac{3c^2}{2c}; \quad c = \frac{2(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)}$$

$$26.9. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \quad 26.10. \operatorname{Sin} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$$

$$26.11. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots \quad 26.12. 1\frac{31}{48}$$

$$26.14. 4 \quad 26.15. e^a \quad 26.16. 2 \quad 26.17. \frac{\pi\sqrt{3}}{6}$$

$$26.18. \frac{1}{6} \quad 26.19. -\frac{1}{2} \quad 26.20. 1 \quad 26.21. 1$$

26.22. 1 26.23. 1 26.24. 1 26.26. $x=4$ da

26.28. $M\left(\frac{169}{36}; \frac{2197}{216}\right)$ 26.29. $M(\sqrt{3}; 0)$ 26.30. 1) $\sqrt{\frac{4}{\pi}-1}$

2) $\sqrt{1-\frac{4}{\pi^2}}$ 3) $\frac{1}{\ln 2}$ 26.31. 1) $\frac{\pi}{4}$ 2) $\sqrt[3]{\left(\frac{15}{4}\right)^2} \approx 2.4$

26.32. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$

26.33. $(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{2!} + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} e^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$

26.34. $\frac{2}{3}$ 26.35. $\frac{1}{3}$ 26.36. 0.18 26.37. 18

26.38. $\frac{1}{2}$ 26.39. 0 26.40. 0 26.41. $\frac{2}{3}$

26.42. 2 26.43. $e^{\frac{1}{3}}$

27.3. $x=1; y=2$ 27.4. $x=\frac{1}{2}, y=x+\frac{1}{2}$ 27.5. $x=0, y=0$

27.6. $x=0$ 27.7. $y=2x$ 27.8. $y=0$ 27.9. $y=x$

27.10. $y = \pm \frac{b}{a} x$ 27.11. $D(y) = (-\infty; +\infty); x=0 y=1; y=0 x=1; \text{ og'ma}$

asimptota $y=-x$ $y' = \frac{-x^2}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2}}; y'=0 x=0; y'=\infty x=1$

$y' < 0$ ($x \neq 0$ da) bo'lgani uchun, funksiya kamayuvchi.

$y'' = \frac{-2x}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2}}; (-\infty; 0)$ va $(1; +\infty)$ da botiq, $(0; 1)$ da qavariq. Egilish nuqtalari

$(0; 1)$ va $(1; 0)$.

27.12. $D(y) = (-\infty; +\infty)$ juft funksiya va davri $T = \pi\left(\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$ da o'suvchi,

$\left(\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi + \pi k\right)$ da kamayuvchi, $y_{\min}(\pi k) = 0, y_{\max}\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right) = 1$ $\left(-\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k\right)$ da

botiq, $\left(\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{3\pi}{4} + \pi k\right)$ da qavariq; egilish nuqtalari $\left(-\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{1}{2}\right)$ va

$\left(\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{1}{2}\right), k \in Z.$

27.13. $D(y) = (1; +\infty)$; $x=1$ va $y=0$ asimptotalar. Kamayuvchi va botiq funktsiya, ekstremumlar va egilish nuqtalari yo'q.

27.14. $D(y) = (-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; +\infty)$ toq funksiya, $x=-2$, $x=2$, $y=x$ asimptotalar, $(-\infty; -2\sqrt{3}) (2\sqrt{3}; +\infty)$ da o'suvchi, $(-2\sqrt{3}; -2) (-2; 2) (2; 2\sqrt{3})$ da kamayuvchi $y_{\min}(2\sqrt{3}) = 3\sqrt{3}$, $y_{\max}(-2\sqrt{3}) = 3\sqrt{3}$. $(-\infty; -2)$ va $(0; 2)$ da qavariq, $(-2; 0)$ va $(2; +\infty)$ da botiq, egilish nuqtasi $(0; 0)$.

27.15. $D(y) = (-\infty; +\infty)$; $(-\infty; \frac{1}{4})$ da kamayuvchi, $(\frac{1}{4}; +\infty)$ da o'suvchi, $y_{\min}(\frac{1}{4}) = -\frac{27}{16}$; $(-\infty; \frac{1}{2})$ da va $(1; +\infty)$ da botiq, $(\frac{1}{2}; 1)$ da qavariq, egilish nuqtalari $(\frac{1}{2}; -1)$ va $(1; 0)$.

$$27.16. x = \frac{\pi}{6} \text{ va } x = \frac{5\pi}{6} \text{ da } y_{\max} = 1.5, \quad x = \frac{\pi}{2} \text{ da } y_{\min} = 1.$$

27.17. $x=0$ da $y_{\max} = 0$, $x=2$ da $y = \pm\infty$ $x=4$ da $y_{\min} = 8$; $x=2$ va $y = x+2$ asimptotalar.

27.18. $D(y) = [0; +\infty)$, $(0; \frac{1}{3})$ da kamayuvchi, $(\frac{1}{3}; +\infty)$ da o'suvchi, $y_{\min}(\frac{1}{3}) = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$, funksiya botiq.

27.19. $D(y) = (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$; $x=1$, $x=0$, $y=0$ asimptotalar; $(-\infty)$ da o'sadi, $(1; +\infty)$ da kamayadi, funksiya botiq, ekstremumlar va egilish nuqtalari yo'q.

$$27.20. x = \frac{\pi}{6} \text{ da } y_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \approx 0.34$$

$$x = -\frac{\pi}{6} \text{ da } y_{\min} \approx -0.34; \quad x = \pm\frac{\pi}{2} \text{ da } y = \pm\frac{\pi}{2} = \pm 1.57$$

$$27.21. x = \frac{\pi}{4} \text{ da } y_{\min} = \frac{\pi}{2} + 1 \approx 2.57 \quad x = \frac{3\pi}{4} \text{ da } y_{\max} = +3.71; \quad x=0 \text{ va } x=\pi$$

asimptotalar.

27.22. $D(y) = (-\infty; +\infty)$; $y=x$ asimptota; $(-\infty, 0)$ da kamayadi, $(0, +\infty)$ da o'sadi, $y_{\min}(0) = 1$, botiq funksiya.

27.23. $D(y) = (-\infty; +\infty)$; toq funksiya, $y = -l$ va $y = l$ asimptotalar, $(-\infty, +\infty)$ da o'sadi, $(-\infty, 0)$ da botiq, $(0, +\infty)$ da qavariq, egilish nuqtasi $(0; 0)$.

27.24. $D(y) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$; $x = 2$ va $y = x + 4$ asimptotalar, $(-\infty, 2)$ va $(6, +\infty)$ da o'sadi, $(2; 6)$ da kamayadi, $y_{\min}(6) = \frac{27}{2}$, $(-\infty, 0)$ da qavariq $(0, 2)$ va $(2, +\infty)$ da botiq, egilish nuqtasi $(0; 0)$.

27.25. $x = 0, y = 2x$

27.26. $x = 0, y = -3x$

27.27. $y = 0$ gorizantal asimptota.

27.28. $y = 0.5x + \pi, y = 0.5x$

27.29. $y = 0.5\pi x + 1, y = -0.5\pi x + 1$.

28.3. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2y}{(x+y)^2}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2x}{(x+y)^2};$

28.4. $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} e^{\frac{x}{y}}; \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} - \frac{z}{y^2} e^{\frac{x}{y}}; \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{y} e^{\frac{x}{y}};$

28.5. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\sin x}{\cos y}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\cos x}{\cos y} \operatorname{tg} y$

28.6. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2y}{x^2 + y^2};$

28.7. $\frac{\partial z}{\partial x} = \sin(x+y) + x \cos(x+y), \frac{\partial z}{\partial y} = x \cos(x+y)$

28.8. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-xy}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}};$

28.9. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-y|x|}{x^2 \sqrt{x^2 - y^2}}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{|x|}{x \sqrt{x^2 - y^2}};$

28.10. $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y}{\sqrt{x}}; \frac{\partial u}{\partial y} = 2\sqrt{x} + 6y^2 \sqrt{z^2}; \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2y^2}{\sqrt{z}};$

28.11. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\sqrt{y^2 + 1}}{2\sqrt{xy}}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\sqrt{x}(y^2 - 1)}{2y\sqrt{y}\sqrt{y+1}};$

28.12. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} e^{\sin \frac{y}{x}} \cos \frac{y}{x}; \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} e^{\sin \frac{y}{x}} \cos \frac{y}{x};$

28.13. $dz = 15x^2 y^2 dx + 10x^3 y dy;$

28.14. $dz = \left(-\frac{y}{x^2} - \frac{1}{y}\right) dx + \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{y^2}\right) dy$

28.15. $dz = \cos y (\sin x)^{\cos y - 1} \cos x dx - (\sin x)^{\cos y} \sin y \ln \sin x dy;$

28.16. $dz = 2e^{x^2 + y^2} (x dx + y dy);$ 28.17. $dz = \frac{1}{x^2 + y^2} (y dx + x dy);$

28.18. $dz = \sin 2x dx - \sin 2y dy;$ 28.19. $dz = \left(\ln \frac{y}{x} - 1\right) dx + \frac{x}{y} dy;$

28.20. $dz = yx^{y-1} dx + x^y \ln x dy;$

$$28.21. dz = - \left(\frac{y}{x^2 \cos^2 \frac{y}{x}} + \frac{1}{y \sin^2 \frac{x}{y}} \right) dx + \left(\frac{1}{x \cos^2 \frac{y}{x}} + \frac{x}{y^2 \sin^2 \frac{x}{y}} \right) dy;$$

$$28.22. dz = \frac{2dx}{\cos^2(2x+\sqrt{y})} + \frac{dy}{2\sqrt{y} \cos^2(2x+\sqrt{y})};$$

$$28.23. dz = e^{xy} (y dx + x dy);$$

$$28.26. \frac{\partial z}{\partial x} = -a \sin(ax - by); \quad \frac{\partial z}{\partial y} = b \sin(ax - by);$$

$$28.27. \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{3y}{(3y-2x)^2}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3x}{(3y-2x)^2};$$

$$28.28. \frac{\partial z}{\partial x} = ctg(x-2y); \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2ctg(x-2y);$$

$$28.29. \frac{\partial z}{\partial x} = 2 \sin(2x-y); \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \sin(2x-y);$$

$$28.30. \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2y}{x \sin\left(\frac{2y}{x}\right)}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x \sin\left(\frac{2y}{x}\right)};$$

$$28.31. \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{2\sqrt{xy}(1+xy)}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{2\sqrt{xy}(1+xy)};$$

$$28.32. \frac{\partial z}{\partial x} = e^{\frac{x}{y}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y} \right);$$

$$28.33. \frac{\partial u}{\partial x} = (y-z)(2x-y-z); \quad \frac{\partial u}{\partial y} = (x-z)(x-2y+z);$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (x-y)(2z-y-x);$$

$$28.34. dz = x^{m-1} y^{n-1} (mydx + nx dy); \quad 28.35. dz = \frac{\sqrt[3]{x}}{x} \left(\frac{y}{3} dx + x dy \right);$$

$$28.36. dz = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$$

$$28.37. dz = -e^{\cos(xy)} \sin(xy) (ydx + xdy);$$

$$28.38. dz = e^{xy} \left[\left(\frac{1}{y} + x \right) dx + \frac{x}{y} \left(x - \frac{1}{y} \right) dy \right];$$

$$28.39. du = y^2 z x^{y^2 z - 1} dx + x^{y^2 z} \ln x \cdot 2yz dy + x^{y^2 z} \ln x \cdot y^2 dz$$

$$29.2. grad z = \frac{2}{3} i + \frac{1}{3} j$$

$$29.3. grad z = \frac{y_0 i - x_0 j}{x_0^2 + y_0^2}$$

$$29.4. grad u = yzi + xzj + xyk = 2i + j + 2k \quad |grad u| = 3$$

$$29.5. grad u = i + \frac{3}{8} j, \quad |grad u| = \frac{\sqrt{73}}{8}$$

$$29.7. x = -4 \text{ va } y = 1 \text{ da } z_{min} = -1$$

$$29.8. x = y = 4 \text{ da } z_{max} = 12$$

$$29.9. x = 1; y = \frac{1}{2} \text{ da } z_{min} = 0$$

29.10. Ekstremum yo'q.

29.11. Eng katta qiymati $z=1$, eng kichik qiymati $z=-1$

29.12. Sohaning chegarasi uch bo'lakdan iborat bo'lib, bu bo'laklar turli formulalar bilan berilgani uchun har bir bo'lakda alohida tekshirilishi kerak.

Topilgan qiymatlar: $\{-1, -\frac{1}{4}, 6, 0, -\frac{3}{4}\}$ dan iborat. Demak, -1 funksiyaning eng

kichik, 6 esa eng katta qiymati.

29.14. $z = -2(\sqrt{2} + 1) = -4,8$ funksiyaning eng kichik qiymati, funksiyaning eng katta qiymati $z = 2(\sqrt{2} - 1) = 0,8$ dan iborat

29.15. $6i+4j \quad |\text{grad } z| = 2\sqrt{13}$

29.16. $2(y_0i+x_0j) \quad |\text{grad } z| = 2\sqrt{x_0^2 + y_0^2}$

29.17. $\text{grad } z = 0,32i - 0,64j; \text{grad } z = 0,32\sqrt{5}$

29.18. $\text{gradu} = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}; |\text{grad } u| = 1$ ixtiyoriy nuqtada

29.19. $z_{\max} = \frac{1}{64}$

29.20. $z_{\min} = -125$

29.21. $x=y=\frac{2a}{3}$ da $z_{\max} = \frac{a\sqrt{3}}{9}$

29.22. $z_{\min} = 0$

29.23. $z_{\max} = 4$

29.24. Eng kichik qiymati $z=-3$, eng katta qiymati 17

29.25. Eng kichik qiymati $z=\text{arctg}(-5)$, eng katta qiymati $z=\text{arctg } 7$

30.5. $\frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + C$

30.6. $\frac{5}{4}\sqrt[5]{x^4} + c$

30.7. $2 \arcsin x - x + C$

30.8. $\frac{x^3}{3} + x^2 + \ln x + C$

30.9. $\frac{1-x}{x^2} + C$

30.10. $x\left(\frac{2}{3}\sqrt{x} + \frac{3}{4}\sqrt[3]{x}\right) + C$

30.11. $\frac{2x\sqrt{x}}{3} - 3x + 6\sqrt{x} - \ln x + C$

30.12. $\frac{3}{4}(x-4)\sqrt[3]{x} + C$

30.13. $-\text{ctg } x - \text{tg } x + C$

30.14. $-\text{ctg } x - x + C$

30.15. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \text{tg } x - \text{ctg } x + C$

30.16. $\frac{1}{2} \sin(x^2) + C$

30.17. $e^{\sqrt{2x-1}} + C$

30.18. $-\frac{1}{32}(1-2x^4)^4 + C$

30.19. $\frac{2}{15}(3x^2 - 5ax - 2a^2)\sqrt{a-x} + C$

30.20. $\ln|\ln x| + C$

- 30.21. $\frac{1}{\sqrt{2}} \left| \ln \sin x + \sqrt{\frac{1}{2} + \sin^2 x} \right| + C$ 30.22. $-2\sqrt{2 + \cos^2 x} + C$
- 30.23. $xe^x + C$ 30.24. $\frac{e^{2x}}{5} (\sin x + 2 \cos x) + C$ 30.25. $-\frac{1+2 \ln x}{4x^2} + C$
- 30.26. $\frac{e^{3x}}{27} (9x^2 - 6x + 2) + C$ 30.27. $x \sin x + \cos x + C$
- 30.28. $x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C$ 30.29. $-\frac{1}{2} \left(\frac{x}{\sin^2 x} + \operatorname{ctg} x \right) + C$
- 30.30. $\frac{1}{4} \arcsin \frac{x}{2} + C$ 30.31. $-\frac{1}{2x^2} + C$ 30.32. $\arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C$
- 30.33. $\frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}} \right| + C$ 30.34. $x + 2e^x + \frac{1}{2} e^{2x} + C$
- 30.35. $\ln|x^2 - 5| + \frac{3}{2\sqrt{5}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{5}}{x+\sqrt{5}} \right| + C$ 30.36. $\operatorname{tg} \varphi - \varphi + C$
- 30.37. $\frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x^2}{\sqrt{3}} + C$ 30.38. $-\sqrt{1 + 2\cos x} + C$ 30.39. $\ln \frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1} + C$
- 30.40. $\frac{1}{4} \ln(3 + 4e^x) + C$ 30.41. $e^{\sin x} + C$
- 30.42. $-\frac{1}{4} \operatorname{arctg}(0.5\cos^2 2x) + C$ 30.43. $+\arcsin\left(\frac{e^x}{4}\right) + C$
- 30.44. $\ln|x + \sqrt{2+x^2}| + \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C$ 30.45. $-x \cos x + \sin x + C$
- 30.46. $e^x(x^2 - 2x + 2) + C$ 30.47. $\frac{1}{2} x\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$
- 30.48. $-2\sqrt{x} \cos \sqrt{x} + 2 \sin \sqrt{x} + C$
- 30.49. $(x+1)^2 \sin x + 2(x+1) \cos x + C$ 30.50. $3\operatorname{tg} x + 2\operatorname{ctg} x + C$
- 31.9. 16/3; 31.10. $\pi/4$; 31.11. 8/3; 31.12. $3/4(2\sqrt[3]{2}-1)$;
- 31.13. 1; 31.14. $\frac{\pi}{6}$; 31.15. 1/2; 31.16. $\frac{1+2e^3}{9}$;
- 31.17. $\frac{e^\pi+1}{2}$; 31.18. $\frac{\pi}{2}-1$; 31.19. $2\ln 2-1$; 31.20. 1/3;
- 31.21. $\ln \frac{2e}{e+1}$; 31.22. $2-\ln 2$; 31.23. $\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}/2$;
- 31.24. $\frac{\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})}{2}$; 31.25. $\ln 3/2$; 31.26. $\frac{\ln 3}{2}$; 31.27. $\pi/4$;
- 31.28. $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$, 31.29. $\frac{\pi^2-8}{4}$; 31.30. 32/3;
- 31.31. $10/3 + \sqrt{2}/2 \times \ln(3+\sqrt{8}) \approx 4.58$ (birlik); 31.32. $\frac{9}{2}$ (kv. birlik);

- 31.33. $1/2 \ln 1,5$; 31.34. 5π ; 31.35. 12 ; 31.36. $64\pi/3$;
 31.37. $\frac{(\pi+2)*\pi}{4}$; 31.38. $\frac{32\pi a}{105}$; 31.39. $1/6$; 31.40. 1 ;
 31.41. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$; 31.42. $2 \ln 1,5 - 1/3$; 31.43. $\arctg e - \pi/4$;
 31.44. $(\pi-2)/4$; 31.45. $\pi/2 - 1$; 31.46. $(1 - \ln 2)/2$; 31.47. $80/3$;
 31.48. $10/3 + \sqrt{2}/2 \ln(3 + \sqrt{8})$; 31.50. $\ln 3$; 31.51. 12π .
 32.8. Uzoqlashuvchi; 32.9. $1/2$; 32.10. 1 ; 32.11. 16 ;
 32.12. $6\sqrt[3]{2}$; 32.13. $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$; 32.14. Uzoqlashuvchi;
 32.15. Yaqinlashuvchi; 32.16. 2 ; 32.17. Uzoqlashuvchi;
 32.18. Uzoqlashuvchi; 32.19. π ; 32.20. $\frac{\pi}{6}$; 32.25. $\frac{\pi^2}{8}$;
 32.26. $\frac{\pi}{4}$ 32.27. 1 ; 32.28. Uzoqlashuvchi;
 32.29. Uzoqlashuvchi; 32.30. Uzoqlashuvchi; 32.32. 2 ;
 32.33. Yaqinlashuvchi; 32.36. $2,545$; 32.37. $1,748$;
 32.38. $2,996$.
 33.7. $y = C(x+1)e^{-x}$ 33.8. $\ln|x| = C + \sqrt{y^2 + 1}$
 33.9. $y(\ln|x^2-1| + C) = 1$; $y=0$; $y = [\ln(x^2-1) + 1]^{-1}$
 33.10. $y = 2 + C \cos x$, $y = 2 - 3 \cos x$ 33.11. $y = (x-C)^3$, $y=0$, $y = (x-2)^3$; $y=0$
 33.12. $y^2 - 2 = C e^{1/x}$; 33.13. $x^2 = -2y^2 \ln Cy$ 33.14. $\frac{y}{x} = \frac{C}{x^2}$; $y = \frac{C}{x}$
 33.15. $y = x \ln |x| + Cx$; 33.16. $x+y = Cx^2$, $x=0$
 33.17. $\ln(x^2+y^2) = C - 2 \arctg \frac{y}{x}$ 33.18. $y^2 - 2 = C e^{1/x}$
 33.19. $z = -\lg(C - 10^x)$ 33.20. $e^{-2} = 1 + C e^t$ 33.21. $x^2 + t^2 - 2t = C$
 33.22. $x(y-x) = Cy$; $y=0$ 33.23. $x = \pm y\sqrt{\ln Cx}$, $y=0$ 33.24. $y = C e^{y/x}$
 33.25. $y^2 - x^2 = Cy$; $y=0$ 33.26. $\sin \frac{y}{x} = Cx$ 33.27. $y = Cx^2 + x^4$
 33.28. $y = \sin x + C \cos x$ 33.29. $xy = C - \ln|x|$ 33.30. $y = C e^{x^2} - x^2 - 1$

33.31. $xy = (x^3 + C)e^{-x}$ 33.32. $y = (2x + 1)(c + \ln|2x + 1|) + 1$
 33.33. $y = e^x(\ln|x| + C)$ 33.34. $y = x(C + \sin x)$ 33.35. $y = C \ln^2 x - \ln x$
 34.1. $y = x^4(\frac{1}{2} \ln x + C)^2$ 34.2. $-\frac{1}{y^3} = \frac{1}{x^3}(\frac{6}{5x^5} + C)$
 34.3. $y^2 = -\frac{1}{x^4} + Cx^3$ 34.4. $y^3 = x^2(\ln x + C)$ 34.5. $3x^2y - y^3 = C$
 34.6. $x^2 - 3x^3y^2 + y^4 = C$ 34.7. $x e^{-y} - y^2 = C$ 34.8. $4y \ln x + y^4 = C$
 34.9. $x + \frac{x^3}{y^2} + \frac{5}{y} = C$ 34.10. $x = Cy^3 + y^2; y = 0$ 34.11. $\frac{1}{y} = e^{x^2}(C - x)$
 34.12. $y = \frac{1}{3} \cos x + C$; 34.13. $y^2 = 2x^2 \ln Cx$; 34.14. $x^2 + \frac{2}{3}(x^2 - y)^{3/2} = C$
 34.15. $x - y^2 \cos^2 x = C$ 34.16. $x^3 + y^3 \ln y - y^2 = C$ 34.17. $x^2 + 1 = 2(C - 2x) \sin y$
 35.9. Uzoqlashuvchi; 35.10. Yaqinlashuvchi; 35.11. Yaqinlashuvchi;
 35.12. Yaqinlashuvchi; 35.13. Uzoqlashuvchi; 35.14. Yaqinlashuvchi;
 35.15. Uzoqlashuvchi; 35.16. Uzoqlashuvchi;
 35.17. Shartli yaqinlashuvchi; 35.18. Uzoqlashuvchi;
 35.19. Absolyut yaqinlashuvchi; 35.20. Shartli yaqinlashuvchi;
 35.21. Yaqinlashuvchi; 35.22. Uzoqlashuvchi;
 35.23. Uzoqlashuvchi; 35.24. Yaqinlashuvchi;
 35.25. Yaqinlashuvchi; 35.26. Yaqinlashuvchi;
 35.27. Yaqinlashuvchi; 35.28. Yaqinlashuvchi;
 35.29. Yaqinlashuvchi; 35.30. Absolyut yaqinlashuvchi;
 35.31. Shartli yaqinlashuvchi; 35.32. Uzoqlashuvchi.
 36.2. $(-1; 1)$; 36.3. $(\frac{1}{e}; e)$; 36.4. $x \neq \pm 1$; 36.5. $(-\infty; +\infty)$;
 36.6. $(-8; 2)$; 36.7. $(0; +\infty)$; 36.8. $(1; +\infty)$; 36.9. $(-\infty; +\infty)$;
 36.12. $\frac{1}{(x-1)^2}, |x| < 1$; 36.13. $\arctg x, |x| \leq 1$; 36.19. $[-3; 3]$;
 36.20. $[-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$; 36.21. $[-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}]$; 36.22. $(-\infty; +\infty)$;
 36.23. $(1; 2]$.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Asosiy adabiyotlar

1. С.В. Кремер тахрири остида «Высшая математика для экономистов», М. «Высшая школа», 1998.
2. Данко П.Е. ва бошқалар. «Высшая математика в упражнениях и задачах» I, II, М. «Высшая школа», 1998.
3. Жураев Т. ва бошқалар. Олий математика асослари. Тошкент, «Узбекистон», 1995.
4. Латипов Х. ва бошқалар. Аналитик геометрия ва чизикли алгебра. Тошкент, «Узбекистон», 1995.
5. Минорский В.П. Олий математикадан масалалар туплами. Тошкент, «Укитувчи» 1988 ва кейинги нашрлар.
6. Замков О. О. ва бошқалар. «Математические методы для экономистов» М. 1994.
7. Ражабов Ф., Нурметов А. Аналитик геометрия ва чизикли алгебра. Тошкент, «Укитувчи», 1990.
8. Саъдуллаев А. ва бошқалар. Математик анализ курсидан мисол ва масалалар туплами. I. Тошкент, «Узбекистон», 1993.
9. Соатов У. Олий математика курси. III том. Тошкент, «Укитувчи», 1999.
10. Каримов М., Абдукаримов Р. Олий математика фанидан маъруза матнлари туплами. I, II қисм. Тошкент, ТМИ, 2002.
11. Адигамова Е.В., Исаева Г., Муминова Р. Олий математикадан масалалар туплами. I, II. Тошкент, ТМИ, 2002, 2004.
12. Karimov M. Oliy matematika fanidan o'quv qo'llanma. Toshkent, «IQTISOD-MOLIYA», 2006.
13. Каримов М., Абдукаримов Р. Олий математика фанидан укув кулланма. Тошкент, ТМИ, 2004.

Qo'shimcha adabiyotlar

1. Бугров А.С.б Никольский С.М. «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии» М. «Наука» 1989.
2. Ващенко Т.В. «Математика финансового менеджмента» М. «Перспектива», 1996.
3. Кочович Е. «Финансовая математика» М. «Статистика», 1994.
4. Магасутова Р.В. «Математика для экономистов» Ташкент, «Укитувчи», 1996.
5. Зайцев И.А. «Высшая математика», М, «Высшая школа», 1991.

6. «Справочник по математике для экономистов» В.И.Ермаков тахрири остида, М. «Высшая школа», 1987.
7. Щипачов В.С. «Высшая математика» М. «Высшая школа», 1999.
8. Шодиев Т. Аналитик геометрия ва чизикли алгебра. Тошкент, «Укитувчи», 1988.
9. Тожиев Ш. Олий математикадан масалалар ечиш. Тошкент, «Узбекистон», 2002.

MUNDARIJA:

1. Matritsalar ustida amallar.....	3
2. Ikkinchi, uchinchi tartibli aniqllovchilarni hisoblash.....	7
3. Determinant xossalari. Minor va algebraik to'ldiruvchilarga doir misollar.....	11
4. Matritsa rangini hisoblash. Teskari matritsani topish.....	16
5. Chiziqli tenglamalar sistemasining yechimi haqida Kroneker - Kapelli teoremasi.....	22
6. Chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer hamda teskari matritsa usuli bilan yechish.....	27
7. Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss va Gauss-Jordan usullari bilan yechish.....	31
8. n – o'lchovli arifmetik fazo. Vektorlar sistemasi. Vektorni vektorlar sistemasi bo'yicha yoyish.....	36
9. Chiziqli bog'liq va chiziqli erkli vektorlar sistemasi.....	43
10. Vektorlar sistemasining rangi va bazisi. Vektorlar sistemasida elementar almashtirishlar. Kanonik bazis.....	47
11. Vektor ko'rinishida yozilgan chiziqli tenglamalar sistemasining birgalikdalik va aniqlik shartlari. Fundamental yechimlar.....	51
12. Chiziqli fazo. Evklid fazo. Ortogonal matritsa.....	55
13. Chiziqli operator.....	58
14. Kvadratik formalar.....	62
15. Tekislikdagi to'g'ri chiziq tenglamalari. To'g'ri chiziq normal tenglamasi. Nuqtadan chiziqqacha bo'lgan masofa.....	65
16. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar.....	73
17. Fazoda tekislik tenglamalari.....	78
18. Fazoda to'g'ri chiziq tenglamasi.....	81
19. To'plamlarga doir misollar.....	85
20. Sonli ketma-ketliklarning limiti.....	89

21. Funksiya. Funksiya aniqlanish sohasi, qiymatlar to'plami, juft-toqligiga doir misollar.....	94
22. Funksiyaning limiti.....	99
23. Funksiya uzluksizligi. Uzlukli funksiyalar.....	104
24. Hosila.....	109
25. Yuqori tartibli hosilalar.....	115
26. Lopital qoidasi.....	120
27. Funksiyani hosila yordamida to'la tekshirish.....	124
28. To'la differensialga doir misollar yechish.....	128
29. Yuqori tartibli xususiy hosilalar.....	131
30. Aniqmas integralni integrallash usullari.....	135
30. Aniqmas integralni integrallash usullari.....	139
32. Hosmas integrallar. Aniq integralni taqribiy hisoblash formulalari.....	144
33. O'zgaruvchisi ajraladigan differensial tenglamalar.....	149
34. Chiziqli differensial tenglamalar.....	154
35. Sonli qatorlarga doir misollar.....	157
36. Funksional qatorlarga doir misollar.....	162
Javoblar.....	165
Foydalanilgan adabiyotlar.....	190